

OPCIÓN A

Ejercicio 1 de la opción A del modelo 5 de 1997.

Considera la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = e^x \cdot \text{sen}(2x)$

(a) Sea $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $F(x) = \int_0^x f(t) dt$

¿ Que dice el teorema fundamental del cálculo integral sobre la función F?

(b) Halla $F(\pi)$

Solución

(a)

El teorema fundamental del calculo integral nos dice que si $f(x)$ es continua en un cerrado $[a,b]$, entonces la función $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, es derivable y que su derivada es $F'(x) = f(x)$

(b)

$$F(\pi) = \int_0^\pi f(t) dt$$

Antes tenemos que resolver una integral por partes

$$I = \int e^x \cdot \text{sen}(2x) dx = e^x \text{sen}(2x) - \int e^x \cdot 2\cos(2x) dx = e^x \text{sen}(2x) - 2I_1$$

Donde $u = \text{sen}(2x)$, $dv = e^x dx$, con lo cual $du = 2\cos(2x)$, $v = e^x$

Análogamente para I_1 , tomando $u = \cos(2x)$, $dv = e^x dx$, con lo cual $du = -2\text{sen}(2x)$, $v = e^x$, resulta

$$I_1 = \int e^x \cdot \cos(2x) dx = e^x \cos(2x) + \int e^x \cdot 2\text{sen}(2x) dx = e^x \cos(2x) + 2I$$

Tenemos

$$I = e^x \text{sen}(2x) - 2I_1 = e^x \text{sen}(2x) - 2(e^x \cos(2x) + 2I) = e^x \text{sen}(2x) - 2e^x \cos(2x) - 4I. \text{ Luego}$$

$$5I = e^x \text{sen}(2x) - 2e^x \cos(2x), \text{ de donde}$$

$$I = [e^x \text{sen}(2x) - 2e^x \cos(2x)] / 5. \text{ Por tanto}$$

$$F(\pi) = \int_0^\pi f(x) dx = \left[\frac{e^x \text{sen}(2x) - 2e^x \cos(2x)}{5} \right]_0^\pi = [(e^\pi \cdot 0 - 2e^\pi \cdot (1)) / 5 - (e^0 \cdot 0 - 2e^0 \cdot 1) / 5] = 2/5 (-e^\pi + 1)$$

Ejercicio 2 de la opción A del modelo 5 de 1997.

Desde la Tierra, que suponemos situada en el origen de coordenadas del plano, se observa un objeto que sigue una trayectoria de ecuación $xy = 16$ (donde las distancias se miden en años-luz). ¿ Cuales son las coordenadas del punto de la trayectoria cuya distancia a la Tierra es mínima y cuánto vale dicha distancia?

Solución

La función es $x \cdot y = 16$, de donde $y = 16/x$

Un punto genérico es $X(x,y) = X(x, 16/x)$

$O(0,0)$

$$\text{La distancia es } d(O,X) = |OX| = [x^2 + 16^2/x^2]^{(1/2)}$$

Esta es la función que tenemos que hacer mínima. $d' = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 16^2/x^2}} \cdot \left(\frac{4x^3 \cdot x^2 - (x^4 + 16^2) \cdot 2x}{x^4} \right)$

$$\text{Haciendo } d' = 0, \text{ tenemos } 4x^5 - 2x(x^4 + 16^2) = 2x(x^4 - 256) = 0$$

$$\text{De donde obtenemos como soluciones } x = 0, \text{ y } x = (256)^{(1/4)} = 4$$

$$\text{El mínimo se obtiene para } x = 4, \text{ y la distancia pedida en años luz es } d(4) = [2 \cdot 256 / 16]^{(1/2)} = \sqrt{32}$$

Ejercicio 3 de la opción A del modelo 5 de 1997.

Sin desarrollar el determinante, demuestra que $\begin{vmatrix} a+2b & a & a+b \\ a+b & a+2b & a \\ a & a+b & a+2b \end{vmatrix} = 9b^2(a+b)$

Enuncia las propiedades de los determinantes que utilices.

Solución

Para empezar a la tercera fila le sumo la primera y la segunda


$$\begin{vmatrix} a+2b & a & a+b \\ a+b & a+2b & a \\ a & a+b & a+2b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+2b & a & a+b \\ a+b & a+2b & a \\ 3a+3b & 3a+3b & 3a+3b \end{vmatrix} =$$

saco factor común $3^a + 3b$ que se repite en la última fila

$$\begin{aligned}
 &= (3a+3b) \begin{vmatrix} a+2b & a & a+b \\ a+b & a+2b & a \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (3a+3b) \begin{vmatrix} a+2b & -2b & -b \\ a+b & b & -b \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (3a+3b) \cdot b \cdot b \begin{vmatrix} a+2b & -2 & -1 \\ a+b & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (3a+3b)b^2 \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\
 &= (3a+3b) \cdot b^2 \cdot 3 = 9 \cdot b^2(a+b)
 \end{aligned}$$

Ejercicio 4 de la opción A del modelo 5 de 1997.

Una circunferencia tiene por centro el punto $C = (1,0)$ y su diámetro es 2. Halla la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en el punto de abscisa $x = 3/2$ y ordenada positiva.

Solución

La ecuación de la circunferencia es $(x-1)^2 + y^2 = 1^2$

La ecuación de la recta tangente en $x = 3/2$, es $y - f(3/2) = f'(3/2) \cdot (x - 3/2)$

Hallamos la derivada implícita

$2(x-1) + 2y \cdot y' = 0$, de donde $y' = (1-x)/y$.

sustituyendo $x = 3/2$ en la circunferencia tenemos

$(3/2 - 1)^2 + y^2 = 1$, y operando nos sale $y = \pm \sqrt{3}/2$, por tanto para la abscisa $x = 3/2$, tenemos dos ordenadas en la circunferencia $y = +\sqrt{3}/2$ e $y = -\sqrt{3}/2$, por tanto tenemos dos rectas tangentes

$y - (+\sqrt{3}/2) = (-1/\sqrt{3}) \cdot (x - 3/2)$ e $y - (-\sqrt{3}/2) = (-1/\sqrt{3}) \cdot (x - 3/2)$

OPCIÓN B**Ejercicio 1 de la opción B del modelo 5 de 1997.**

(a) Determina razonadamente la expresión algebraica de una función continua $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que cumpla las

condiciones siguientes $f(3) = 9/2$, $f'(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 3, \\ x & \text{si } x > 3 \end{cases}$

(b) Razona si la función f es derivable en el punto $x = 3$.

(c) Esboza la gráfica de esta función f .

Solución

(a)

Aplicamos el teorema fundamental del cálculo integral

$$f(3) = 9/2, \quad f'(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 3, \\ x & \text{si } x > 3 \end{cases}, \quad f(x) = \int f'(x) dx = \begin{cases} \int 0 dx & \text{si } x < 3 \\ \int x dx & \text{si } x \geq 3 \end{cases} = \begin{cases} K & \text{si } x < 3 \\ \frac{x^2}{2} + M & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

De $f(3) = 9/2$, tenemos $f(3) = 9/2 + M = 9/2$, por tanto $M = 0$

Por otro lado al ser continua

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = f(3) = 9/2$$

Sustituyendo nos queda $K = 9/2$, por tanto la función pedida es $f(x) = \begin{cases} 9/2 & \text{si } x < 3 \\ \frac{x^2}{2} & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$

(b)

Para que sea derivable en $x = 3$, tiene que ser $f'(3^+) = f'(3^-)$


$$f'(3^+) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x) = 3$$

$$f'(3^-) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (0) = 0$$

Como $f'(3^+) \neq f'(3^-)$, no existe $f'(3)$

(c)

La gráfica de la función es una recta paralela al eje de abscisas de altura $9/2$ por un lado y por el otro en una parábola parecida a x^2 pero un poco más abierta.



Ejercicio 2 de la opción B del modelo 5 de 1997.

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = x e^{x-x \cdot x}$.

(a) Halla los máximos y mínimos relativos de esta función

(b) Calcula $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

Solución

(a)

$$f(x) = x e^{x-x \cdot x}$$

Estudiamos su primera derivada, de donde obtendremos crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos

$$f'(x) = 1 \cdot e^{x-x \cdot x} + x e^{x-x \cdot x} (1-2x) = e^{x-x \cdot x} \cdot (1+x-2x^2)$$

Igualando a cero $f'(x)$, como la exponencial nunca es cero obtenemos $2x^2 - x - 1 = 0$, y nos da como soluciones $x = 1$ y $x = -1/2$, que serán los posibles máximos y mínimos

Como $f'(x) < 0$ si $x < -1/2$, la función $f(x)$ es decreciente si $x < -1/2$

Como $f'(x) > 0$ si $-1/2 < x < 1$, la función $f(x)$ es creciente si $-1/2 < x < 1$

Como $f'(x) < 0$ si $x > 1$, la función $f(x)$ es decreciente si $x > 1$

Por definición en $x = -1/2$ hay un mínimo y en $x = 1$ hay un máximo

(b)

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot e^{-(x \cdot x - x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} [x / e^{(x \cdot x - x)}] = (\infty / \infty)$ aplicándole la Regla de L'Hôpital tenemos

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [x / e^{(x \cdot x - x)}] = \lim_{x \rightarrow \infty} [1 / e^{(x \cdot x - x)}] \cdot (2x - 1) = 1 / \infty = 0.$$

Ejercicio 3 de la opción B del modelo 5 de 1997.

(a) Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, ¿ para que valores del parámetro b no tiene inversa la matriz A ? Justifica

la respuesta

(b) Si existe, calcula la inversa para $b = -1$.

Solución

(a)

La matriz A no tiene inversa si y solo si $|A| = 0$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & b & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (1 - 2b) = 0. \text{ Por tanto dándole a } b \text{ el valor } \frac{1}{2}, \text{ la matriz } A \text{ no tiene inversa.}$$

(b)

$$\text{Si } b = -1, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad |A| = 1 \cdot (1 + 2) = 3; \quad A^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}; \quad \text{Adj}(A^t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}(A^t) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 4 de la opción B del modelo 5 de 1997.

Calcula razonadamente y dibuja el lugar geométrico de los puntos P del plano que verifican la siguiente propiedad: " El triángulo APB de vértices $A = (-7, 0)$, P y $B = (7, 0)$ es rectángulo en P ."

Solución

Si el triángulo APB es rectángulo en P entonces los vectores **PA** y **PB** son perpendiculares, es decir su producto escalar es cero $\mathbf{PA} \cdot \mathbf{PB} = 0$

$$\mathbf{PA} = (-7-x, -y); \quad \mathbf{PB} = (7-x, -y)$$

$\mathbf{PA} \cdot \mathbf{PB} = 0 = (-7-x)(7-x) + (-y)(-y) = -49 + x^2 + y^2 = 0$, es decir $x^2 + y^2 = 49 = 7^2$, lo cual es una circunferencia de centro (0,0) y radio 7

www.yoquieroaprobar.es