

NÚMEROS COMPLEJOS

1º Calcula el valor de $k \in \mathbb{R}$ para que el número complejo $z = \frac{4 - k \cdot i^{563}}{3 + i}$ sea imaginario puro.

2º Expresa en forma polar las soluciones de la ecuación en z : $\frac{z+i}{z-i} = \frac{3(z-i)}{z+i}$

3º Dado el número complejo $z = -2 + 4i$. Calcula:

- su módulo y argumento, exprésalo en forma polar y trigonométrica;
- expresa en forma polar su opuesto, conjugado e inverso;
- calcula z^{10} ;
- calcula sus raíces quintas.


4º Si $z = 2 + i$ es una raíz sexta de cierto complejo. Averigua:

- el resto de raíces sextas;
- de qué número son raíces sextas.

5º Halla todos los complejos que cumplen que su cubo coincide con su conjugado.

El alumno contestará breve y claramente a cada uno de los siguientes ejercicios, siendo el valor máximo de cada uno ellos el indicado en la siguiente tabla:

1º	2º	3º	4º	5º	Total
1	2	4	2	1	10



1º) Veamos 1º cuánto es i^{563} .

$$\frac{563}{16} \frac{4}{140} \Rightarrow i^{563} = i^3 = -i. \quad \left. \vphantom{\frac{563}{16} \frac{4}{140}} \right\} \Rightarrow$$

$$z = \frac{4+ki}{3+i} = \frac{4+ki}{3+i} \cdot \frac{3-i}{3-i} = \frac{12-4i+3ki-ki^2}{9-i^2} = \frac{12+k}{10} + i \frac{-4+3k}{10}$$

Para que z sea imaginario puro debe tener la parte real nula.

$$\frac{12+k}{10} = 0 \rightarrow 12+k=0 \Rightarrow \boxed{k=-12}$$

————— 0 —————

2º) Operando:

$$(z+i)^2 = 3 \cdot (z-i)^2 \Leftrightarrow z^2 + 2zi + i^2 = 3z^2 - 6zi + 3i^2$$

$$\Leftrightarrow 2z^2 - 8zi - 2 = 0 \Leftrightarrow \boxed{z^2 - 4zi - 1 = 0}$$

Es una ecuación de 2º grado:


$$z = \frac{-(-4i) \pm \sqrt{(-4i)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)}}{2 \cdot 1} = \frac{4i \pm \sqrt{16i^2 + 4}}{2} = \frac{4i \pm \sqrt{-12}}{2} = 2i \pm \sqrt{-3}$$

$$\sqrt{-3} = \sqrt{-1 \cdot 3} = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{3} = i\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow z = 2i \pm i\sqrt{3} = i(2 \pm \sqrt{3})$$

En forma polar $(2+\sqrt{3})_{90^\circ}$ y $(2-\sqrt{3})_{90^\circ}$

————— 0 —————



Igualdad de módulos: $r^5 = \sqrt{20} \rightarrow r = \sqrt[5]{\sqrt{20}} = \sqrt[10]{20}$.

Igualdad de argumentos: $5\alpha = 116^\circ + 360k \rightarrow \alpha = 23,2^\circ + 72k, k \in \mathbb{Z}$.

$$k=0 \rightarrow \alpha_0 = 23,2^\circ \rightarrow z_0 = \sqrt[10]{20}_{23,2^\circ}$$

$$k=1 \rightarrow \alpha_1 = 95,2^\circ \rightarrow z_1 = \sqrt[10]{20}_{95,2^\circ}$$

$$k=2 \rightarrow \alpha_2 = 167,2^\circ \rightarrow z_2 = \sqrt[10]{20}_{167,2^\circ}$$

$$k=3 \rightarrow \alpha_3 = 239,2^\circ \rightarrow z_3 = \sqrt[10]{20}_{239,2^\circ}$$

$$k=4 \rightarrow \alpha_4 = 311,2^\circ \rightarrow z_4 = \sqrt[10]{20}_{311,2^\circ}$$

do

4º Como las raíces sextas de un complejo son los vértices de un hexágono de centro el origen de coordenadas sus afijos tendrán el mismo módulo y se diferencian 2 consecutivos en 60° .

a) expresemos esa raíz conocida en forma polar.

$$z = 2 + i = (2, 1) \Rightarrow r^2 = 2^2 + 1^2 = 3 \rightarrow \boxed{r = \sqrt{3}}$$

$$\text{tg } \alpha = \frac{1}{2} \rightarrow \alpha = 27^\circ \text{ ó } 27^\circ + 180^\circ = 207^\circ$$

$$\text{como } z \in 1^\text{er} \text{ cuadrante} \Rightarrow \alpha = 27^\circ \Rightarrow \boxed{z = \sqrt{3}_{27^\circ}}$$

El resto de raíces serán

$$\sqrt{3}_{27^\circ + 60^\circ} = \sqrt{3}_{87^\circ}$$

$$\sqrt{3}_{87^\circ + 60^\circ} = \sqrt{3}_{147^\circ}$$

$$\sqrt{3}_{147^\circ + 60^\circ} = \sqrt{3}_{207^\circ}$$

$$\sqrt{3}_{207^\circ + 60^\circ} = \sqrt{3}_{267^\circ}$$

$$\sqrt{3}_{267^\circ + 60^\circ} = \sqrt{3}_{327^\circ}$$

