

## **INTEGRACION DE FUNCIONES CUADRADICAS**

Una función cuadrática, es de la forma:  $ax^2 + bx + c$  y si ésta aparece en el denominador, la integral que la contiene se hace fácil de encontrar, para la cual conviene diferenciar dos tipos esenciales en lo que se refiere al numerador.

### **EJERCICIOS DESARROLLADOS**

**5.1.-Encontrar:**  $\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 5}$

Solución.- Completando cuadrados, se tiene:

$$x^2 + 2x + 5 = (x^2 + 2x + \underline{\quad}) + 5 - \underline{\quad} = (x^2 + 2x + 1) + 5 - 1 = (x^2 + 2x + 1) + 4$$

$x^2 + 2x + 5 = (x+1)^2 + 2^2$ , luego se tiene:

$$\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 5} = \int \frac{dx}{(x+1)^2 + 2^2} . \text{ Sea: } w = x+1, dw = dx; a = 2$$

$$\int \frac{dx}{(x+1)^2 + 2^2} = \int \frac{dw}{w^2 + 2^2} = \frac{1}{2} \operatorname{arc \tau g} \frac{w}{a} + c = \frac{1}{2} \operatorname{arc \tau g} \frac{x+1}{2} + c$$

**Respuesta:**  $\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 5} = \frac{1}{2} \operatorname{arc \tau g} \frac{x+1}{2} + c$

**5.2.-Encontrar:**  $\int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 2}$

Solución.-  $\int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 2} = \int \frac{dx}{4(x^2 + x + \frac{1}{2})} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x^2 + x + \frac{1}{2}}$

Completando cuadrados:

$$x^2 + x + \frac{1}{2} = (x^2 + x + \underline{\quad}) + \frac{1}{2} - \underline{\quad} = (x^2 + x + \frac{1}{4}) + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = (x^2 + x + \frac{1}{4}) + \frac{1}{4}$$

$(x^2 + x + \frac{1}{4}) = (x + \frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2$ , luego se tiene:

$$\frac{1}{4} \int \frac{dx}{x^2 + x + \frac{1}{2}} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{(x + \frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2} . \text{ Sea: } w = x + \frac{1}{2}, dw = dx; a = \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{dx}{(x + \frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2} = \frac{1}{4} \int \frac{dw}{w^2 + a^2} = \frac{1}{4} \frac{1}{a} \operatorname{arc \tau g} \frac{w}{a} + c = \frac{1}{4} \frac{1}{\frac{1}{2}} \operatorname{arc \tau g} \frac{x + \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} + c$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{arc \tau g} \frac{\frac{2x+1}{2}}{\frac{1}{2}} + c = \frac{1}{2} \operatorname{arc \tau g} (2x+1) + c$$

**Respuesta:**  $\int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 2} = \frac{1}{2} \arctan(2x+1) + c$

**5.3.-Encontrar:**  $\int \frac{2xdx}{x^2 - x + 1}$

Solución.-  $u = x^2 - x + 1, du = (2x-1)dx$

$$\int \frac{2xdx}{x^2 - x + 1} = \int \frac{(2x-1+1)dx}{x^2 - x + 1} = \int \frac{(2x-1)dx}{x^2 - x + 1} + \int \frac{dx}{x^2 - x + 1} = \int \frac{du}{u} + \int \frac{dx}{x^2 - x + 1}$$

Completando cuadrados:

$$x^2 - x + 1 = (x^2 - x + \underline{\underline{\underline{\underline{}}}}) + 1 \underline{\underline{\underline{\underline{}}}} = (x^2 - x + \frac{1}{4}) + 1 - \frac{1}{4}$$

$$x^2 - x + 1 = (x^2 - \cancel{\frac{1}{2}})^2 + \frac{3}{4}, \text{ Luego se tiene:}$$

$$\int \frac{du}{u} + \int \frac{dx}{x^2 - x + 1} = \int \frac{du}{u} + \int \frac{du}{(x - \cancel{\frac{1}{2}})^2 + \frac{3}{4}} = \int \frac{du}{u} + \int \frac{dx}{(x - \cancel{\frac{1}{2}})^2 + (\cancel{\sqrt{3}}/2)^2}$$

$$w = x - \frac{1}{2}, dw = dx; a = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ luego:}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{du}{u} + \int \frac{dx}{(x - \cancel{\frac{1}{2}})^2 + (\cancel{\sqrt{3}}/2)^2} &= \int \frac{du}{u} + \int \frac{dw}{w^2 + a^2} = \ell \eta |u| + \frac{1}{a} \arctan \frac{w}{a} + c \\ &= \ell \eta |x^2 - x + 1| + \frac{1}{\sqrt{3}/2} \arctan \tau g \frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} + c = \ell \eta |x^2 - x + 1| + \frac{2\sqrt{3}}{3} \arctan \tau g \frac{\cancel{x - \frac{1}{2}}}{\cancel{\sqrt{3}/2}} + c \end{aligned}$$

**Respuesta:**  $\int \frac{2xdx}{x^2 - x + 1} = \ell \eta |x^2 - x + 1| + \frac{2\sqrt{3}}{3} \arctan \tau g \frac{\cancel{x - \frac{1}{2}}}{\cancel{\sqrt{3}/2}} + c$

**5.4.-Encontrar:**  $\int \frac{x^2 dx}{x^2 + 2x + 5}$

Solución.-

$$\int \frac{x^2 dx}{x^2 + 2x + 5} = \int \left(1 - \frac{2x+5}{x^2 + 2x + 5}\right) dx = \int dx - \int \frac{2x+5}{x^2 + 2x + 5} dx,$$

Sea:  $u = x^2 + 2x + 5, du = (2x+2)dx$

Ya se habrá dado cuenta el lector que tiene que construir en el numerador, la expresión:  $(2x+2)dx$ . Luego se tiene:

$$= \int dx - \int \frac{(2x+2+3)}{x^2 + 2x + 5} dx = \int dx - \int \frac{(2x+2)dx}{x^2 + 2x + 5} + 3 \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 5},$$

Completando cuadrados, se tiene:

$$x^2 + 2x + 5 = (x^2 + 2x + \underline{\underline{\underline{\underline{}}}}) + 5 - \underline{\underline{\underline{\underline{}}}} = (x^2 + 2x + 1) + 5 - 1 = (x^2 + 2x + 1) + 4 = (x+1)^2 + 2^2$$

Luego se admite como forma equivalente a la anterior:

$$\int dx - \int \frac{du}{u} - 3 \int \frac{dx}{(x+1)^2 + 2^2}, \text{ Sea: } w = x+1, dw = dx; a = 2, \text{ luego:}$$

$$\begin{aligned}
&= \int dx - \int \frac{du}{u} - 3 \int \frac{dw}{w^2 + a^2} = x - \ell \eta |u| - 3 \frac{1}{a} \operatorname{arc} \tau g \frac{w}{a} + c \\
&= x - \ell \eta |x^2 + 2x + 5| - \frac{3}{2} \operatorname{arc} \tau g \frac{x+1}{2} + c
\end{aligned}$$

**Respuesta:**  $\int \frac{x^2 dx}{x^2 + 2x + 5} = x - \ell \eta |x^2 + 2x + 5| - \frac{3}{2} \operatorname{arc} \tau g \frac{x+1}{2} + c$

**5.5.-Encontrar:**  $\int \frac{2x-3}{x^2 + 2x + 2} dx$

Solución.- Sea:  $u = x^2 + 2x + 2, du = (2x+2)dx$

$$\begin{aligned}
\int \frac{2x-3}{x^2 + 2x + 2} dx &= \int \frac{2x+2-5}{x^2 + 2x + 2} dx = \int \frac{2x+2}{x^2 + 2x + 2} dx - 5 \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 2} \\
&= \int \frac{du}{u} dx - 5 \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}, \text{ Completando cuadrados:}
\end{aligned}$$

$$x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1^2. \text{ Luego:}$$

$$\begin{aligned}
&= \int \frac{du}{u} dx - 5 \int \frac{dx}{(x+1)^2 + 1^2}, \text{ Sea: } w = x+1, du = dx; a = 1. \text{ Entonces se tiene:} \\
&= \int \frac{du}{u} dx - 5 \int \frac{dx}{w^2 + a^2} = \ell \eta |u| - 5 \frac{1}{a} \operatorname{arc} \tau g \frac{w}{a} + c = \ell \eta |x^2 + 2x + 5| - 5 \operatorname{arc} \tau g (x+1) + c
\end{aligned}$$

**Respuesta:**  $\int \frac{2x-3}{x^2 + 2x + 2} dx = \ell \eta |x^2 + 2x + 5| - 5 \operatorname{arc} \tau g (x+1) + c$

**5.6.-Encontrar:**  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 2x - 8}}$

Solución.- Completando cuadrados se tiene:  $x^2 - 2x - 8 = (x-1)^2 - 3^2$

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 2x - 8}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^2 - 3^2}}, \text{ Sea: } w = x-1, dw = dx; a = 3 \\
&= \int \frac{dw}{\sqrt{w^2 - a^2}} = \ell \eta |w + \sqrt{w^2 - a^2}| + c = \ell \eta |x-1 + \sqrt{x^2 - 2x - 8}| + c
\end{aligned}$$

**Respuesta:**  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 2x - 8}} = \ell \eta |x-1 + \sqrt{x^2 - 2x - 8}| + c$

**5.7.-Encontrar:**  $\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}}$

Solución.- Sea:  $u = x^2 - 2x + 5, du = (2x-2)dx$ . Luego:

$$\begin{aligned}
\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}} &= \frac{1}{2} \int \frac{2x dx}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}} = \frac{1}{2} \int \frac{2x-2+2}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}} dx \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{(2x-2) dx}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}} + \frac{2}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{u}} + \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}}
\end{aligned}$$

Completando cuadrados se tiene:  $x^2 - 2x + 5 = (x-1)^2 + 2^2$ . Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int u^{-\frac{1}{2}} du + \int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^2 + 2^2}} . \text{ Sea: } w = x-1, dw = dx; a = 2 \\
&= \frac{1}{2} \int u^{-\frac{1}{2}} du + \int \frac{dw}{\sqrt{w^2 + a^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\cancel{u}} + \ell \eta \left| w + \sqrt{w^2 + a^2} \right| + c = u^{\frac{1}{2}} + \ell \eta \left| w + \sqrt{w^2 + a^2} \right| + c \\
&= \sqrt{x^2 + 2x + 5} + \ell \eta \left| x-1 + \sqrt{x^2 - 2x + 5} \right| + c
\end{aligned}$$

**Respuesta:**  $\int \frac{xdx}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}} = \sqrt{x^2 - 2x + 5} + \ell \eta \left| x-1 + \sqrt{x^2 - 2x + 5} \right| + c$

**5.8.-Encontrar:**  $\int \frac{(x+1)dx}{\sqrt{2x-x^2}}$

Solución.- Sea:  $u = 2x - x^2, du = (2-2x)dx$ . Luego:

$$\begin{aligned}
\int \frac{(x+1)dx}{\sqrt{2x-x^2}} &= -\frac{1}{2} \int \frac{-2(x+1)dx}{\sqrt{2x-x^2}} = -\frac{1}{2} \int \frac{(-2x-2)dx}{\sqrt{2x-x^2}} = -\frac{1}{2} \int \frac{(-2x+2-4)dx}{\sqrt{2x-x^2}} \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{(2-2x)dx}{\sqrt{2x-x^2}} + \frac{4}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}} = -\frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{u}} + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}}
\end{aligned}$$

Completando cuadrados:  $2x - x^2 = -(x^2 - 2x) = -(x^2 - 2x + 1 - 1) = -(x^2 - 2x + 1) + 1 = -(x-1)^2 + 1 = 1 - (x-1)^2$ . Luego la expresión anterior es equivalente a:

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{2} \int u^{-\frac{1}{2}} du + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-(x-1)^2}} . \text{ Sea: } w = x-1, dw = dx; a = 1. \text{ Entonces:} \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\cancel{u}} du + 2 \int \frac{dw}{\sqrt{a^2-w^2}} = -u^{\frac{1}{2}} + 2 \arcsen \frac{w}{a} + c = -\sqrt{2x-x^2} + 2 \arcsen(x-1) + c
\end{aligned}$$

**Respuesta:**  $\int \frac{(x+1)dx}{\sqrt{2x-x^2}} = -\sqrt{2x-x^2} + 2 \arcsen(x-1) + c$

**5.9.-Encontrar:**  $\int \frac{xdx}{\sqrt{5x^2-2x+1}}$

Solución.- Sea:  $u = 5x^2 - 2x + 1, du = (10x-2)dx$ . Luego:

$$\begin{aligned}
\int \frac{xdx}{\sqrt{5x^2-2x+1}} &= \frac{1}{10} \int \frac{10xdx}{\sqrt{5x^2-2x+1}} = \frac{1}{10} \int \frac{(10x-2+2)dx}{\sqrt{5x^2-2x+1}} \\
&= \frac{1}{10} \int \frac{(10x-2)dx}{\sqrt{5x^2-2x+1}} + \frac{2}{10} \int \frac{dx}{\sqrt{5x^2-2x+1}} = \frac{1}{10} \int \frac{du}{\sqrt{u}} + \frac{1}{5} \int \frac{dx}{\sqrt{5x^2-2x+1}} \\
&= \frac{1}{10} \int \frac{du}{\sqrt{u}} + \frac{1}{5} \int \frac{dx}{\sqrt{5(x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{5})}} = \frac{1}{10} \int u^{-\frac{1}{2}} du + \frac{1}{5\sqrt{5}} \int \frac{dx}{\sqrt{(x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{5})}}
\end{aligned}$$

Completando cuadrados:  $x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{5} = (x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{25}) + \frac{1}{5} - \frac{1}{25}$

$$\begin{aligned}
&= (x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{25}) + \frac{1}{5} - \frac{1}{25} = (x - \frac{1}{5})^2 + (\frac{2}{5})^2, \text{ Luego es equivalente:}
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{10} \int u^{-\frac{1}{2}} du + \frac{1}{5\sqrt{5}} \int \frac{dx}{\sqrt{(x - \frac{1}{5})^2 + (\frac{2}{5})^2}}, \text{ Sea: } w = x - \frac{1}{5}, dw = dx; a = \frac{2}{5},$$

$$\begin{aligned} \text{Entonces: } &= \frac{1}{10} \int u^{-\frac{1}{2}} du + \frac{1}{5\sqrt{5}} \int \frac{dw}{\sqrt{w^2 + a^2}} = \frac{1}{10} \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + \frac{1}{5\sqrt{5}} \ell \eta \left| w + \sqrt{w^2 + a^2} \right| + c \\ &= \frac{\sqrt{5x^2 - 2x + 1}}{5} + \frac{1}{5\sqrt{5}} \ell \eta \left| x - \frac{1}{5} + \frac{\sqrt{5x^2 - 2x + 1}}{\sqrt{5}} \right| + c \end{aligned}$$

$$\text{Respuesta: } \int \frac{xdx}{\sqrt{5x^2 - 2x + 1}} = \frac{\sqrt{5x^2 - 2x + 1}}{5} + \frac{\sqrt{5}}{25} \ell \eta \left| x - \frac{1}{5} + \frac{\sqrt{5x^2 - 2x + 1}}{\sqrt{5}} \right| + c$$

$$\text{5.10.-Encontrar: } \int \frac{xdx}{\sqrt{5+4x-x^2}}$$

Solución.-  $u = 5 + 4x - x^2, du = (4 - 2x)dx$ . Luego:

$$\begin{aligned} \int \frac{xdx}{\sqrt{5+4x-x^2}} &= -\frac{1}{2} \int \frac{-2xdx}{\sqrt{5+4x-x^2}} = -\frac{1}{2} \int \frac{(-2x+4-4)dx}{\sqrt{5+4x-x^2}} \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{(4-2x)dx}{\sqrt{5+4x-x^2}} + \frac{4}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{5+4x-x^2}} = -\frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{u}} + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{5+4x-x^2}} \end{aligned}$$

Completando cuadrados:  $5 + 4x - x^2 = -(x^2 - 4x - 5) = -(x^2 - 4x + 4 - 4 - 5)$

$$= -(x^2 - 4x + 4) + 9 = 9 - (x - 2)^2 = 3^2 - (x - 2)^2. \text{ Equivalente a:}$$

$$\begin{aligned} &= -\frac{1}{2} \int u^{-\frac{1}{2}} du + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{3^2 - (x - 2)^2}}. \text{ Sea: } w = x - 2, dw = dx; a = 3. \text{ Entonces:} \\ &= -\frac{1}{2} \int u^{-\frac{1}{2}} du + 2 \int \frac{dw}{\sqrt{a^2 - w^2}} = -\frac{1}{2} \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\cancel{1/\cancel{2}}} + 2 \arcsen \frac{w}{a} + c \\ &= -\sqrt{5+4x-x^2} + 2 \arcsen \frac{x-2}{3} + c \end{aligned}$$

$$\text{Respuesta: } \int \frac{xdx}{\sqrt{5+4x-x^2}} = -\sqrt{5+4x-x^2} + 2 \arcsen \frac{x-2}{3} + c$$

$$\text{5.11.-Encontrar: } \int \frac{dx}{\sqrt{2+3x-2x^2}}$$

Solución.- Completando cuadrados se tiene:

$$\begin{aligned} 2 + 3x - 2x^2 &= -(2x^2 - 3x - 2) = -2(x^2 - \frac{3}{2}x - 1) = -2(x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{9}{16} - \frac{25}{16}) \\ &= -2 \left[ (x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{9}{16}) - \frac{25}{16} \right] = -2 \left[ (x - \frac{3}{4})^2 - (\frac{5}{4})^2 \right] = 2 \left[ (\frac{5}{4})^2 - (x - \frac{3}{4})^2 \right], \text{ luego:} \\ \int \frac{dx}{\sqrt{2+3x-2x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{2[(\frac{5}{4})^2 - (x - \frac{3}{4})^2]}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{(\frac{5}{4})^2 - (x - \frac{3}{4})^2}} \end{aligned}$$

Sea:  $w = x - \frac{3}{4}, dw = dx, a = \frac{5}{4}$ . Luego:

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{(5/4)^2 - (x - 3/4)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dw}{\sqrt{a^2 - w^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsen \frac{w}{a} + c = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsen \frac{x - 3/4}{5/4} + c \\
&= \frac{\sqrt{2}}{2} \arcsen \frac{4x - 3}{5} + c
\end{aligned}$$

**Respuesta:**  $\int \frac{dx}{\sqrt{2+3x-2x^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \arcsen \frac{4x-3}{5} + c$

**5.12.-Encontrar:**  $\int \frac{dx}{3x^2+12x+42}$

Solución.-

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{3x^2+12x+42} &= \int \frac{dx}{3(x^2+4x+14)} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{(x^2+4x+14)} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{(x^2+4x+4+10)} = \\
&= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{(x+2)^2+10} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{(x+2)^2+(\sqrt{10})^2} = \frac{1}{3} \frac{1}{\sqrt{10}} \arctan \frac{x+2}{\sqrt{10}} + c
\end{aligned}$$

**Respuesta:**  $\int \frac{dx}{3x^2+12x+42} = \frac{\sqrt{10}}{30} \arctan \frac{x+2}{\sqrt{10}} + c$

**5.13.-Encontrar:**  $\int \frac{3x-2}{x^2-4x+5} dx$

Solución.- Sea:  $u = x^2 - 4x + 5, du = (2x - 4)dx$ , Luego:

$$\begin{aligned}
\int \frac{3x-2}{x^2-4x+5} dx &= 3 \int \frac{xdx}{x^2-4x+5} - 2 \int \frac{dx}{x^2-4x+5} = 3 \int \frac{(x-2)+2}{x^2-4x+5} dx - 2 \int \frac{dx}{x^2-4x+5} \\
&= 3 \int \frac{(x-2)}{x^2-4x+5} dx + 6 \int \frac{dx}{x^2-4x+5} - 2 \int \frac{dx}{x^2-4x+5} = \frac{3}{2} \int \frac{du}{u} + 4 \int \frac{dx}{x^2-4x+5} \\
&= \frac{3}{2} \int \frac{du}{u} + 4 \int \frac{dx}{(x^2-4x+4)+1} = \frac{3}{2} \ell \eta |x^2-4x+5| + 4 \int \frac{dx}{(x-2)^2+1} \\
&= \frac{3}{2} \ell \eta |x^2-4x+5| + 4 \arctan(x-2) + c
\end{aligned}$$

**Respuesta:**  $\int \frac{3x-2}{x^2-4x+5} dx = \frac{3}{2} \ell \eta |x^2-4x+5| + 4 \arctan(x-2) + c$

## EJERCICIOS PROPUESTOS

Usando Esencialmente la técnica tratada, encontrar las integrales siguientes:

**5.14.-**  $\int \sqrt{x^2+2x-3} dx$

**5.15.-**  $\int \sqrt{12+4x-x^2} dx$

**5.16.-**  $\int \sqrt{x^2+4x} dx$

**5.17.-**  $\int \sqrt{x^2-8x} dx$

**5.18.-**  $\int \sqrt{6x-x^2} dx$

**5.19.-**  $\int \frac{(5-4x)dx}{\sqrt{12x-4x^2-8}}$

$$5.20.- \int \frac{xdx}{\sqrt{27+6x-x^2}}$$

$$5.23.- \int \frac{dx}{4x^2+4x+10}$$

$$5.26.- \frac{2}{3} \int \frac{(x+\frac{3}{2})dx}{9x^2-12x+8}$$

$$5.29.- \int \frac{3dx}{\sqrt{80+32x-4x^2}}$$

$$5.32.- \int \sqrt{12-8x-4x^2} dx$$

$$5.35.- \int \frac{(1-x)dx}{\sqrt{8+2x-x^2}}$$

$$5.38.- \int \frac{(x+2)dx}{x^2+2x+2}$$

$$5.41.- \int \frac{(x-1)dx}{x^2+2x+2}$$

$$5.21.- \int \frac{(x-1)dx}{3x^2-4x+3}$$

$$5.24.- \int \frac{(2x+2)dx}{x^2-4x+9}$$

$$5.27.- \int \frac{(x+6)dx}{\sqrt{5-4x-x^2}}$$

$$5.30.- \int \frac{dx}{\sqrt{12x-4x^2-8}}$$

$$5.33.- \sqrt{x^2-x+\frac{5}{4}} dx$$

$$5.36.- \int \frac{xdx}{x^2+4x+5}$$

$$5.39.- \int \frac{(2x+1)dx}{x^2+8x-2}$$

$$5.22.- \int \frac{(2x-3)dx}{x^2+6x+15}$$

$$5.25.- \int \frac{(2x+4)dx}{\sqrt{4x-x^2}}$$

$$5.28.- \int \frac{dx}{2x^2+20x+60}$$

$$5.31.- \int \frac{5dx}{\sqrt{28-12x-x^2}}$$

$$5.34.- \int \frac{dx}{x^2-2x+5}$$

$$5.37.- \int \frac{(2x+3)dx}{4x^2+4x+5}$$

$$5.40.- \int \frac{dx}{\sqrt{-x^2-6x}}$$

## RESPUESTAS

$$5.14.- \int \sqrt{x^2-2x-3} dx$$

Solución.- Completando cuadrados se tiene:

$$x^2-2x-3=(x^2-2x+1)-3-1=(x-1)^2-4=(x-1)^2-2^2$$

Haciendo:  $u = x-1$ ,  $du = dx$ ;  $a = 2$ , se tiene:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x^2-2x-3} dx &= \int \sqrt{(x-1)^2-2^2} dx = \int \sqrt{u^2-a^2} du \\ &= \frac{1}{2} u \sqrt{u^2-a^2} - \frac{1}{2} a^2 \ell \eta \left| u + \sqrt{u^2-a^2} \right| + c \\ &= \frac{1}{2} (x-1) \sqrt{(x-1)^2-2^2} - \frac{1}{2} 2^2 \ell \eta \left| (x-1) + \sqrt{(x-1)^2-2^2} \right| + c \\ &= \frac{1}{2} (x-1) \sqrt{x^2-2x-3} - 2 \ell \eta \left| (x-1) + \sqrt{x^2-2x-3} \right| + c \end{aligned}$$

$$5.15.- \int \sqrt{12+4x-x^2} dx$$

Solución.- Completando cuadrados se tiene:

$$12+4x-x^2=-(x^2-4x-12)=-(x^2-4x+4-12-4)=-(x^2-4x+4)+16$$

$$=4^2-(x-2)^2$$

Haciendo:  $u = x-2$ ,  $du = dx$ ;  $a = 4$ , se tiene:

$$\int \sqrt{12+4x-x^2} dx = \int \sqrt{4^2-(x-2)^2} dx = \int \sqrt{a^2-u^2} du = \frac{1}{2} u \sqrt{a^2-u^2} + \frac{1}{2} a^2 \arcsen \frac{u}{a} + c$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}(x-2)\sqrt{4^2 - (x-2)^2} + \frac{1}{2}4^2 \arcsen \frac{(x-2)}{4} + c \\
&= \frac{1}{2}(x-2)\sqrt{12+4x-x^2} + 8\arcsen \frac{(x-2)}{4} + c
\end{aligned}$$

**5.16.** -  $\int \sqrt{x^2 + 4x} dx$

Solución.- Completando cuadrados se tiene:

$$x^2 + 4x = (x^2 + 4x + 4) - 4 = (x+2)^2 - 2^2$$

Haciendo:  $u = x+2, du = dx; a = 2$ , se tiene:

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{x^2 + 4x} dx &= \int \sqrt{(x+2)^2 - 2^2} dx = \int \sqrt{u^2 - a^2} du \\
&= \frac{1}{2}u\sqrt{u^2 - a^2} - \frac{1}{2}a^2 \ell \eta \left| u + \sqrt{u^2 - a^2} \right| + c \\
&= \frac{1}{2}(x+2)\sqrt{(x+2)^2 - 2^2} - \frac{1}{2}2^2 \ell \eta \left| (x+2) + \sqrt{(x+2)^2 - 2^2} \right| + c \\
&= \frac{(x+2)}{2}\sqrt{x^2 + 4x} - 2\ell \eta \left| (x+2) + \sqrt{x^2 + 4x} \right| + c
\end{aligned}$$

**5.17.** -  $\int \sqrt{x^2 - 8x} dx$

Solución.- Completando cuadrados se tiene:

$$x^2 - 8x = (x^2 - 8x + 16) - 16 = (x-4)^2 - 4^2$$

Haciendo:  $u = x-4, du = dx; a = 4$ , se tiene:

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{(x-4)^2 - 4^2} dx &= \sqrt{u^2 - a^2} du = \frac{1}{2}u\sqrt{u^2 - a^2} - \frac{1}{2}a^2 \ell \eta \left| u + \sqrt{u^2 - a^2} \right| + c \\
&= \frac{1}{2}(x-4)\sqrt{(x-4)^2 - 4^2} - \frac{1}{2}4^2 \ell \eta \left| (x-4) + \sqrt{(x-4)^2 - 4^2} \right| + c \\
&= \frac{(x-4)}{2}\sqrt{x^2 - 8x} - 8\ell \eta \left| (x-4) + \sqrt{x^2 - 8x} \right| + c
\end{aligned}$$

**5.18.** -  $\int \sqrt{6x - x^2} dx$

Solución.- Completando cuadrados se tiene:

$$6x - x^2 = -(x^2 - 6x) = -(x^2 - 6x + 9 - 9) = -(x^2 - 6x + 9) + 9 = 3^2 - (x-3)^2$$

Haciendo:  $u = x-3, du = dx; a = 3$ , se tiene:

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{6x - x^2} dx &= \sqrt{3^2 - (x-3)^2} dx = \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{1}{2}u\sqrt{a^2 - u^2} + \frac{1}{2}a^2 \arcsen \frac{u}{a} + c \\
&= \frac{1}{2}(x-3)\sqrt{3^2 - (x-3)^2} + \frac{1}{2}3^2 \arcsen \frac{x-3}{3} + c \\
&= \frac{(x-3)}{2}\sqrt{6x - x^2} + \frac{9}{2}\arcsen \frac{x-3}{3} + c
\end{aligned}$$

**5.19.** -  $\int \frac{(5-4x)dx}{\sqrt{12x - 4x^2 - 8}}$

Solución.- Sea:  $u = 12x - 4x^2 - 8, du = (12-8x)dx$

$$\begin{aligned}
\int \frac{(5-4x)dx}{\sqrt{12x-4x^2-8}} &= \int \frac{(-4x+5)dx}{\sqrt{12x-4x^2-8}} = \frac{1}{2} \int \frac{2(-4x+5)dx}{\sqrt{12x-4x^2-8}} = \frac{1}{2} \int \frac{(-8x+10)dx}{\sqrt{12x-4x^2-8}} \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{(-8x+12-2)dx}{\sqrt{12x-4x^2-8}} = \frac{1}{2} \int \frac{(-8x+12)dx}{\sqrt{12x-4x^2-8}} - \int \frac{dx}{\sqrt{12x-4x^2-8}} \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{(-8x+12)dx}{\sqrt{12x-4x^2-8}} - \int \frac{dx}{\sqrt{4(3x-x^2-2)}} = \frac{1}{2} \int \frac{(-8x+12)dx}{\sqrt{12x-4x^2-8}} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{3x-x^2-2}}
\end{aligned}$$

Completando cuadrados se tiene:

$$\begin{aligned}
3x-x^2-2 &= -(x^2-3x+2) = -(x^2-3x+\frac{9}{4}-\frac{9}{4}+2) = -(x^2-3x+\frac{9}{4})+\frac{9}{4}-2 \\
&= -(x-\frac{3}{2})^2 + \frac{1}{4} = (\frac{1}{2})^2 - (x-\frac{3}{2})^2 \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{(-8x+12)dx}{\sqrt{12x-4x^2-8}} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{(\frac{1}{2})^2-(x-\frac{3}{2})^2}}
\end{aligned}$$

Haciendo:  $u = 12x-4x^2-8$ ,  $du = (12-8x)dx$  y  $w = x-\frac{3}{2}$ ,  $dw = dx$ , entonces:

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{u}} - \frac{1}{2} \int \frac{dw}{\sqrt{(\frac{1}{2})^2-w^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{u}} - \frac{1}{2} \arcsen \frac{w}{\frac{1}{2}} + c \\
&= u^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} \arcsen 2w + c = \sqrt{12x-4x^2-8} - \frac{1}{2} \arcsen(2x-3) + c
\end{aligned}$$

**5.20.-**  $\int \frac{x dx}{\sqrt{27+6x-x^2}}$

Solución.- Sea:  $u = 27+6x-x^2$ ,  $du = (6-2x)dx$

$$\begin{aligned}
\int \frac{x dx}{\sqrt{27+6x-x^2}} &= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x dx}{\sqrt{27+6x-x^2}} = -\frac{1}{2} \int \frac{(-2x+6-6)dx}{\sqrt{27+6x-x^2}} \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{(-2x+6)dx}{\sqrt{27+6x-x^2}} + 3 \int \frac{dx}{\sqrt{27+6x-x^2}} = -\frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{u}} + 3 \int \frac{dx}{\sqrt{27+6x-x^2}}
\end{aligned}$$

Completando cuadrados se tiene:

$$\begin{aligned}
27+6x-x^2 &= -(x^2-6x-27) = -(x^2-6x+9-9-27) = -(x^2-6x+9)+36 \\
&= 6^2-(x-3)^2, \text{ Luego:}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{2} \int u^{-\frac{1}{2}} du + 3 \int \frac{dx}{\sqrt{6^2-(x-3)^2}} = -\frac{1}{2} \int \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{u}} + 3 \arcsen \frac{x-3}{6} + c \\
&= -u^{\frac{1}{2}} + 3 \arcsen \frac{x-3}{6} + c = -\sqrt{27+6x-x^2} + 3 \arcsen \frac{x-3}{6} + c
\end{aligned}$$

**5.21.-**  $\int \frac{(x-1)dx}{3x^2-4x+3}$

Solución.- Sea:  $u = 3x^2-4x+3$ ,  $du = (6x-4)dx$

$$\int \frac{(x-1)dx}{3x^2-4x+3} = \frac{1}{6} \int \frac{(6x-6)dx}{3x^2-4x+3} = \frac{1}{6} \int \frac{(6x-4-2)dx}{3x^2-4x+3} = \frac{1}{6} \int \frac{(6x-4)dx}{3x^2-4x+3} - \frac{1}{3} \int \frac{dx}{3x^2-4x+3}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{6} \int \frac{du}{u} - \frac{1}{3} \int \frac{dx}{3x^2 - 4x + 3} = \frac{1}{6} \int \frac{du}{u} - \frac{1}{3} \int \frac{dx}{3(x^2 - \frac{4}{3}x + 1)} \\
&= \frac{1}{6} \int \frac{du}{u} - \frac{1}{9} \int \frac{dx}{(x^2 - \frac{4}{3}x + 1)}
\end{aligned}$$

Completando cuadrados se tiene:

$$\begin{aligned}
x^2 - \frac{4}{3}x + 1 &= (x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{4}{9}) + 1 - \frac{4}{9} = (x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{4}{9}) + \frac{5}{9} = (x - \frac{2}{3})^2 + (\frac{\sqrt{5}}{3})^2 \\
&= \frac{1}{6} \int \frac{du}{u} - \frac{1}{9} \int \frac{dx}{(x - \frac{2}{3})^2 + (\frac{\sqrt{5}}{3})^2} = \frac{1}{6} \ell \eta |u| - \frac{1}{9} \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arc \tau g} \frac{x - \frac{2}{3}}{\frac{\sqrt{5}}{3}} + c \\
&= \frac{1}{6} \ell \eta |3x^2 - 4x + 3| - \frac{\sqrt{5}}{15} \operatorname{arc \tau g} \frac{3x - 2}{\sqrt{5}} + c
\end{aligned}$$

**5.22.-**  $\int \frac{(2x-3)dx}{x^2+6x+15}$

Solución.- Sea:  $u = x^2 + 6x + 15$ ,  $du = (2x + 6)dx$

$$\begin{aligned}
\int \frac{(2x-3)dx}{x^2+6x+15} &= \int \frac{(2x+6-9)dx}{x^2+6x+15} = \int \frac{(2x+6)dx}{x^2+6x+15} - 9 \int \frac{dx}{x^2+6x+15} \\
&= \int \frac{du}{u} - 9 \int \frac{dx}{x^2+6x+15}, \text{ Completando cuadrados se tiene:} \\
x^2+6x+15 &= (x^2+6x+9)+15-9=(x+3)^2+6^2=(x+3)^2+(\sqrt{6})^2 \\
&= \int \frac{du}{u} - 9 \int \frac{dx}{(x+3)^2+(\sqrt{6})^2} = \ell \eta |x^2+6x+15| - 9 \frac{1}{\sqrt{6}} \operatorname{arc \tau g} \frac{x+3}{\sqrt{6}} + c \\
&= \ell \eta |x^2+6x+15| - \frac{3\sqrt{6}}{2} \operatorname{arc \tau g} \frac{x+3}{\sqrt{6}} + c
\end{aligned}$$

**5.23.-**  $\int \frac{dx}{4x^2+4x+10}$

Solución.-

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{4x^2+4x+10} &= \int \frac{dx}{4(x^2+x+\frac{5}{2})} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{(x^2+x+\frac{5}{2})}, \text{ Completando cuadrados:} \\
x^2+x+\frac{5}{2} &= (x^2+x+\frac{1}{4})+\frac{5}{2}-\frac{1}{4}=(x+\frac{1}{2})^2+\frac{9}{4}=(x+\frac{1}{2})^2+(\frac{3}{2})^2 \\
&= \frac{1}{4} \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2+(\frac{3}{2})^2} = \frac{1}{4} \frac{1}{\frac{3}{2}} \operatorname{arc \tau g} \frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} + c = \frac{1}{6} \operatorname{arc \tau g} \frac{2x+1}{3} + c
\end{aligned}$$

**5.24.-**  $\int \frac{(2x+2)dx}{x^2-4x+9}$

Solución.- Sea:  $u = x^2 - 4x + 9$ ,  $du = (2x - 4)dx$

$$\begin{aligned}
\int \frac{(2x+2)dx}{x^2-4x+9} &= \int \frac{(2x-4+6)dx}{x^2-4x+9} = \int \frac{(2x-4)dx}{x^2-4x+9} + 6 \int \frac{dx}{x^2-4x+9} \\
&= \int \frac{du}{u} + 6 \int \frac{dx}{x^2-4x+9}, \text{ Completando cuadrados se tiene:} \\
x^2-4x+9 &= (x^2-4x+4)+9-4 = (x-2)^2+5 = (x-2)^2+(\sqrt{5})^2, \\
&= \int \frac{du}{u} + 6 \int \frac{dx}{(x-2)^2+(\sqrt{5})^2} = \ell \eta |u| + 6 \frac{1}{\sqrt{5}} \arctan \frac{x-2}{\sqrt{5}} + c \\
&= \ell \eta |x^2-4x+9| + \frac{6\sqrt{5}}{5} \arctan \frac{x-2}{\sqrt{5}} + c
\end{aligned}$$

**5.25.-**  $\int \frac{(2x+4)dx}{\sqrt{4x-x^2}}$

Solución.- Sea:  $u = 4x - x^2 + 9, du = (4 - 2x)dx$

$$\begin{aligned}
\int \frac{(2x+4)dx}{\sqrt{4x-x^2}} &= - \int \frac{(-2x-4)dx}{\sqrt{4x-x^2}} = - \int \frac{(-2x+4-8)dx}{\sqrt{4x-x^2}} = - \int \frac{(-2x+4)dx}{\sqrt{4x-x^2}} + 8 \int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} \\
&= - \int u^{-\frac{1}{2}} du + 8 \int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}}, \text{ Completando cuadrados se tiene:} \\
4x-x^2 &= -(x^2-4x) = -(x^2-4x+4-4) = -(x^2-4x+4)+4 = 2^2-(x-2)^2 \\
&= - \int u^{-\frac{1}{2}} du + 8 \int \frac{dx}{\sqrt{2^2-(x-2)^2}} = -2u^{\frac{1}{2}} + 8 \arcsen \frac{x-2}{2} + c \\
&= -2\sqrt{4x-x^2} + 8 \arcsen \frac{x-2}{2} + c
\end{aligned}$$

**5.26.-**  $\frac{2}{3} \int \frac{(x+\frac{3}{2})dx}{9x^2-12x+8}$

Solución.- Sea:  $u = 9x^2 - 12x + 8, du = (18x-12)dx$

$$\begin{aligned}
\frac{2}{3} \int \frac{(x+\frac{3}{2})dx}{9x^2-12x+8} &= \frac{2}{3} \frac{1}{18} \int \frac{(18x+27)dx}{9x^2-12x+8} = \frac{1}{27} \int \frac{(18x+27)dx}{9x^2-12x+8} = \frac{1}{27} \int \frac{(18x-12+39)dx}{9x^2-12x+8} \\
&= \frac{1}{27} \int \frac{(18x-12)dx}{9x^2-12x+8} + \frac{39}{27} \int \frac{dx}{9x^2-12x+8} = \frac{1}{27} \int \frac{du}{u} + \frac{39}{27} \int \frac{dx}{9(x^2-\frac{4}{3}x+\frac{8}{9})} \\
&= \frac{1}{27} \int \frac{du}{u} + \frac{39}{27 \times 9} \int \frac{dx}{(x^2-\frac{4}{3}x+\frac{8}{9})}
\end{aligned}$$

Completando cuadrados se tiene:

$$\begin{aligned}
x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{8}{9} &= (x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{4}{9}) + \frac{8}{9} - \frac{4}{9} = (x - \frac{2}{3})^2 + \frac{4}{9} = (x - \frac{2}{3})^2 + (\frac{2}{3})^2 \\
&= \frac{1}{27} \int \frac{du}{u} + \frac{39}{27 \times 9} \int \frac{dx}{(x - \frac{2}{3})^2 + (\frac{2}{3})^2} = \frac{1}{27} \ell \eta |u| + \frac{39}{27 \times 9} \frac{1}{\frac{2}{3}} \arctan \frac{x - \frac{2}{3}}{\frac{2}{3}} + c
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{27} \ell \eta |9x^2 - 12x + 8| - \frac{13}{54} \operatorname{arc} \tau g \frac{3x - 2}{2} + c$$

**5.27.** -  $\int \frac{(x+6)dx}{\sqrt{5-4x-x^2}}$

Solución.- Sea:  $u = 5 - 4x - x^2$ ,  $du = (-4 - 2x)dx$

$$\begin{aligned} \int \frac{(x+6)dx}{\sqrt{5-4x-x^2}} &= -\frac{1}{2} \int \frac{(-2x-12)dx}{\sqrt{5-4x-x^2}} = -\frac{1}{2} \int \frac{(-2x-4-8)dx}{\sqrt{5-4x-x^2}} \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{(-2x-4)dx}{\sqrt{5-4x-x^2}} + 4 \int \frac{dx}{\sqrt{5-4x-x^2}} = -\frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{u}} + 4 \int \frac{dx}{\sqrt{5-4x-x^2}} \end{aligned}$$

Completando cuadrados se tiene:  $5 - 4x - x^2 = 9 - (x+2)^2 = 3^2 - (x+2)^2$

$$\begin{aligned} &= -\frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{u}} + 4 \int \frac{dx}{\sqrt{3^2 - (x+2)^2}} = -\sqrt{u} + 4 \arcsen \frac{x+2}{3} + c \\ &= -\sqrt{5-4x-x^2} + 4 \arcsen \frac{x+2}{3} + c \end{aligned}$$

**5.28.** -  $\int \frac{dx}{2x^2 + 20x + 60}$

Solución.-

$$\int \frac{dx}{2x^2 + 20x + 60} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 + 10x + 30}, \text{ Completando cuadrados se tiene:}$$

$$x^2 + 10x + 30 = (x^2 + 10x + 25) + 5 = (x+5)^2 + (\sqrt{5})^2$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x+5)^2 + (\sqrt{5})^2} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arc} \tau g \frac{x+5}{\sqrt{5}} + c = \frac{\sqrt{5}}{10} \operatorname{arc} \tau g \frac{x+5}{\sqrt{5}} + c$$

**5.29.** -  $\int \frac{3dx}{\sqrt{80+32x-4x^2}}$

Solución.-

$$\int \frac{3dx}{\sqrt{80+32x-4x^2}} = \int \frac{3dx}{\sqrt{4(20+8x-x^2)}} = \frac{3}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{(20+8x-x^2)}}$$

Completando cuadrados se tiene:

$$20+8x-x^2 = -(x^2 - 8x - 20) = -(x^2 - 8x + 16 - 20 - 16) = -(x^2 - 8x + 16) + 36$$

$$= -(x-4)^2 + 6^2 = 6^2 - (x-4)^2$$

$$= \frac{3}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{6^2 - (x-4)^2}} = \frac{3}{2} \arcsen \frac{x-4}{6} + c$$

**5.30.** -  $\int \frac{dx}{\sqrt{12x-4x^2-8}}$

Solución.-

$$\int \frac{dx}{\sqrt{12x-4x^2-8}} = \int \frac{dx}{\sqrt{4(-x^2 + 3x - 2)}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{(-x^2 + 3x - 2)}}$$

Completando cuadrados se tiene:

$$\begin{aligned} -x^2 + 3x - 2 &= -(x^2 - 3x + 2) = -(x^2 - 3x + \frac{9}{4} + 2 - \frac{9}{4}) = -(x^2 - 3x + \frac{9}{4}) + \frac{1}{4} \\ &= (\frac{1}{2})^2 - (x - \frac{3}{2})^2 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{(\frac{1}{2})^2 - (x - \frac{3}{2})^2}} = \frac{1}{2} \arcsen \frac{x - \frac{3}{2}}{\frac{1}{2}} + c = \frac{1}{2} \arcsen(2x - 3) + c$$

$$5.31.- \int \frac{5dx}{\sqrt{28 - 12x - x^2}}$$

Solución.-

$$\int \frac{5dx}{\sqrt{28 - 12x - x^2}} = 5 \int \frac{dx}{\sqrt{28 - 12x - x^2}}, \text{ Completando cuadrados se tiene:}$$

$$28 - 12x - x^2 = 8^2 - (x + 6)^2$$

$$= 5 \int \frac{dx}{\sqrt{8^2 - (x + 6)^2}} = 5 \arcsen \frac{x + 6}{8} + c$$

$$5.32.- \int \sqrt{12 - 8x - 4x^2} dx$$

Solución.- Sea:  $u = x + 1, du = dx; a = 2$

$$\int \sqrt{12 - 8x - 4x^2} dx = \int \sqrt{4(3 - 2x - x^2)} dx = 2 \int \sqrt{3 - 2x - x^2} dx$$

Completando cuadrados se tiene:

$$3 - 2x - x^2 = -(x^2 + 2x - 3) = -(x^2 + 2x + 1) + 4 = 2^2 - (x + 1)^2$$

$$\begin{aligned} 2 \int \sqrt{2^2 - (x + 1)^2} dx &= 2 \int \sqrt{a^2 - u^2} du = 2 \left( \frac{1}{2} u \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^2}{2} \arcsen \frac{u}{a} \right) + c \\ &= (x + 1) \sqrt{-x^2 - 2x + 3} + 4 \arcsen \frac{x + 1}{2} + c \end{aligned}$$

$$5.33.- \sqrt{x^2 - x + \frac{5}{4}} dx$$

Solución.- Sea:  $u = x - \frac{1}{2}, du = dx; a = 1$

Completando cuadrados se tiene:

$$x^2 - x + \frac{5}{4} = (x - \frac{1}{2})^2 + 1$$

$$\sqrt{x^2 - x + \frac{5}{4}} dx = \sqrt{(x - \frac{1}{2})^2 + 1} dx = \sqrt{u^2 + a^2} du$$

$$= \frac{1}{2} u \sqrt{u^2 + a^2} + \frac{1}{2} a^2 \ell \eta \left| u + \sqrt{u^2 + a^2} \right| + c$$

$$= \frac{1}{2} (x - \frac{1}{2}) \sqrt{x^2 - x + \frac{5}{4}} + \frac{1}{2} \ell \eta \left| x - \frac{1}{2} + \sqrt{x^2 - x + \frac{5}{4}} \right| + c$$

$$= \frac{1}{4} (2x - 1) \sqrt{x^2 - x + \frac{5}{4}} + \frac{1}{2} \ell \eta \left| x - \frac{1}{2} + \sqrt{x^2 - x + \frac{5}{4}} \right| + c$$

$$5.34.- \int \frac{dx}{x^2 - 2x + 5}$$

**Solución.-** Completando cuadrados se tiene:

$$x^2 - 2x + 5 = (x^2 - 2x + 4) + 1 = (x - 2)^2 + 1$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - 2x + 5} = \int \frac{dx}{(x - 2)^2 + 1} = \arctan(x - 2) + c$$

$$\textbf{5.35.-} \int \frac{(1-x)dx}{\sqrt{8+2x-x^2}}$$

**Solución.-** Sea:  $u = 8 + 2x - x^2$ ,  $du = (2 - 2x)dx = 2(1-x)dx$

$$\int \frac{(1-x)dx}{\sqrt{8+2x-x^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{u}} = \frac{1}{2} \int u^{-1/2} du = \sqrt{u} + c = \sqrt{8+2x-x^2} + c$$

$$\textbf{5.36.-} \int \frac{x dx}{x^2 + 4x + 5}$$

**Solución.-** Sea:  $u = x^2 + 4x + 5$ ,  $du = (2x + 4)dx$

$$\int \frac{x dx}{x^2 + 4x + 5} = \frac{1}{2} \int \frac{2x dx}{x^2 + 4x + 5} = \frac{1}{2} \int \frac{(2x + 4) - 4}{x^2 + 4x + 5} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{(2x + 4)dx}{x^2 + 4x + 5} - 2 \int \frac{dx}{x^2 + 4x + 5} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} - 2 \int \frac{dx}{x^2 + 4x + 5}, \text{ Completando cuadrados se}$$

tiene:  $x^2 + 4x + 5 = (x^2 + 4x + 4) + 1 = (x + 2)^2 + 1$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} - 2 \int \frac{dx}{(x + 2)^2 + 1} = \frac{1}{2} \ell \eta |u| - 2 \arctan(x + 2) + c$$

$$= \frac{1}{2} \ell \eta |x^2 + 4x + 5| - 2 \arctan(x + 2) + c$$

$$\textbf{5.37.-} \int \frac{(2x+3)dx}{4x^2 + 4x + 5}$$

**Solución.-** Sea:  $u = 4x^2 + 4x + 5$ ,  $du = (8x + 4)dx$

$$\int \frac{(2x+3)dx}{4x^2 + 4x + 5} = \frac{1}{4} \int \frac{(8x+12)dx}{4x^2 + 4x + 5} = \frac{1}{4} \int \frac{(8x+4)+8}{4x^2 + 4x + 5} dx$$

$$\frac{1}{4} \int \frac{(8x+4)dx}{4x^2 + 4x + 5} + 2 \int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5} = \frac{1}{4} \int \frac{du}{u} + 2 \int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5} = \frac{1}{4} \int \frac{du}{u} + 2 \int \frac{dx}{4(x^2 + x + 5/4)}$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{du}{u} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x^2 + x + 5/4)}, \text{ Completando cuadrados se tiene:}$$

$$x^2 + x + \frac{5}{4} = (x^2 + x + \frac{1}{4}) + 1 = (x + 1/2)^2 + 1$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{du}{u} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x + 1/2)^2 + 1} = \frac{1}{4} \ell \eta |u| + \frac{1}{2} \arctan(x + 1/2) + c$$

$$\textbf{5.38.-} \int \frac{(x+2)dx}{x^2 + 2x + 2}$$

**Solución.-** Sea:  $u = x^2 + 2x + 2$ ,  $du = (2x + 2)dx$

$$\begin{aligned} \int \frac{(x+2)dx}{x^2+2x+2} &= \frac{1}{2} \int \frac{(2x+4)dx}{x^2+2x+2} = \frac{1}{2} \int \frac{(2x+2)+2}{x^2+2x+2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{(2x+2)dx}{x^2+2x+2} + \int \frac{dx}{x^2+2x+2} \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} + \int \frac{dx}{x^2+2x+2} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} + \int \frac{dx}{(x+1)^2+1} \\ &= \frac{1}{2} \ell \eta |u| + \arctan g(x+1) + c = \frac{1}{2} \ell \eta |x^2+2x+2| + \arctan g(x+1) + c \end{aligned}$$

**5.39.-**  $\int \frac{(2x+1)dx}{x^2+8x-2}$

Solución.- Sea:  $u = x^2 + 8x - 2, du = (2x+8)dx$

$$\begin{aligned} \int \frac{(2x+1)dx}{x^2+8x-2} &= \int \frac{(2x+8)-7dx}{x^2+8x-2} = \int \frac{(2x+8)dx}{x^2+8x-2} - 7 \int \frac{dx}{x^2+8x-2} \\ &= \int \frac{du}{u} - 7 \int \frac{dx}{(x^2+8x+16)-18} = \int \frac{du}{u} - 7 \int \frac{dx}{(x+4)^2-(3\sqrt{2})^2} \\ &= \ell \eta |u| - 7 \frac{1}{2(3\sqrt{2})} \ell \eta \left| \frac{(x+4)-(3\sqrt{2})}{(x+4)+(3\sqrt{2})} \right| + c \\ &= \ell \eta |x^2+8x-2| - \frac{7\sqrt{2}}{12} \ell \eta \left| \frac{(x+4)-(3\sqrt{2})}{(x+4)+(3\sqrt{2})} \right| + c \end{aligned}$$

**5.40.-**  $\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2-6x}}$

Solución.- Completando cuadrados se tiene:

$$-x^2-6x = -(x^2+6x) = -(x^2+6x+9)+9 = 3^2-(x+3)^2$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{3^2-(x+3)^2}} = \arcsen \frac{x+3}{3} + c$$

**5.41.-**  $\int \frac{(x-1)dx}{x^2+2x+2}$

Solución.- Sea:  $u = x^2 + 2x + 2, du = (2x+2)dx$

$$\begin{aligned} \int \frac{(x-1)dx}{x^2+2x+2} &= \frac{1}{2} \int \frac{(2x+2)-4}{x^2+2x+2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{(2x+2)dx}{x^2+2x+2} - 2 \int \frac{dx}{x^2+2x+2} \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} - 2 \int \frac{dx}{x^2+2x+2} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} - 2 \int \frac{dx}{(x+1)^2+1} = \frac{1}{2} \ell \eta |u| - 2 \arctan g(x+1) + c \\ &= \frac{1}{2} \ell \eta |x^2+2x+2| - 2 \arctan g(x+1) + c \end{aligned}$$