

Límites, continuidad y derivadas

1. (0.75p) Halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x) = 5x^3 - x^2 - x + 1$ en $x = -2$.

2. (2.25p) Calcula los siguientes límites:

a. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2-x}{(3-x)^2}$

b. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 2^{-x})$

c. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1}$

3. (6p) Calcula la derivada de las siguientes funciones, simplificando los resultados:

a. $f(x) = \frac{2x^2}{2x - 4}$

b. $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - 3}$

c. $f(x) = \ln \sqrt{x^2 + 3x}$

d. $f(x) = \cos(2^{-x})$

e. $f(x) = \operatorname{sen}^2(3x - 5)$

f. $f(x) = \frac{x}{3} \log_2(1 - x^2)$ (No simplificar el resultado)

g. $f(x) = e^{\sqrt{-5x+1}}$

h. $f(x) = \operatorname{tg}(3x)$

4. (1p) Calcula el valor de k para que la siguiente función sea continua en todo su dominio:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x + 2} & \text{si } x \neq -2 \\ 2k + x & \text{si } x = -2 \end{cases}$$

SOLUCIÓN

- 1.** Halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x) = 5x^3 - x^2 - x + 1$ en $x = -2$.

La ecuación punto-pendiente de la recta es:

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$x_0 = -2$$

$$y_0 = f(-2) = 5 \cdot (-2)^3 - (-2)^2 - (-2) + 1 = 5 \cdot (-8) - 4 + 2 + 1 = -40 - 4 + 2 + 1 = -41$$

$$f'(x) = 15x^2 - 2x - 1$$

$$m = f'(-2) \rightarrow f'(-2) = 15(-2)^2 - 2(-2) - 1 = 15 \cdot 4 + 4 - 1 = 60 + 4 - 1 = 63$$

$$\color{red}y + 41 = 63(x + 2)$$

- 2.** Calcula los siguientes límites:

a. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2-x}{(3-x)^2}$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2-x}{(3-x)^2} = \frac{-1}{0}$$

Se han de calcular los límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2-x}{(3-x)^2} = \frac{-1}{0^+} = \color{red}-\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2-x}{(3-x)^2} = \frac{-1}{0^+} = \color{red}-\infty$$

b. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 2^{-x})$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 2^{-x}) = 1 + 2^{-\infty} = 1 + \frac{1}{2^{+\infty}} = 1 + \frac{1}{+\infty} = 1 + 0 = \color{red}1$$

c. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1}$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{Indeterminación}$$

Se factorizan los polinomios del numerador y del denominador. En el numerador, por identidad notable:

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$$

En el denominador se obtienen las raíces de la ecuación $x^3 - 1 = 0$:

	1	0	0	-1
1	1	1	1	1
	1	1	1	0

Luego $x_1 = 1$

Obtenemos las otras dos posibles raíces resolviendo la ecuación de segundo grado:

$$x^2 + x + 1 = 0$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 1}{x^2 + x + 1} = \frac{2}{1 + 1 + 1} = \frac{2}{3}$$

3. Calcula la derivada de las siguientes funciones, simplificando los resultados:

a. $f(x) = \frac{2x^2}{2x - 4}$

$$f'(x) = \frac{(2x^2)' \cdot (2x - 4) - (2x^2) \cdot (2x - 4)'}{(2x - 4)^2} = \frac{4x \cdot (2x - 4) - (2x^2) \cdot 2}{(2x - 4)^2} =$$

$$\frac{8x^2 - 16x - 4x^2}{(2x - 4)^2} = \frac{8x^2 - 16x - 4x^2}{(2x - 4)^2} = \frac{\cancel{4x^2} - 16x}{\cancel{(2x - 4)^2}}$$

b. $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - 3}$

$$f'(x) = ((x^3 - 3)^{1/3})' = \frac{1}{3}(x^3 - 3)^{1/3-1}(x^3 - 3)' = \frac{1}{3}(x^3 - 3)^{-2/3}(3x^2) =$$

$$\frac{3x^2}{3(x^3 - 3)^{2/3}} = \frac{x^2}{\sqrt[3]{(x^3 - 3)^2}}$$

c. $f(x) = \ln \sqrt{x^2 + 3x}$

$$f'(x) = \frac{(\sqrt{x^2 + 3x})'}{\sqrt{x^2 + 3x}} = \frac{\frac{(x^2 + 3x)'}{2\sqrt{x^2 + 3x}}}{\sqrt{x^2 + 3x}} = \frac{\frac{2x + 3}{2\sqrt{x^2 + 3x}}}{\sqrt{x^2 + 3x}} = \frac{2x + 3}{2\sqrt{x^2 + 3x} \cdot \sqrt{x^2 + 3x}} = \frac{2x + 3}{2(x^2 + 3x)} =$$

$$\frac{2x + 3}{2x^2 + 6x}$$

d. $f(x) = \cos(2^{-x})$

$$f'(x) = \cos(2^{-x}) \cdot (2^{-x})' = -\sin(2^{-x}) \cdot 2^{-x} \cdot \ln 2 \cdot (-x)' = -\sin(2^{-x}) \cdot 2^{-x} \cdot \ln 2 \cdot (-1) =$$

$$\sin(2^{-x}) \cdot 2^{-x} \cdot \ln 2$$

e. $f(x) = \sin^2(3x - 5)$

$$f(x) = [\sin(3x - 5)]^2$$

$$f'(x) = 2[\sin(3x - 5)]^{2-1} \cdot \sin(3x - 5)' = 2 \sin(3x - 5) \cdot \cos(3x - 5) \cdot (3x - 5)' =$$

$$2 \sin(3x - 5) \cdot \cos(3x - 5) \cdot 3 = 6 \sin(3x - 5) \cos(3x - 5)$$

f. $f(x) = \frac{x}{3} \log_2(1 - x^2)$ (No simplificar el resultado)

$$f'(x) = \left(\frac{x}{3}\right)' \log_2(1 - x^2) + \frac{x}{3} (\log_2(1 - x^2))' = \frac{1}{3} \log_2(1 - x^2) + \frac{x}{3} \cdot \frac{(1 - x^2)'}{(1 - x^2) \cdot \ln 2} =$$

$$\frac{1}{3} \log_2(1 - x^2) + \frac{x}{3} \cdot \frac{-2x}{(1 - x^2) \cdot \ln 2} = \frac{\log_2(1 - x^2)}{3} + \frac{-2x^2}{3(1 - x^2) \ln 2}$$

g. $f(x) = e^{\sqrt{-5x+1}}$

$$f'(x) = e^{\sqrt{-5x+1}} \cdot \ln e \cdot (\sqrt{-5x+1})' = e^{\sqrt{-5x+1}} \cdot 1 \cdot \frac{(-5x+1)'}{2\sqrt{-5x+1}} = e^{\sqrt{-5x+1}} \cdot 1 \cdot \frac{-5}{2\sqrt{-5x+1}} =$$

$$\frac{-5e^{\sqrt{-5x+1}}}{2\sqrt{-5x+1}}$$

h. $f(x) = \operatorname{tg}(3x)$

$$f'(x) = \frac{(3x)'}{\cos^2(3x)} = \frac{3}{\cos^2(3x)}$$

4. Calcula el valor de k para que la siguiente función sea continua en todo su dominio:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x + 2} & \text{si } x \neq -2 \\ 2k + x & \text{si } x = -2 \end{cases}$$

En $x = -2$:

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x^2 - 4}{x + 2} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{(x-2)(x+2)}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2^-} (x-2) = -2 - 2 = -4$$
$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x^2 - 4}{x + 2} = -4$$
$$f(-2) = 2k - 2$$

Para que $f(x)$ sea continua en $x = -2$:

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = f(-2) \rightarrow -4 = 2k - 2 \rightarrow 2k = -2 \rightarrow k = -1$$