

1º Demuestra que el triángulo de vértices es isósceles: A = (3, 1), B = (9, -1) y C = (5, -5). Calcula su área.

2º Determina si el triángulo A = (12, 10), B = (20, 16) y C = (8, 32) es rectángulo.

3º Halla los vértices de un cuadrado si dos de esos vértices no consecutivos son A = (3, 1) y B = (9, -7).

4º Dados los puntos A = (3, 0) y B = (-3, 0), obtén un punto C sobre el eje de ordenadas, de modo que el triángulo ABC que describan sea equilátero. ¿Hay solución única?

5º Calcula las coordenadas de los puntos que dividen al segmento A = (5, -1) y B = (17, 8) en tres partes iguales.


6º Las rectas que contienen a los lados de un triángulo son: r: x+y-5=0, s: 6x+5y-24=0 y t: 2x+y-8=0. Calcula sus vértices y su área.

7º Halla las bisectrices de las rectas: r: 3x-4y+2=0 y s: 5x+12y-7=0.

8º La recta que pasa por el punto P = (2, 3) y es paralela a la recta $r: \frac{x-6}{4} = \frac{y+3}{-6}$ forma un triángulo con los ejes cartesianos. Determina su área

9º Los puntos A = (2, 2) y B = (-10, -2) son los vértices correspondientes al lado desigual de un triángulo isósceles. El otro vértice está sobre la recta $r: \begin{cases} x = 1 - 6\lambda \\ y = 1 + 2\lambda \end{cases}$. Determinalo y halla el lado del triángulo.


10º Tenemos un triángulo de vértices A = (4, 9), B = (11, 10) y C = (9, 4). Comprueba que es un triángulo isósceles. Trazamos una paralela al lado desigual pasando por el punto P = (7, 6). Y se forma un trapezio isósceles. Determina su área.



11º Encuentra un punto del eje de abscisas que esté a la misma distancia que el punto A = (5, 4) que de la recta $r: \frac{x+1}{4} = \frac{y-4}{3}$.

12º De todas las rectas que pasan por el punto P = (2, 3) calcula la recta que determina segmentos iguales al cortar a los dos ejes cartesianos.

Vamos a ver cuánto miden los lados



$$b = |AC| \quad a = |BC| \quad c = |AB|$$


$$AC = C - A = (5, -5) - (3, 1) = (2, -6) \Rightarrow |AC| = \sqrt{2^2 + (-6)^2} = \sqrt{40}$$

$$BC = C - B = (5, -5) - (9, -1) = (-4, -4) \Rightarrow |BC| = \sqrt{(-4)^2 + (-4)^2} = \sqrt{32}$$

$$AB = B - A = (9, -1) - (3, 1) = (6, -2) \Rightarrow |AB| = \sqrt{6^2 + (-2)^2} = \sqrt{40}$$

$\Rightarrow b = c \neq a$ ISÓSCELES

Área:



Teorema de Pitágoras.

$$h^2 + \left(\frac{\sqrt{32}}{2}\right)^2 = (\sqrt{40})^2 \Leftrightarrow$$

$$h^2 + \frac{32}{4} = 40 \Rightarrow h^2 = 32$$


$$\Rightarrow h = \sqrt{32}$$

Área

$$A = \frac{\sqrt{32} \cdot \sqrt{32}}{2} = 16 \text{ u}^2$$

Método 1.

Se calculan los lados y se comprueba si cumple el teorema de Pitágoras.



$$a = |BC| \quad b = |AC| \quad c = |AB|$$

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{C} - \overrightarrow{B} = (8, 32) - (20, 16) = (-12, 16) \Rightarrow a = |BC| = \sqrt{(-12)^2 + 16^2}$$

$$a = \sqrt{400} = 20.$$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{C} - \overrightarrow{A} = (8, 32) - (12, 10) = (-4, 22) \Rightarrow b = |AC| = \sqrt{(-4)^2 + 22^2}$$

$$b = \sqrt{500}$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{B} - \overrightarrow{A} = (20, 16) - (12, 10) = (8, 6) \Rightarrow c = |AB| = \sqrt{8^2 + 6^2} =$$

$$c = \sqrt{100} = 10$$

De un rectángulo la hipotenusa sería $b = \sqrt{500}$ (por ser el mayor)

$$\therefore b^2 = a^2 + c^2 ? \Leftrightarrow (\sqrt{500})^2 = (\sqrt{400})^2 + (\sqrt{100})^2 \text{ SI.}$$

\Rightarrow SI ES RECTÁNGULO.

Método 2 .

Se calculan los ángulos mediante el producto escalar.

Recuerda: si \vec{u} y \vec{v} son perpendiculares $\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Para que sea rectángulo el triángulo ABC de los productos escalar de los vectores que representan sus lados debe ser NULO.

$$\vec{BC} \cdot \vec{AC} = (-12, 16) \cdot (-4, 22) = 48 + 352 = 400 \neq 0.$$


$$\vec{BC} \cdot \vec{AB} = (-12, 16) \cdot (8, 6) = -96 + 96 = 0 \Rightarrow BC \perp AB$$

y así es un triángulo rectángulo.

¿Qué hay que saber?


- las diagonales de un cuadrado se cortan en su punto medio y son perpendiculares.
- con dos puntos P y Q se construye el vector $\vec{PQ} = \vec{Q} - \vec{P}$.
- dado el vector $\vec{v} = (a, b)$ se pueden construir 2 vectores perpendiculares a \vec{v} y del mismo módulo que \vec{v} : $\vec{n} = (b, -a)$ y $\vec{n}' = (-b, a)$: $|\vec{v}| = |\vec{n}| = |\vec{n}'|$.

Un dibujo.



$$\text{datos: } A \text{ y } B \quad A = (3, 1), \quad B = (9, -7)$$

objetivo: ¿C, D?



$$MB \perp MC \quad y \quad |MD| = |MC|$$

$$MB \perp MD. \quad y \quad |MB| = |MD|.$$

$$\text{¿M?} \quad M = \frac{A+B}{2} = \frac{(3,1)+(9,-7)}{2} = (6,-3)$$

$$MB = B - M = (9, -7) - (6, -3) = (3, -4)$$

$$\text{¿}\vec{n} \perp MB? \quad \vec{n} = (4, 3) \Rightarrow \boxed{MC = \vec{n}} \Rightarrow C - M = \vec{n} \Rightarrow C = M + \vec{n}$$


$$\boxed{C = (6, -3) + (4, 3) = (10, 0)}$$

$$\text{¿}\vec{n}' \perp MB? \quad \vec{n}' = (-4, -3) \Rightarrow \boxed{MD = \vec{n}'} \Rightarrow D - M = \vec{n}' \Rightarrow D = M + \vec{n}'$$

$$\boxed{D = (6, -3) + (-4, -3) = (2, -6)}$$

¿Qué hay que saber?

- El área de un triángulo equilátero es $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ siendo a su lado.



$$h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = a^2 \rightarrow h^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4} \rightarrow h = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

$$S = \frac{1}{2} a \cdot h = \frac{1}{2} a \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}.$$

- C sobre el eje de ordenadas $C = (0, b)$, $b \in \mathbb{R}$.

Condiciones: $|CA| = |CB| = |AB|$. Los 3 lados iguales.

$$CA = A - C = (3, 0) - (0, b) = (3, -b) \rightarrow |CA| = \sqrt{9+b^2}$$

$$CB = B - C = (-3, 0) - (0, b) = (-3, -b) \rightarrow |CB| = \sqrt{9+b^2}$$



$$AB = B - A = (-3, 0) - (3, 0) = (-6, 0) \rightarrow |AB| = 6.$$


$$\Rightarrow \boxed{\sqrt{9+b^2} = 6}$$

$$\Leftrightarrow 9+b^2 = 6^2 \Leftrightarrow b^2 = 36-9 = 27 \Rightarrow \boxed{b = \pm\sqrt{27}}$$

Dos soluciones:

$$C = (0, \sqrt{27}) \quad C' = (0, -\sqrt{27})$$





datos: A, B .

objetivo: P y Q

condiciones: $AB = 3AP \rightarrow ?P?$

$AP = PQ \rightarrow ?Q?$

- $AB = 3AP \Leftrightarrow B - A = 3(P - A) = 3P - 3A \Leftrightarrow 3P = B + 2A$
 $\Rightarrow P = \frac{B+2A}{3} = \frac{(17, 8) + 2 \cdot (5, -1)}{3} = \frac{(27, 6)}{3} = (9, 2)$

$P = (9, 2)$

- $AP = PQ \Leftrightarrow P - A = Q - P \Leftrightarrow Q = 2P - A$
 $\Rightarrow Q = 2(9, 2) - (5, -1) = (18, 4) - (5, -1) = (13, 5)$

$Q = (13, 5)$

Vértices del triángulo.

Cada vértice es el punto de corte de 2 rectas.

$A = r \cap s$ (A es la intersección de r y s). \Leftrightarrow solución del sistema

$$\begin{array}{l} x+y-5=0 \\ 6x+5y-24=0 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{r} -6x-6y+30=0 \\ 6x+5y-24=0 \\ \hline -y+6=0 \end{array} \rightarrow y=6 \rightarrow x+6-5=0 \rightarrow x=-1$$

$$A = (-1, 6)$$

$B = r \cap t$


$$\begin{array}{l} x+y-5=0 \\ 2x+y-8=0 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{r} -x-y+5=0 \\ 2x+y-8=0 \\ \hline x-3=0 \end{array} \rightarrow x=3 \rightarrow 3+y-5=0 \rightarrow y=2$$

$$B = (3, 2)$$

$C = s \cap t$

$$\begin{array}{l} 6x+5y-24=0 \\ 2x+y-8=0 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{r} 6x+5y-24=0 \\ -6x-3y+24=0 \\ \hline 2y=0 \end{array} \rightarrow y=0 \rightarrow 6x+5 \cdot 0 - 24=0 \rightarrow x=4$$

$$C = (4, 0)$$

Área del triángulo.

$$S = \frac{1}{2} b \cdot h$$

$$b = |AB|$$

$$h = \text{dis}(r_{AB}, C)$$


- La base "b" es el módulo del vector AB

$$AB = B - A = (3, 2) - (-1, 6) = (4, -4)$$

$$|AB| = \sqrt{4^2 + (-4)^2} = \sqrt{32} \Rightarrow b = \sqrt{32}$$

- La altura es la distancia de la recta que pasa por A y B al vértice opuesto: C. (*)

Recuerda la fórmula de la distancia de un punto a una recta



$$\text{dis}(P, r) = d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

$$\begin{matrix} \vec{v} = AB = (4, -4) \\ r_{AB} \end{matrix} \rightarrow \vec{n} = (4, 4) \equiv (1, 1) \quad (\star \star)$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{v} = AB = (4, -4) \\ r_{AB} \end{array} \right\} A = (-1, 6)$$

$$\text{en forma general: } x + y + C = 0$$

$$\stackrel{?}{\in} ? \quad A \in r_{AB} \Rightarrow -1 + 6 + C = 0 \Rightarrow C = -5$$

$$\Rightarrow r_{AB} = x + y - 5 = 0$$

$$\Rightarrow h = \text{dis}(C, r_{AB}) = \frac{|4 + 0 - 5|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow S = \frac{1}{2} \sqrt{32} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2 u^2 \quad u = \text{unidades en las que se mide}$$


(*) valdría elegir otro lado y su correspondiente altura.

(**) el vector $\vec{n} = (4, 4)$ ó cualquier de sus múltiplos pues solo interesa de él su dirección:

$$(4, 4) = 4 \cdot (1, 1)$$

Método 1: mediante el concepto de distancia. Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos rectas dadas. Lugar formado por dos rectas perpendiculares.

Representación gráfica.



r y s son las rectas dadas
b₁ y b₂ son las bisectrices.

$$\left. \begin{array}{l} r: Ax + By + C = 0 \\ s: A'x + B'y + C' = 0 \end{array} \right\} \text{P es bisectriz si } \text{dis}(r, P) = \text{dis}(s, P)$$

si P en (x, y) \Rightarrow

$$\frac{|Ax + By + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|A'x + B'y + C'|}{\sqrt{A'^2 + B'^2}}$$

$$b_1: \frac{Ax + By + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} = + \frac{A'x + B'y + C'}{\sqrt{A'^2 + B'^2}}$$

$$b_2: \frac{Ax + By + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} = - \frac{A'x + B'y + C'}{\sqrt{A'^2 + B'^2}}$$

$$\begin{cases} r: 3x - 4y + 2 = 0 \\ s: 5x + 12y - 7 = 0 \end{cases}$$

$$\frac{|3x - 4y + 2|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|5x + 12y - 7|}{\sqrt{5^2 + 12^2}} \Leftrightarrow$$

$$\frac{|3x - 4y + 2|}{5} = \frac{|5x + 12y - 7|}{13} \Leftrightarrow$$

$$\frac{3x - 4y + 2}{5} = \frac{\pm(5x + 12y - 7)}{13} \Rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{3x - 4y + 2}{5} = \frac{+(5x + 12y - 7)}{13} \\ \frac{3x - 4y + 2}{5} = \frac{-(5x + 12y - 7)}{13} \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 13(3x - 4y + 2) = 5(5x + 12y - 7) \\ 13(3x - 4y + 2) = -5(5x + 12y - 7) \end{cases} \Rightarrow$$

$$b_1: 14x - 112y + 61 = 0$$

$$b_2: 64x + 8y - 9 = 0$$



Observa que $b_1 \perp b_2$

$$\begin{cases} \vec{n}_1 = (14, -112) \\ \vec{n}_2 = (64, 8) \end{cases} \quad \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 14 \cdot 64 + (-112) \cdot 8 = 896 - 896 = 0.$$


Método 2: mediante el cálculo de un punto y un vector director.

¿Qué hay que saber?

Dos vectores no alineados de IGUAL MÓDULO determinan un rombo (o con medida ni son ortogonales). Las diagonales son las bisectrices de los ángulos y son la suma y la diferencia de los vectores.



Representación gráfica:



$b_1 \left\{ \begin{array}{l} \text{punto } P \\ \text{vector director } \vec{u}_r + \vec{u}_s \end{array} \right.$

$b_2 \left\{ \begin{array}{l} \text{punto } P \\ \text{vector director } \vec{u}_r - \vec{u}_s \end{array} \right.$

\vec{u}_r y \vec{u}_s serán vectores DIRECTORES UNITARIOS de r y s respectivamente.

$$\begin{cases} f: 3x - 4y + 2 = 0 \\ s: 5x + 12y - 7 = 0 \end{cases}$$

- P es el punto de corte r y s \Leftrightarrow solución del sistema.

$$\begin{array}{l} \begin{array}{l} 3x - 4y + 2 = 0 \quad (1) \\ 5x + 12y - 7 = 0 \end{array} \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} \begin{array}{l} 9x - 12y + 6 = 0 \quad (1 \cdot 3) \\ 5x + 12y - 7 = 0 \end{array} \\ \hline 14x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{14}. \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \begin{array}{l} 3x - 4y + 2 = 0 \quad (1) \\ 5x + 12y - 7 = 0 \end{array} \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} \begin{array}{l} -15x + 20y - 10 = 0 \quad (1 \cdot 5) \\ 15x + 36y - 21 = 0 \end{array} \\ \hline +56y - 31 = 0 \rightarrow y = \frac{31}{56} \end{array}$$

$$\Rightarrow P = \left(\frac{1}{14}, \frac{31}{56} \right)$$

- Vectores:

$$\vec{v}_r = (3, -4) \Rightarrow \vec{v}_r = (4, 3) \Rightarrow \vec{u}_r = \frac{\vec{v}_r}{|\vec{v}_r|} = \frac{(4, 3)}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right)$$

$$\vec{v}_s = (5, 12) \Rightarrow \vec{v}_s = (12, -5) \Rightarrow \vec{u}_s = \frac{\vec{v}_s}{|\vec{v}_s|} = \frac{(12, -5)}{\sqrt{12^2 + (-5)^2}} = \left(\frac{12}{13}, \frac{-5}{13} \right)$$

$$b_1: \left\{ \begin{array}{l} P \\ \vec{u} = \vec{u}_r + \vec{u}_s = \left(\frac{4}{5} + \frac{12}{13}, \frac{3}{5} - \frac{5}{13} \right) = \left(\frac{112}{65}, \frac{14}{65} \right) = (112, 14) \end{array} \right. \textcircled{a}$$

$$\Rightarrow 14x - 112y + G = 0. \quad \textcircled{b}$$

$$\text{¿Cuál es } G? \text{ P es de la recta} \Rightarrow 14 \cdot \frac{1}{14} - 112 \cdot \frac{31}{56} + G = 0 \rightarrow G = 61$$

$$\Rightarrow b_1: 14x - 112y + 61 = 0$$

$$b_2: \left\{ \begin{array}{l} P \\ \vec{V} = \vec{u}_r - \vec{u}_s = \left(\frac{4}{5} - \frac{12}{13}, \frac{3}{5} + \frac{5}{13} \right) = \left(\frac{-8}{65}, \frac{64}{65} \right) \equiv (-8, 64) \end{array} \right. \quad @$$

$$\Rightarrow 64x + 8y + C = 0. \quad b$$

$$\text{¿} C? P \text{ es de la recta} \rightarrow 64 \cdot \frac{1}{14} + 8 \cdot \frac{31}{56} + C = 0 \rightarrow C = -9$$


$$\Rightarrow \boxed{b_2: 64x + 8y - 9 = 0}$$

Observaciones:

- (a) En el vector director de una recta SÓLO interesa la dirección, da igual el módulo
 $\left(\frac{112}{65}, \frac{14}{65} \right)$ y $65 \cdot \left(\frac{112}{65}, \frac{14}{65} \right)$ ambos son válidos y es más sencillo el 2º.
- (b) En una recta en forma general $Ax + By + C = 0$ (A, B) es vector normal y $(-B, A)$ ó $(B, -A)$ un vector director.

Deberemos determinar el área del triángulo \overrightarrow{OAB} .

Es un triángulo rectángulo, las medidas de sus catetos se obtienen de las coordenadas de los puntos A y B , que son los puntos de corte de la recta s (paralela a r y que pasa por P) con los ejes de coordenadas.



?s?

$$\begin{array}{l} \bullet \quad s \parallel r \Rightarrow \vec{v}_s = \vec{v}_r = (4, -6) \\ \bullet \quad \text{un punto de } s \text{ es } P = (2, 3) \end{array} \left\{ \Rightarrow s: \frac{x-2}{4} = \frac{y-3}{-6} \right.$$

?A, B?

$$\text{si } x=0 \text{ (en } s) \Rightarrow \frac{-2}{4} = \frac{y-3}{-6} \rightarrow y=6 \Rightarrow A=(0, 6)$$

$$\text{si } y=0 \text{ (en } s) \Rightarrow \frac{x-2}{4} = \frac{-3}{-6} \rightarrow x=4 \Rightarrow B=(4, 0)$$


?área del triángulo \overrightarrow{OAB} ?

$$\boxed{S = \frac{1}{2} \text{base} \times \text{altura} = \frac{1}{2} 4 \cdot 6 = 12 \text{ u}^2}_{(1)}$$

(1)

u = unidades en que se miden las distancias.

Un dibujo de la situación ayuda a comprender cuál es el argumento para resolver el problema.



$AB = \text{lado diagonal}.$

Sea P la solución.

Método 1.

$|AP| = |BP|$ por ser isóceles.

?P?

① $P \in r \Rightarrow$ cumple su ecuación $P = (1-6\lambda, 1+2\lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

② $|AP| = |BP|$

calcularlos los vectores y los módulos.

$$AP = P - A = (1-6\lambda, 1+2\lambda) - (2, 2) = (-1-6\lambda, -1+2\lambda)$$

$$BP = P - B = (1-6\lambda, 1+2\lambda) - (-10, -2) = (11-6\lambda, 3+2\lambda)$$

$$|AP| = |BP| \Leftrightarrow \sqrt{(-1-6\lambda)^2 + (-1+2\lambda)^2} = \sqrt{(11-6\lambda)^2 + (3+2\lambda)^2} \Leftrightarrow$$

$$1+12\lambda+\cancel{36\lambda^2}+1-4\lambda+\cancel{4\lambda^2}=121-132\lambda+\cancel{36\lambda^2}+9+12\lambda+\cancel{4\lambda^2}$$

$$\Rightarrow 128\lambda = 128 \rightarrow \lambda = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{P = (1-6 \cdot 1, 1+2 \cdot 1) = \boxed{(-5, 3)}}$$

Método 2 .

$$P = (x_1, y)$$

Expresemos la recta r en forma general

$$r: \frac{x-1}{-6} = \frac{y-1}{2} \Leftrightarrow 2x - 2 = -6y + 6 \Rightarrow r: x + 3y - 4 = 0$$

④ $P \in r \rightarrow$ cumple su ecuación.

$$\textcircled{2} |AP| = |BP| \Leftrightarrow \sqrt{(x-2)^2 + (y-2)^2} = \sqrt{(x+10)^2 + (y+2)^2}$$

Tenemos un sistema. Operando sobre la 2^a ecuación:

$$\underbrace{x^2 - 4x + 4 + y^2 - 4y + 4}_{-24x - 8y - 96 = 0} = \underbrace{x^2 + 20x + 100 + y^2 + 4y + 4}_{3x + y + 12 = 0} \Leftrightarrow$$

$$-24x - 8y - 96 = 0 \Leftrightarrow 3x + y + 12 = 0$$

Sistema :

$$\begin{aligned} x + 3y - 4 &= 0 \\ 3x + y + 12 &= 0 \end{aligned} \left\{ \begin{array}{l} (\cdot -3) \\ \hline -3x - 9y + 12 = 0 \\ 3x + y + 12 = 0 \\ \hline -8y + 24 = 0 \rightarrow y = 3 \\ \Rightarrow x + 3 \cdot 3 - 4 = 0 \rightarrow x = -5 \end{array} \right\} \boxed{P = (-5, 3)}$$

Método 3 .

Como $\triangle ABP$ es isósceles de lado desigual AB , el punto P está en la mediatriz del segmento AB . $\Rightarrow P$ es la intersección de 2 rectas : r y $m = \{$ mediatriz del segmento $AB\}$

$$m \left\{ \begin{array}{l} M = \frac{A+B}{2} \\ \vec{v} \text{ es un vector perpendicular a } AB \end{array} \right. \Leftrightarrow$$

M es el punto medio de A y B

$$M = \frac{(2,2) + (-10,-2)}{2} = (-4,0)$$

$$AB \perp \vec{v} \Rightarrow AB = B - A = (-10, -2) - (2, 2) = (-12, -4) \equiv (3, 1)$$

$$\Rightarrow \vec{v} = (1, -3) \quad (*)$$


$$\Rightarrow \text{la recta } m \text{ en forma continua: } \frac{x+4}{1} = \frac{y}{-3} \Leftrightarrow -3x - 12 = y$$

$$\Rightarrow \boxed{m: 3x + y + 12 = 0}$$

Para la intersección de r y m \Leftrightarrow solución del sistema

$$\begin{cases} 3x + y + 12 = 0 & (m) \\ x + 3y - 4 = 0 & (r) \end{cases} \Rightarrow \boxed{P = (-5, 3)}$$

ÁREA DEL TRIÁNGULO $\triangle ABP$



$$S = \frac{|AB| \cdot h}{2}$$

? h? $h = \text{dis}(r_{AB}, P)$


$$\text{? } r_{AB} ? \quad \begin{cases} A = (2, 2) \\ \vec{v} = AB = (3, 1) \end{cases} \Rightarrow \frac{x-2}{3} = \frac{y-2}{1} \Leftrightarrow \boxed{x - 3y + 4 = 0}$$

$$\Rightarrow \text{dis}(r_{AB}, P) = \frac{|-5 - 3 \cdot 3 + 4|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2}} = \frac{10}{\sqrt{10}} = \frac{10\sqrt{10}}{10} = \sqrt{10} \quad \left\{ \Rightarrow \boxed{S = \frac{\sqrt{160} \cdot \sqrt{10}}{2} = 40 \text{ u}^2} \right.$$

$$|AB| = |(-12, -4)| = \sqrt{(-12)^2 + (-4)^2} = \sqrt{160}$$

(*) Recuerda si $\vec{v} = (a, b)$ un vector perpendicular es $\vec{n} = (b, -a)$

Recuerda la fórmula del área de un trapecio.



h : altura
 b : base menor
 B : base mayor
 S : área

$$\Rightarrow S = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$$

- Veamos si es un triángulo isósceles.

Para ello calcularemos las longitudes de los lados.


$$|AB| = c \\ AB = B - A = (11, 10) - (4, 9) = (7, 1) \quad \left\{ \rightarrow c = \sqrt{7^2 + 1^2} = \sqrt{50} \right.$$

$$|AC| = b \\ AC = C - A = (9, 4) - (4, 9) = (5, -5) \quad \left\{ \rightarrow b = \sqrt{5^2 + (-5)^2} = \sqrt{50} \right.$$

$$|BC| = a \\ BC = C - B = (9, 4) - (11, 10) = (-2, -6) \quad \left\{ \rightarrow a = \sqrt{(-2)^2 + (-6)^2} = \sqrt{40} \right.$$

$$\boxed{b = c \neq a \Rightarrow \triangle ABC \text{ es isósceles}}$$

- Determinación de la recta r .



El lado designado es BC .

r { punto P
 vector director $\vec{v} = \vec{BC}$


En forma continua

$$r: \frac{x-7}{-2} = \frac{y-6}{-6}$$

$$\Leftrightarrow -6x + 42 = -2y + 12 \\ \Leftrightarrow -6x + 2y + 30 = 0$$

$$\Leftrightarrow \boxed{-3x + y + 15 = 0}$$

• Determinación del área del trapecio



$$S = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$$

Base mayor $B = |BC|$

Base menor $b = |B'C'|$.

Altura $h = \text{dis}(r, B)$ (*)

? B' ? Es el punto de corte de la recta r con la recta que pasa por A y B (la llamaremos r_{AB})

$$r_{AB} \left\{ \begin{array}{l} A = (4, 9) \\ \vec{v} = AB = (7, 1) \end{array} \right. \Rightarrow \frac{x-4}{7} = \frac{y-9}{1} \Leftrightarrow \boxed{x - 7y + 59 = 0}$$

interna:

$$\begin{aligned} -3x + y + 15 = 0 \\ x - 7y + 59 = 0 \end{aligned} \left\{ \begin{array}{l} (-3) \\ (1) \end{array} \right. \Leftrightarrow \begin{aligned} -3x + y + 15 = 0 \\ 3x - 21y + 177 = 0 \\ -20y + 192 = 0 \rightarrow y = \frac{48}{5} \end{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \boxed{B' = \left(\frac{41}{5}, \frac{48}{5}\right)} \\ \end{array} \right.$$

$$x - 7 \cdot \frac{48}{5} + 59 = 0 \rightarrow x = \frac{41}{5}$$

? C' ? Es el punto de corte de la recta r con la recta que pasa por A y C (la llamaremos r_{AC})

$$r_{AC} \left\{ \begin{array}{l} A = (4, 9) \\ \vec{v} = AC = (5, -5) = (1, -1) \end{array} \right. \Rightarrow \frac{x-4}{1} = \frac{y-9}{-1} \Leftrightarrow \boxed{x + y - 13 = 0}$$

interna

$$\begin{aligned} -3x + y + 15 = 0 \\ x + y - 13 = 0 \end{aligned} \left\{ \begin{array}{l} (-3) \\ (1) \end{array} \right. \Leftrightarrow \begin{aligned} -3x + y + 15 = 0 \\ -x - y + 13 = 0 \\ -4x + 28 = 0 \rightarrow x = 7 \end{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \boxed{C' = (7, 6)} \\ \end{array} \right.$$

$$7 + y - 13 = 0 \rightarrow y = 6$$

Base mayor $B = |BC| = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$

Base menor $|B'C'|$

$$B'C' = C' - B' = (7, 6) - \left(\frac{4}{5}, \frac{48}{5}\right) = \left(-\frac{6}{5}, -\frac{18}{5}\right)$$

$$|B'C'| = \sqrt{\left(-\frac{6}{5}\right)^2 + \left(-\frac{18}{5}\right)^2} = \frac{\sqrt{360}}{5} = \frac{6\sqrt{10}}{5}.$$

Altura (*)

Se puede calcular de varios modos.

$$\text{dis}(r, B') = \text{dis}(r, C') = \text{dis}(r_{B'C'}, B) = \text{dis}(r_{B'C'}, C)$$

($r_{B'C'}$ es la recta que pasa por B' y C')

(mos hemos calculado la recta r aplicaré

$$h = \text{dis}(r, B)$$

Recuerda la fórmula de la distancia de un punto a una recta.

$$\Rightarrow h = \frac{|-3 \cdot 1 + 10 + 15|}{\sqrt{(-3)^2 + 1^2}} = \frac{|-33 + 25|}{\sqrt{10}} = \frac{8}{\sqrt{10}} = \frac{8 \cdot \sqrt{10}}{10} = \frac{4\sqrt{10}}{5}$$

$$\Rightarrow S = \frac{\left(2\sqrt{10} + \frac{6\sqrt{10}}{5}\right) \cdot \frac{4\sqrt{10}}{5}}{2} = \frac{1}{2} \cdot \left(2 + \frac{6}{5}\right) \cdot \frac{4}{5} \cdot \sqrt{10} \cdot \sqrt{10} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{16}{5} \cdot \frac{4}{5} \cdot 10 = \frac{64}{5} u^2 \Rightarrow$$

$$\boxed{S = \frac{64}{5} u^2}$$

Cómo aparece la distancia de un punto a una recta es conveniente expresar la recta r en forma general:

$$r: 3(x+1) = 4(y-4) \Leftrightarrow 3x + 3 = 4y - 16 \Rightarrow r: 3x - 4y + 19 = 0$$

ARGUMENTO.

- P es del eje de abscisas $\Rightarrow P = (a, 0)$
- $\text{dis}(A, P) = \text{dis}(P, r)$

Esta última igualdad en coordenadas proporciona la ecuación que determine el valor de a (y por lo tanto de P).

$$\begin{aligned} \text{dis}(A, P) &= |AP| = |P-A| = |(a, 0) - (5, 4)| = \sqrt{(a-5)^2 + (-4)^2}. \\ \text{dis}(P, r) &= \frac{|3a - 4 \cdot 0 + 19|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|3a + 19|}{5} \end{aligned} \quad \left. \right\} \Rightarrow$$

$$\boxed{\sqrt{(a-5)^2 + 16} = \frac{|3a + 19|}{5}}$$

Borrando al cuadrado ambos miembros y operando:

$$25 \cdot [a^2 - 10a + 25 + 16] = (3a + 19)^2 \Leftrightarrow$$

$$25a^2 - 250a + 1025 = 9a^2 + 114a + 361 \Leftrightarrow$$

$$16a^2 - 364a + 664 = 0 \Leftrightarrow \boxed{4a^2 - 91a + 166 = 0} \Rightarrow$$

$$\boxed{a = \frac{91 \pm \sqrt{75}}{8} = \begin{cases} a_1 = \frac{83}{4} \\ a_2 = 2 \end{cases}}$$

$$\Rightarrow \boxed{P_1 = \left(\frac{83}{4}, 0\right) \text{ y } P_2 = (2, 0)}$$

Haz de rectas (en forma punto-pendiente.) que pasan por $P = (2, 3)$
 $y - 3 = m(x - 2)$.

¿Qué segmentos determinan con los ejes cartesianos?

$$\text{Eje } X: y = 0 \rightarrow 0 - 3 = m(x - 2) \rightarrow x = \frac{2m-3}{m}.$$

$$\text{Eje } Y: x = 0 \rightarrow y - 3 = m \cdot (0 - 2) \rightarrow y = 2m - 3.$$

Condición:

$$\frac{2m-3}{m} = |2m-3| \quad (*)$$

$$\bullet \frac{2m-3}{m} = 2m-3 \rightarrow 2m-3 = (2m-3) \cdot m \Leftrightarrow (2m-3) \cdot (m-1) = 0 \\ \rightarrow m = 1 \quad m = \frac{3}{2}.$$

$$\bullet \frac{2m-3}{m} = -(2m-3) \rightarrow 2m-3 = -(2m-3) \cdot m \Leftrightarrow (2m-3) \cdot (-m+1) = 0 \\ \rightarrow m = -1 \quad m = \frac{3}{2}.$$

Tenemos 3 soluciones:

$$\bullet m = 1 \rightarrow y - 3 = 1 \cdot (x - 2) \Leftrightarrow x - y + 1 = 0$$

$$\bullet m = -1 \rightarrow y - 3 = -1 \cdot (x - 2) \Leftrightarrow -x - y + 1 = 0 \Leftrightarrow x + y - 5 = 0$$

$$\bullet m = \frac{3}{2} \rightarrow y - 3 = \frac{3}{2}(x - 2) \Leftrightarrow y - 3 = \frac{3}{2}x - 3 \rightarrow y = \frac{3}{2}x$$


la última recta pasa por el origen de coordenadas \rightarrow no corta a los ejes cartesianos en "segmentos". Por lo tanto, la descartamos como solución.

- (*) Deben ser iguales las longitudes de los segmentos y una longitud es una cantidad POSITIVA.

OTRO MÉTODO.

Busquemos la recta en forma segmentaria

$$\frac{x}{P} + \frac{y}{q} = 1$$



$$(P, q \neq 0)$$

$$P \in r \rightarrow \frac{2}{P} + \frac{3}{q} = 1.$$

Segmentos iguales $\rightarrow |P| = |q| \Leftrightarrow P = \pm q$.

Tendremos 2 soluciones.

$$\left. \begin{array}{l} \frac{2}{P} + \frac{3}{q} = 1 \\ P = q \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 2q + 3P = pq \\ P = q \end{array} \right\} \Leftrightarrow 5P = p^2 \rightarrow \boxed{P=5} \rightarrow \boxed{q=5}$$

$$(P \neq 0)$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{2}{P} + \frac{3}{q} = 1 \\ P = -q \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 2q + 3P = pq \\ P = -q \end{array} \right\} \Leftrightarrow 2q - 3q = -q^2 \rightarrow q = q^2 \rightarrow \boxed{q=1} \rightarrow \boxed{P=-1}$$

Soluciones:

$$r: \frac{x}{5} + \frac{y}{5} = 1 \leftrightarrow 5x + 5y = 25 \leftrightarrow \boxed{x + y - 5 = 0}$$

$$r': \frac{x}{-1} + \frac{y}{1} = 1 \leftrightarrow x - y = -1 \leftrightarrow \boxed{x - y + 1 = 0}$$