

## EXAMEN DERIVADAS

1.- Definición de función derivada de una función.

Utilizando la definición, calcula la función derivada de la función  $f(x) = x^2 - 5x + 7$  y halla la pendiente de la tangente a esta curva en el punto de abscisa  $x=-1$ . (2 puntos)

2.- Dibuja una función que tenga derivada nula en  $x= -1$  y  $x = 1$ , derivada negativa en el intervalo  $(-1,1)$  y positiva para cualquier otro valor de  $x$ . (1 punto)

2.- Halla las derivadas de las siguientes funciones: (5 puntos)

a)  $y = \frac{2x^3 - 3x^2 + 2}{5x}$

b)  $y = \sqrt{\cos x - \operatorname{sen} x}$

c)  $y = \ln \left[ \frac{x-3}{x+3} \right]$

d)  $y = (x^2 + 3x) \cdot e^{-2x+1}$

e)  $y = (2x - \sqrt{x})^2$

3.- Halla razonadamente un punto de la función  $y = x^2 + x + 1$  en el que la recta tangente sea paralela a la recta de ecuación  $y = 3x + 7$ . Halla también la ecuación de dicha recta tangente. (2 puntos)

## SOLUCIONES


1.-  $f(x) = x^2 - 5x + 7$  La función derivada es  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ , de

donde:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - 5(x+h) + 7 - (x^2 - 5x + 7)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + h^2 + 2xh - 5x - 5h - x^2 + 5x - 7}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2xh - 5h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h + 2x - 5)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 2x - 5) = 2x - 5 \end{aligned}$$

La pendiente de la tangente en  $x=-1$  será  $f'(-1) = 2 \cdot (-1) - 5 = -7$

2.- Una función que cumpla las características pedidas, tendrá que ser decreciente (derivada negativa) en el intervalo  $(-1,1)$  y creciente en el resto. Por lo tanto, tendrá un máximo en  $-1$  y un mínimo en  $1$ , por ejemplo la gráfica de la derecha cumple las condiciones.



3.- a)  $y = \frac{2x^3 - 3x^2 + 2}{5x}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(6x^2 - 6x) \cdot 5x - (2x^3 - 3x^2 + 2) \cdot 5}{(5x)^2} = \frac{30x^3 - 30x^2 - 10x^3 + 15x^2 - 10}{25x^2} = \\ &= \frac{20x^3 - 15x^2 - 10}{25x^2} = \frac{4x^3 - 3x^2 - 2}{5x^2} \end{aligned}$$

b)  $y = \sqrt{\cos x - \operatorname{sen} x}$   $y' = \frac{1}{2\sqrt{\cos x - \operatorname{sen} x}} \cdot (-\operatorname{sen} x - \cos x) = -\frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{2\sqrt{\cos x - \operatorname{sen} x}}$

c)  $y = \ln \left[ \frac{x-3}{x+3} \right]$   $y' = \frac{1}{\frac{x-3}{x+3}} \cdot \frac{1 \cdot (x+3) - (x-3) \cdot 1}{(x+3)^2} = \frac{x+3-x+3}{\frac{x-3}{x+3} \cdot (x+3)^2}$

$$y' = \frac{6}{(x-3)(x+3)} = \frac{6}{x^2 - 9}$$

d)  $y = (x^2 + 3x) \cdot e^{-2x+1}$

$$y' = (2x + 3) \cdot e^{-2x+1} + (x^2 + 3x) \cdot e^{-2x+1} \cdot (-2)$$

$$y' = (2x + 3) \cdot e^{x^2} + (-2x^2 - 6x) \cdot e^{x^2} = e^{x^2} (-2x^2 - 4x + 3)$$

$$e) y = (2x - \sqrt{x})^2 \quad y' = 2(2x - \sqrt{x}) \left( 2 - \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) = 2(2x - \sqrt{x}) \frac{4\sqrt{x} - 1}{2\sqrt{x}}$$

$$y' = \frac{(2x - \sqrt{x})(4\sqrt{x} - 1)}{\sqrt{x}} = \frac{8x\sqrt{x} - 2x - 4x - \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \frac{(8x - 1)\sqrt{x} - 6x}{\sqrt{x}}$$

4.-  $y = x^2 + x + 1$  tangente paralela a  $y = 3x + 7$ , esto significa que tiene la misma pendiente, que es 3 (coeficiente de la x).

Luego, hallaremos la derivada e igualaremos a 3:

$$y' = 2x + 1 = 3 \Rightarrow 2x = 2 \Rightarrow x = 1, \text{ luego la recta tangente es en el punto de abscisa 1,}$$

$$\text{hallemos la ordenada: } y = 1^2 + 1 + 1 = 3$$

$$\text{Ecuación de la recta tangente: } y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$y - 3 = 3(x - 1) \Rightarrow y = 3x - 3 + 3 \Rightarrow y = 3x$$

www.yoquieroaprobar.es