



1 Tenemos dos urnas: A [●○○○○] B [●●○○○]

Consideramos tres supuestos:

I. Sacamos una bola de A y, después, una bola de B.

II. Mezclamos las bolas de las dos urnas y sacamos dos bolas.

III. Sacamos una bola de A, la echamos en B, removemos y sacamos una bola de B.

Para cada uno de los tres casos, calcula las probabilidades siguientes:

a) Las dos bolas son negras.

b) Las dos bolas son blancas.

c) La primera es blanca, y la segunda, negra.

Resolución

Supuesto I:

$$a) P[2 \text{ NEGRAS}] = P[\text{● de A}] \cdot P[\text{● de B}] = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{8}$$

$$b) P[2 \text{ BLANCAS}] = P[\text{○ de A}] \cdot P[\text{○ de B}] = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{8}$$

$$c) P[\text{○ de A y ● de B}] = P[\text{○ de A}] \cdot P[\text{● de B}] = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{8}$$

Supuesto II:

$$a) P[2 \text{ NEGRAS}] = P[\text{● la 1.ª}] \cdot P[\text{● la 2.ª} / \text{● la 1.ª}] = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{3}{28}$$

$$b) P[2 \text{ BLANCAS}] = P[\text{○ la 1.ª}] \cdot P[\text{○ la 2.ª} / \text{○ la 1.ª}] = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14}$$

$$c) P[\text{○ la 1.ª y ● la 2.ª}] = P[\text{○ la 1.ª}] \cdot P[\text{● la 2.ª} / \text{○ la 1.ª}] = \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} = \frac{15}{56}$$

Supuesto III:

$$a) P[2 \text{ NEGRAS}] = P[\text{● de A}] \cdot P[\text{● de B} / \text{● de A}] = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{20}$$

$$b) P[2 \text{ BLANCAS}] = P[\text{○ de A}] \cdot P[\text{○ de B} / \text{○ de A}] = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{20}$$

$$c) P[\text{○ de A y ● de B}] = P[\text{○ de A}] \cdot P[\text{● de B} / \text{○ de A}] = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3}{10}$$

2 La siguiente tabla corresponde a una distribución de probabilidad de variable discreta:

x_i	5	6	7	8	9	10
p_i	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	...

Complétala y calcula μ y σ .

Resolución

x_i	5	6	7	8	9	10
p_i	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2

$$\mu = 7,4, \quad \sigma = 1,69$$



3 ¿Cuáles de las siguientes distribuciones son binomiales?:

- I. Sacamos seis cartas de una baraja y nos preguntamos por el número de oros.
- II. En una clase hay 10 chicos y 20 chicas. Elegimos 6 al azar. ¿Cuántos son chicos?
- III. Lanzamos un dado 20 veces. Nos preguntamos por la cantidad de “cincos”.
- IV. El 3% de los coches producidos en una factoría tienen algún defecto de fábrica. Cada día se producen 200. Nos preguntamos por la probabilidad de que haya k defectuosos.

En cada binomial, identifica n y p y calcula μ y σ .

Resolución

- I. No es binomial porque al sacar cada carta cambia la composición de la baraja y, por tanto, la probabilidad de que la siguiente sea OROS.
- II. Al haber solo 30 personas, cada una que se extraiga modifica la probabilidad CHICO-CHICA de las restantes. Es decir, es un caso similar al I.
- III. En cada lanzamiento de dado, $P[\text{5}] = \frac{1}{6}$. Por tanto, la distribución de probabilidades del “número de cincos” es binomial, con $n = 20$, $p = \frac{1}{6}$.
 En una distribución $B\left(20, \frac{1}{6}\right)$, $\mu = np = \frac{20}{6} = 3,33$, $\sigma = \sqrt{20 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}} = \sqrt{\frac{100}{36}} = \frac{10}{6} = 1,67$.
- IV. El “número de coches defectuosos” de los 200 producidos en un día es una distribución binomial con $n = 200$ y $p = 0,03$.
 En una distribución $B(200; 0,03)$, $\mu = 200 \cdot 0,03 = 6$, $\sigma = \sqrt{200 \cdot 0,03 \cdot 0,97} = 2,41$.

4 Con un cierto tipo de chinchetas se dan las siguientes probabilidades al dejarlas caer:

$$P[\text{🔴}] = 0,3 \quad P[\text{🔴}] = 0,7$$

Dejamos caer 6 chinchetas. Calcula:

a) $P[2 \text{ 🔴 y } 4 \text{ 🔴}]$ b) $P[\text{alguna 🔴}]$

Resolución

El número de chinchetas que caen así 🔴 se distribuye $B(6; 0,3)$.

a) $P[2 \text{ 🔴 y } 4 \text{ 🔴}] = P[x = 2] = \binom{6}{2} 0,3^2 \cdot 0,7^4 = 15 \cdot 0,3^2 \cdot 0,7^4 = 0,3241$

b) Empezamos calculando $P[x = 0] = \binom{6}{0} 0,3^0 \cdot 0,7^6 = 0,7^6 = 0,1176$

$$P[\text{alguna 🔴}] = 1 - P[\text{ninguna 🔴}] = 1 - P[x = 0] = 1 - 0,1176 = 0,8824$$