

DISOLUCIONES

- 1.- Una disolución de ácido sulfúrico (H_2SO_4) tiene una densidad de $1,045 \text{ g/cm}^3$. Si la cantidad existente del ácido en 1 litro de disolución es 99 g, determina la molaridad de la disolución. \otimes
- 2.- Disolvemos 24 g de cloruro de potasio en agua hasta obtener $\frac{3}{4}$ L de disolución. Sabiendo que la densidad de la misma, a $20 \text{ }^\circ\text{C}$, es $1017,3 \text{ kg/m}^3$, calcula: **a)** La concentración en % en masa; **b)** la Molaridad; **c)** las fracciones molares de soluto y disolvente. \otimes
- 3.- ¿Qué cantidad de nitrato de magnesio puro habrá que emplear para preparar 250 ml de una disolución $0,05 \text{ M}$ de dicha sal? \otimes
- 4.- ¿Qué cantidad de hipoclorito de sodio al 96 % habrá que emplear para preparar 25 ml de una disolución $0,15 \text{ M}$ de dicha sal? \otimes
- 5.- ¿Qué volumen de ácido sulfúrico concentrado de $1,8 \text{ g/cm}^3$ de densidad y un 70 % de riqueza habrá que tomar para preparar $\frac{1}{2}$ litro de disolución $0,1 \text{ M}$? \otimes
- 6.- ¿Qué volumen de HCl del 36 % y $1,19 \text{ g/cm}^3$ de densidad necesitarás para preparar $\frac{1}{4}$ litro de disolución $0,23 \text{ M}$ de HCl . \otimes
- 7.- Se dispone de ácido sulfúrico al 80 % de riqueza en masa. Calcula: **a)** su concentración en g/L y su molaridad; **b)** el volumen necesario para preparar $\frac{3}{4}$ L de disolución $0,3 \text{ M}$. **Nota:** Sabemos que la densidad del ácido es de $1800 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$. \otimes
- 8.- Disolvemos 7 g de H_2S en 55 g de agua obteniéndose una disolución de densidad $1080 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$. Determina la concentración en % en masa, en g/L, molaridad y fracción molar de H_2S . \otimes

Soluciones a los ejercicios

$$1. \quad \otimes \quad [H_2SO_4] = \frac{m}{M \times V_{dn}} = \frac{99 \text{ g}}{98 \text{ g} \times \text{mol}^{-1} \times 1 \text{ l}} = \mathbf{1,01 \text{ M}}$$

$$2. \quad \otimes \quad \text{a) } \% = \frac{m_s}{m_{dn}} \times 100 = \frac{m_s}{V_{dn} \times d_{dn}} \times 100 = \frac{24 \text{ g}}{0,75 \text{ l} \times 1017 \text{ kg} \times \text{m}^{-3}} \times 100 \times \frac{\text{kg}}{1000 \text{ g}} \times \frac{1000 \text{ l}}{\text{m}^3} = \mathbf{3,15 \%}$$

$$\text{b) } [KCl] = \frac{m}{M \times V_{dn}} = \frac{24 \text{ g}}{74,6 \text{ g} \times \text{mol}^{-1} \times 0,75 \text{ l}} = \mathbf{0,43 \text{ M}}$$

$$\text{c) } m_{dn} = V_{dn} \times d_{dn} = 0,75 \text{ l} \times 1017 \text{ g} \times \text{l}^{-1} = 762,75 \text{ g}$$

$$m_{\text{agua}} = m_{dn} - m_s = 762,75 \text{ g} - 24 \text{ g} = 738,75 \text{ g}$$

$$n_s = \frac{m_s}{M_s} = \frac{24 \text{ g}}{74,6 \text{ g} \times \text{mol}^{-1}} = 0,3217 \text{ moles de KCl}$$

$$n_{\text{agua}} = \frac{m_{\text{agua}}}{M_{\text{agua}}} = \frac{738,75 \text{ g}}{18,0 \text{ g} \times \text{mol}^{-1}} = 41,04 \text{ moles de H}_2\text{O}$$

$$\chi(\text{KCl}) = \frac{n_s}{n_s + n_{\text{agua}}} = \frac{0,3217 \text{ mol}}{0,3217 \text{ mol} + 41,04 \text{ mol}} = \mathbf{0,007777}$$

$$\chi(\text{H}_2\text{O}) = \frac{n_{\text{agua}}}{n_s + n_{\text{agua}}} = \frac{41,04 \text{ mol}}{0,3217 \text{ mol} + 41,04 \text{ mol}} = \mathbf{0,9922}$$

$$3. \quad \otimes \quad m_s (\text{puro}) = [Mg(NO_3)_2] \times M_s \times V_{dn} = 0,05 \text{ mol} \times \text{l}^{-1} \times 148,3 \text{ g} \times \text{mol}^{-1} \times 0,25 \text{ l} = \mathbf{1,85 \text{ g}}$$

4. $\boxtimes m_s(\text{puro}) = [\text{NaClO}] \times M_s \times V_{dn} = 0,15 \text{ mol} \times l^{-1} \times 74,5 \text{ g} \times \text{mol}^{-1} \times 0,025 l = 0,28 \text{ g}$

$$m_s(\text{comercial}) = m_s(\text{puro}) \times \frac{100}{96} = 0,279 \times \frac{100}{96} = \mathbf{0,29 \text{ g}}$$

5. $\boxtimes m_s(\text{puro}) = [\text{H}_2\text{SO}_4] \times M_s \times V_{dn} = 0,1 \text{ mol} \times l^{-1} \times 98,1 \text{ g} \times \text{mol}^{-1} \times 0,5 l = 4,9 \text{ g}$

$$m_s(\text{comercial}) = m_s(\text{puro}) \times \frac{100}{70} = 4,9 \times \frac{100}{70} = 7,0 \text{ g} ; \quad V = \frac{m}{d} = \frac{7,0 \text{ g}}{1,8 \text{ g} \times \text{cm}^{-3}} = \mathbf{3,9 \text{ cm}^3}$$

6. $\boxtimes m_s(\text{puro}) = [\text{HCl}] \times M_s \times V_{dn} = 0,23 \text{ mol} \times l^{-1} \times 36,5 \text{ g} \times \text{mol}^{-1} \times 0,25 l = 2,1 \text{ g}$

$$m_s(\text{comercial}) = m_s(\text{puro}) \times 36 = 2,1 \times \frac{100}{36} = 5,8 \text{ g} ; \quad V = \frac{m}{d} = \frac{5,8 \text{ g}}{1,19 \text{ g} \times \text{cm}^{-3}} = \mathbf{4,9 \text{ cm}^3}$$

7. $\boxtimes \text{a) } \% = \frac{m_s}{m_{dn}} \times 100 = \frac{100 m_s}{d_{dn} \times V_{dn}} = \frac{100}{d_{dn}} \times \text{conc} (\text{g} / l)$

$$\text{conc} (\text{g} / l) = \frac{\% \times d_{dn}}{100} = \frac{80 \times 1800 \text{ kg} \times \text{m}^{-3}}{100} \times \frac{1000 \text{ g}}{\text{kg}} \times \frac{\text{m}^3}{1000 l} = \mathbf{1440 \frac{\text{g}}{l}}$$

$$[\text{H}_2\text{SO}_4] = \frac{m_s}{M_s \times V_{dn}} = \frac{\text{conc} (\text{g} / l)}{M_s} = \frac{1440 \text{ g} \times l^{-1}}{98,1 \text{ g} \times \text{mol}^{-1}} = \mathbf{14,7 \frac{\text{mol}}{l}}$$

b) $m_s(\text{puro}) = [\text{H}_2\text{SO}_4] \times M_s \times V_{dn} = 0,3 \text{ mol} \times l^{-1} \times 98,1 \text{ g} \times \text{mol}^{-1} \times 0,75 l = 22,1 \text{ g}$

$$m_s(\text{comercial}) = m_s(\text{puro}) \times 80 = 22,1 \times \frac{100}{80} = 27,6 \text{ g} ; \quad V = \frac{m}{d} = \frac{27,6 \text{ g}}{1,8 \text{ g} \times \text{cm}^{-3}} = \mathbf{15,3 \text{ cm}^3}$$

8. $\boxtimes \% = \frac{m_s}{m_{dn}} \times 100 = \frac{m_s}{m_s + m_{dn}} \times 100 = \frac{7 \text{ g}}{7 \text{ g} + 55 \text{ g}} \times 100 = \mathbf{11,29 \%}$

$$\text{conc} (\text{g} / l) = \frac{\% \times d_{dn}}{100} = \frac{11,29 \times 1080 \text{ kg} \times \text{m}^{-3}}{100} \times \frac{1000 \text{ g}}{\text{kg}} \times \frac{\text{m}^3}{1000 l} = \mathbf{121,9 \frac{\text{g}}{l}}$$

$$[\text{H}_2\text{S}] = \frac{m_s}{M_s \times V_{dn}} = \frac{\text{conc} (\text{g} / l)}{M_s} = \frac{121,9 \text{ g} \times l^{-1}}{34,1 \text{ g} \times \text{mol}^{-1}} = \mathbf{3,57 M}$$

$$\chi(\text{H}_2\text{S}) = \frac{n(\text{H}_2\text{S})}{n(\text{H}_2\text{S}) + n(\text{H}_2\text{O})} = \frac{\frac{m(\text{H}_2\text{S})}{M(\text{H}_2\text{S})}}{\frac{m(\text{H}_2\text{S})}{M(\text{H}_2\text{S})} + \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})}} = \frac{\frac{7 \text{ g}}{34,1 \text{ g} \times \text{mol}^{-1}}}{\frac{7 \text{ g}}{34,1 \text{ g} \times \text{mol}^{-1}} + \frac{55 \text{ g}}{18,0 \text{ g} \times \text{mol}^{-1}}} = \mathbf{0,063}$$