


TEMA 7. GEOMETRÍA

NOTACIÓN DE UN TRIÁNGULO


En geometría, los puntos suelen nombrarse mediante letras mayúsculas y las rectas, mediante letras minúsculas. Un segmento de extremos A y B se designa por AB y su longitud por \overline{AB} .

Para un triángulo usamos la siguiente nomenclatura:




El vértice con letra mayúscula (A) y el lado opuesto a ese vértice con su minúscula (a)

CLASIFICACIÓN DE ÁNGULOS:



ÁNGULOS DETERMINADOS SOBRE RECTAS PARALELAS






Ángulos correspondientes $\hat{a} = \hat{e}$; $\hat{c} = \hat{g}$; $\hat{b} = \hat{f}$; $\hat{d} = \hat{h}$

Ángulos alternos externos $\hat{b} = \hat{g}$; $\hat{a} = \hat{h}$




Ángulos alternos internos $\hat{c} = \hat{f}$; $\hat{d} = \hat{e}$

CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS


POR SUS LADOS



POR SUS ÁNGULOS



TEOREMA DE TALES




Si las rectas a y b son paralelas y cortan a otras dos rectas r y r' entonces los segmentos que determinan en ellas son proporcionales


$$\frac{OA}{AB} = \frac{OA'}{A'B'}$$

Ejercicios:


1. Las rectas a , b y c son paralelas. Halla la longitud de x



2. Las rectas a, b son paralelas. ¿Podemos afirmar que c es paralela a las rectas a y b?




EL TEOREMA DE THALES EN UN TRIÁNGULO



Dado un **triángulo ABC**, si se traza un **segmento paralelo, B'C'**, a uno de los **lados** del triángulo, se obtiene otro **triángulo AB'C'**, cuyos **lados** son **proporcionales** a los del **triángulo ABC**.



$$\frac{AB}{AB'} = \frac{AC}{AC'} = \frac{BC}{B'C'}$$

Ejemplo: Hallar las medidas de los segmentos a y b.



SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS

Sean dos triángulos



Los lados a y a', b y b', c y c' se llaman **lados homólogos**.

Son **ángulos homólogos**: \widehat{A} y $\widehat{A'}$; \widehat{B} y $\widehat{B'}$; \widehat{C} y $\widehat{C'}$

Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos homólogos iguales y sus lados homólogos proporcionales.

- $\widehat{A} = \widehat{A}'$; $\widehat{B} = \widehat{B}'$; $\widehat{C} = \widehat{C}'$
- $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = r$

La razón de la proporción entre los lados de los triángulos se llama **razón de semejanza**.

La razón de los perímetros de los triángulos semejantes es igual a su razón de semejanza.

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \frac{a+b+c}{a'+b'+c'} = \frac{p}{p'} = r$$


CRITERIOS DE SEMEJANZA:

1. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales.
2. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales.
3. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos igual.

EJERCICIOS

1. Razona si son semejantes los siguientes triángulos:

a)



Para ver si son semejantes comprobamos si los lados homólogos, de los dos triángulos, son proporcionales

$$\frac{12}{18} = \frac{10}{15} = \frac{15}{22,5}$$

$12 \cdot 15 = 18 \cdot 10 = 180$; $10 \cdot 22,5 = 15 \cdot 15 = 225$ luego sí son semejantes porque tienen los lados proporcionales

b)



Como la suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180° , podemos calcular el ángulo desconocido en cada uno de los triángulos:

$$180^\circ - 100^\circ - 60^\circ = 20^\circ \quad ; \quad 180^\circ - 100^\circ - 20^\circ = 60^\circ$$

Son semejantes porque tienen los ángulos iguales.




$$\frac{20}{17,5} = \frac{8}{7} \quad ; \quad 20 \cdot 7 = 17,5 \cdot 8 = 140$$

Son proporcionales porque tienen dos lados proporcionales y un ángulo igual.

EJERCICIOS


1. Para calcular la distancia desde la playa a un barco se han tomado las medidas de la figura. Calcula la distancia al barco

$$\frac{x}{140} = \frac{70}{7} \quad ; \quad x = 1400 \text{ m}$$



2. En un mapa escala 1:300000 la distancia que separa dos ciudades es de 5 cm. ¿A qué distancia real se encuentran ambas ciudades?


- Los lados de un triángulo miden 6, 8 y 12 cm. Se construye otro semejante cuyas dimensiones son 9, 12 y 18 cm. ¿Cuál es la razón de semejanza?
- Un rectángulo tiene unas dimensiones de 15 cm x 20 cm. Si el lado menor de otro rectángulo semejante a él mide 6 cm, ¿cuánto mide el lado mayor?
- Determina el valor de x en cada uno de los siguientes triángulos



- Determina el valor de x



- Completa la proporción:



8. Determina el valor de x , en cada caso

