

Demostrar las siguientes identidades:

$$(a) \quad \operatorname{sen}^4 \alpha + 2 \operatorname{sen}^2 \alpha \left(1 - \frac{1}{\operatorname{cosec}^2 \alpha}\right) = 1 - \cos^4 \alpha$$

$$(b) \quad \frac{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{cot}^2 \alpha} = \left(\frac{1 - \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{cot} \alpha}\right)^2$$

$$(c) \quad \frac{1 - \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha}{(\operatorname{sec} \alpha - \operatorname{cosec} \alpha) \cos \alpha} \cdot \frac{\operatorname{sen}^2 \alpha - \cos^2 \alpha}{\operatorname{sen}^3 \alpha + \cos^3 \alpha} = \operatorname{sen} \alpha$$

$$(d) \quad \operatorname{cosec} \alpha (\operatorname{sec} \alpha - 1) - \operatorname{cot} \alpha (1 - \cos \alpha) = \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{sen} \alpha$$

$$(e) \quad (\operatorname{sec} \alpha - 1)^2 - \operatorname{tg} \alpha^2 = (1 - \cos \alpha)^2$$

$$(f) \quad \frac{\operatorname{tg}^3 \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} + \frac{\operatorname{cot}^3 \alpha}{1 + \operatorname{cot}^2 \alpha} = \frac{1 - 2 \operatorname{sen}^2 \alpha \cos^2 \alpha}{\operatorname{sen} \alpha \cos \alpha}$$

$$(g) \quad a = \operatorname{cot} \alpha \Rightarrow a + \frac{1}{a} = \operatorname{sec} \alpha \operatorname{consec} \alpha$$

$$(h) \quad \operatorname{sen}^4 \alpha (3 - 2 \operatorname{sen}^2 \alpha) + \cos^4 \alpha (3 - 2 \cos^2 \alpha) = 1$$

$$(i) \quad \operatorname{cot}^2 \alpha \frac{\operatorname{sec} \alpha - 1}{1 + \operatorname{sen} \alpha} + \operatorname{sec}^2 \alpha \frac{\operatorname{sen} \alpha - 1}{1 + \operatorname{sec} \alpha} = 0$$

$$(j) \quad \frac{2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha - \cos \alpha}{1 - \operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen}^2 \alpha - \cos^2 \alpha} = \operatorname{cot} \alpha$$

$$(k) \quad \operatorname{tg} \beta = \frac{n \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha}{1 - n \operatorname{sen}^2 \alpha} \Rightarrow \operatorname{tg}(\alpha - \beta) = (1 - n) \operatorname{tg} \alpha$$

$$(l) \quad \frac{1 + \cos \alpha + \cos \frac{\alpha}{2}}{\operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen} \frac{\alpha}{2}} = \operatorname{cot} \frac{\alpha}{2}$$

$$(m) \quad \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \operatorname{cosec} \alpha - \operatorname{sen} \alpha \Rightarrow \cos^2 \frac{\alpha}{2} = \cos 36^\circ$$

Demostrar las identidades:

$$(a) \operatorname{tg} \alpha + \cot \alpha = \sec \alpha \cos ec \alpha \quad (f) \quad \cos^4 \alpha - \operatorname{sen}^4 \alpha = \cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha$$

$$(b) 1 - 2\operatorname{sen}^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 \quad (g) \quad \frac{\operatorname{tg} \alpha - \cot \alpha}{\operatorname{tg} \alpha + \cot \alpha} = 2\operatorname{sen}^2 \alpha - 1$$

$$(c) \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha \cos ec \alpha = 1 \quad (h) \quad \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} = \cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha$$

$$(d) \frac{1}{1 + \operatorname{sen} \alpha} + \frac{1}{1 - \operatorname{sen} \alpha} = 2\sec^2 \alpha \quad (i) \quad \operatorname{sen} \alpha \sec \alpha \cot \alpha = 1$$

$$(e) \operatorname{tg} \alpha + \frac{\cos \alpha}{1 + \operatorname{sen} \alpha} = \sec \alpha \quad (j) \quad \cos \alpha \alpha + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{sen} \alpha = \sec \alpha$$

Comprobar que:

$$(a) \quad \operatorname{tg} 15^\circ = 2 - \sqrt{3} \quad (d) \quad \operatorname{sen} 9^\circ - \cos 9^\circ = -\sqrt{1 + \operatorname{sen} 18^\circ}$$

$$(b) \quad \cot 15^\circ = 2 + \sqrt{3} \quad (e) \quad \operatorname{sen} 9^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{3 + \sqrt{5}} + \sqrt{5 - \sqrt{5}})$$

$$(c) \quad \operatorname{sen} 9^\circ + \cos 9^\circ = \sqrt{1 + \operatorname{sen} 18^\circ} \quad (f) \quad \cos 9^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{3 + \sqrt{5}} + \sqrt{5 - \sqrt{5}})$$

Calcular:

$$(a) \quad \operatorname{sen} \frac{\pi}{10}$$

$$(c) \quad \operatorname{sen} \frac{\pi}{12}$$

$$(b) \quad \cos \frac{\pi}{10}$$

$$(d) \quad \cos \frac{\pi}{12}$$

(e) Sabiendo que:

$$\frac{\pi}{10} - \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{60}$$

Calcular:

$$\cos \frac{\pi}{60}, \operatorname{sen} \frac{\pi}{60}$$

Si  $\operatorname{sen} \alpha = \frac{15}{17}$ ,  $\operatorname{sen} \beta = \frac{5}{13}$ ,  $\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \pi$  y  $\pi \leq \beta \leq \frac{3\pi}{2}$ , calcular:

$$\sin(\alpha \pm \beta), \cos(\alpha \pm \beta), \tan(\alpha \pm \beta).$$

Si  $\sin \alpha = -\frac{24}{25}$ ,  $\sin \beta = \frac{3}{5}$ ,  $\pi \leq \alpha \leq \frac{3\pi}{2}$  y  $\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \pi$ , calcular:

$$\sin(\alpha \pm \beta), \cos(\alpha \pm \beta), \tan(\alpha \pm \beta).$$

Demostrar las identidades:

$$(a) \quad \left( \cos \frac{\alpha}{2} - \sin \frac{\alpha}{2} \right)^2 = 1 - \sin \alpha \quad (h) \quad \csc 2\alpha + \cot 2\alpha = \cot \alpha$$

$$(b) \quad \tan \frac{\alpha}{2} = \csc \alpha - \cot \alpha \quad (i) \quad \tan 3\alpha = \frac{3\tan \alpha - \tan^3 \alpha}{1 - 3\tan^2 \alpha}$$

$$(c) \quad \frac{\sin 2\alpha}{\sin \alpha} - \frac{\cos 2\alpha}{\cos \alpha} = \sec \alpha \quad (j) \quad \frac{\tan \alpha + \cot \alpha}{\cot \alpha - \tan \alpha} = \sec 2\alpha$$

$$(d) \quad \sin^4 \alpha = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2\alpha + \frac{1}{8} \cos 4\alpha \quad (k) \quad \frac{\sin 3\alpha}{\sin \alpha} - \frac{\cos 3\alpha}{\cos \alpha} = 2$$

$$(e) \quad 1 - \frac{1}{2} \sin 2\alpha = \frac{\sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha} \quad (l) \quad \frac{1 + \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} = \cot \alpha$$

$$(f) \quad \cos 4\alpha = 8\cos^4 \alpha - 8\cos^2 \alpha + 1 \quad (m) \quad \frac{\cot^2 \alpha - 1}{\csc^2 \alpha} = \cos 2\alpha$$

$$(g) \quad \frac{1 - \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} = \tan \alpha \quad (n) \quad \begin{aligned} & \sin \alpha + \sin 3\alpha + \sin 5\alpha + \\ & \sin 7\alpha = 4 \cos \alpha \cos 2\alpha \sin 4\alpha \end{aligned}$$

Desde cada extremo de una base de longitud  $2a$  la elevación angular de un monte es  $\theta$  y desde el punto medio de tal base es  $\phi$ . Demostrar que el monte mide:

$$a \sin \theta \sin \phi \sqrt{\csc(\phi + \theta) \csc(\phi - \theta)}.$$

Una torre dista 40 metros desde la orilla más cercana de un río, cuyo ancho es de 100 metros. Calcular la altura de la torre si desde la cúspide se observa el río bajo un ángulo de  $30^\circ$ .

Demostrar que:

$$\sin^2 1^\circ + \cos^2 20^\circ - \sin 10^\circ \cos 20^\circ = \frac{3}{4}$$

Demostrar que:

$$\frac{1}{\sin 10^\circ} - \frac{\sqrt{3}}{\cos 10^\circ} = 4$$

Demostrar que:

(a)  $\cos 10^\circ + \sin 40^\circ = \sqrt{3} \sin 70^\circ$

(b)  $4 \cos 10^\circ - 2 \sec 18^\circ = 2 \tan 18^\circ = 2 \tan 18^\circ$

(c)  $\cot 15^\circ + \cot 75^\circ + \cot 135^\circ - \cos ec 30^\circ = 1$

(d)  $\cos 6^\circ \cos 66^\circ \cos 42^\circ \cos 78^\circ = \frac{1}{16}$

(e)  $\sin 18^\circ + \cos 18^{-circ} = \sqrt{2} \cos 27^\circ$

(f)  $\sin 33^\circ + \cos 63^\circ = \cos 3^\circ$

(g)  $\tan 20^\circ \tan 40^\circ \tan 80^\circ = \tan 60^\circ$

Demostrar que:

(a)  $\cot(\alpha + 15^\circ) - \tan(\alpha - 15^\circ) = \frac{4 \cos 2\alpha}{2 \sin 2\alpha + 1}$

(b)  $\frac{\cos \alpha - \cos 3\alpha}{\sin 3\alpha - \sin \alpha} = \tan 2\alpha$

(c)  $\frac{\sin(\alpha + \beta) - \sin 4\beta}{\cos(\alpha + \beta) + \cos 4\beta} = \tan \frac{\alpha - 3\beta}{2}$

(d)  $\frac{3 - 4 \cos 2\alpha + \cos 4\alpha}{3 + 4 \cos 2\alpha + \cos 4\alpha} = \tan^4 \alpha$