

Ejercicio 1 Escribe la ecuación implícita de la recta que pasa por los puntos $P(3, -1)$ y $Q(2, -4)$.

Solución:

La pendiente de la recta es:

$$m = \frac{-4 - (-1)}{2 - 3} = \frac{-3}{-1} = 3$$

así que la ecuación en forma punto-pendiente es:

$$y + 1 = 3(x - 3)$$

Pasando todos los términos al primer miembro obtenemos la ecuación implícita:

$$3x - y - 10 = 0$$

Ejercicio 2 Calcula en forma implícita la ecuación de la recta que pasa por el punto $P(2, -3)$ y es perpendicular a $y = \frac{2}{5}x + 1$.

Solución:

Puesto que la recta dada tiene pendiente $\frac{2}{5}$, la perpendicular tiene de pendiente $-\frac{5}{2}$. La ecuación de la perpendicular en la forma punto-pendiente es:

$$y + 3 = -\frac{5}{2}(x - 2)$$

Quitando denominadores y pasando al primer miembro se obtiene la ecuación implícita:

$$5x + 2y - 4 = 0$$

Ejercicio 3 Calcular el ángulo que forma con el eje de abscisas la mediatriz del segmento de extremos $A(-1, 2)$, $B(-5, 7)$.

Solución:

La mediatriz tiene de ecuación:

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = (x+5)^2 + (y-7)^2 \implies 2x+1-4y+4 = 10x+25-14y+49 \implies 8x-10y+69 = 0$$

Esta recta tiene de pendiente $\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$. El ángulo con el eje de abscisas es:

$$\operatorname{artg} \frac{4}{5} = 38^\circ 39' 35''$$

Ejercicio 4 Determina los puntos P y Q que dividen el segmento de extremos $A(-2, 1)$ y $B(5, 4)$, en tres partes iguales.

Solución:

Los puntos son:

$$x_1 = \frac{2 \cdot (-2) + 5}{3} = \frac{1}{3}; \quad y_1 = \frac{2 \cdot 1 + 4}{3} = 2; \quad P_1 \left(\frac{1}{3}, 2 \right)$$
$$x_2 = \frac{-2 + 2 \cdot 5}{3} = \frac{8}{3}; \quad y_2 = \frac{1 + 2 \cdot 4}{3} = 3; \quad P_2 \left(\frac{8}{3}, 3 \right)$$

Ejercicio 5 Escribe la ecuación implícita de la recta que pasa por $P(-1, 2)$ y es paralela a $3x - y + 4 = 0$.

Solución:

La recta dada tiene pendiente $m = 3$. La paralela tendrá también pendiente 3 y, como además pasa por el punto $P(-1, 2)$, su ecuación en la forma punto-pendiente es:

$$y - 2 = 3(x + 1)$$

y en forma implícita:

$$3x - y + 5 = 0$$

Otra forma de resolver este problema es la siguiente: puesto que las rectas deben ser paralelas, los coeficientes A y B de la ecuación implícita deben ser proporcionales. Tomémoslos iguales y calculemos C de modo que la recta contenga al punto dado:

$$P \in 3x - y + C = 0 \implies 3 \cdot (-1) - 2 + C = 0 \implies C = 5$$

Y, por tanto, la recta buscada es $3x - y + 5 = 0$.

Ejercicio 6 Calcula el punto de corte con el eje de abscisas de la paralela a $3x - 2y + 5 = 0$ por el punto $P(-3, -2)$

Solución:

Procediendo como en el problema anterior se encuentra que la paralela es la misma recta $3x - 2y + 5 = 0$. El corte con el eje de abscisas es:

$$\begin{cases} 3x - 2y + 5 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \implies A\left(-\frac{5}{3}, 0\right)$$

Ejercicio 7 Calcula c para que la distancia entre las rectas $4x + 3y - 6 = 0$ y $4x + 3y + c = 0$ sea igual a 3.

Solución:

Tomemos un punto cualquiera de la primera recta, por ejemplo $P(0, 2)$. Si la distancia de este punto a la segunda recta es 3:

$$3 = \left| \frac{4 \cdot 0 + 3 \cdot 2 + c}{\sqrt{9 + 16}} \right| = \frac{|6 + c|}{5} \implies |6 + c| = 15$$

ecuación que tiene dos soluciones:

$$6 + c = 15 \implies c = 9$$

$$6 + c = -15 \implies c = -21$$

En general, puede verse que la distancia entre dos rectas paralelas $Ax + By + C = 0$ y $Ax + By + C' = 0$ es:

$$d = \frac{|C - C'|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Ejercicio 8 Calcular el ortocentro del triángulo de vértices $A(2,0)$, $B(0,1)$ y $C(-3,-2)$.

Solución:




Figura 2: PENDIENTES DE LOS LADOS A LAS ALTURAS

En la figura 2 se han representado las pendientes de los lados del triángulo y de las alturas h_A y h_B . Las ecuaciones de estas alturas son:

$$h_A : y = -1(x - 2)$$

$$h_B : y - 1 = -\frac{5}{2}x$$

resolviendo el sistema formado por estas ecuaciones se obtiene el ortocentro $H\left(-\frac{2}{3}, \frac{8}{3}\right)$

Ejercicio 9 Halla los puntos del eje de abscisas que equidistan de las rectas $4x+3y+6=0$ y $3x+4y-9=0$.

Solución: Los puntos que equidistan de las dos rectas se encuentran en su bisectriz:

$$\frac{4x + 3y + 6 = 0}{\sqrt{16 + 25}} = \pm \frac{3x + 4y - 9 = 0}{\sqrt{16 + 25}} \implies \begin{cases} x - y + 15 = 0 \\ 7x + 7y - 3 = 0 \end{cases}$$

Los puntos buscados deben estar en el eje de abscisas. Son entonces las intersecciones de las bisectrices con $y = 0$:

$$\begin{cases} x - y + 15 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \implies A_1(-15, 0); \quad \begin{cases} 7x + 7y - 3 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \implies A_2\left(\frac{3}{7}, 0\right)$$

Ejercicio 10 En el triángulo ABC conocemos el vértice $A(-2,3)$, la ecuación de la altura que parte de C , $h_C : 3x - 2y - 8 = 0$ y la ecuación del lado BC ; $y = 3x - 13$. Hallar los vértices B y C . **Solución:**

El vértice C es la intersección del lado BC y la altura dada:

$$\begin{cases} 3x - 2y - 8 = 0 \\ y = 3x - 13 \end{cases} \implies C(6, 5)$$

Para calcular el vértice B calculamos en primer lugar la ecuación del lado AB . Puesto que la altura h_C es perpendicular a AB y tiene de pendiente $\frac{3}{2}$, el lado AB tendrá de pendiente $-\frac{2}{3}$, de forma que su ecuación es (ver figura 3):

$$y - 3 = -\frac{2}{3}(x + 2) \implies 2x + 3y - 5 = 0$$




Figura 3: EJERCICIO 10

El vértice B es la intersección de los lados AB y BC :

$$\begin{cases} y = 3x - 13 \\ 2x + 3y - 5 = 0 \end{cases} \implies B(4, -1)$$
