


EXAMEN DE CÁLCULO DIFERENCIAL

1. La figura muestra la gráfica de $f'(x)$. Representa justo debajo la gráfica aproximada de $f(x)$ sabiendo que $f(0)=0$ y rotulando los puntos máximos, mínimos y de inflexión.



2. La normal a la curva $y = \frac{k}{x} + \ln x^2$, para $x \neq 0$, $k \in \mathfrak{R}$, en el punto $x = 2$, tiene por ecuación $3x + 2y = b$, donde $b \in \mathfrak{R}$. Halle el valor exacto de k .



3. Halla: $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x)^{\frac{3}{x^2}}$

4. Sea $y = x \cdot \arcsen x$ con $x \in (-1, 1)$. Demuestra que $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{2-x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}$

5. Determina los valores de los parámetros de a , b y c para que la siguiente función sea continua y derivable en todos los reales y además tenga un extremo relativo en el punto de abscisa 3:

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & \text{si } x < 2 \\ ax^2 + bx + c & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

6. El sólido de la figura está formado por un cilindro y media esfera. El común radio está creciendo a una tasa constante de 2 cm/min y el volumen total a una tasa constante de $204 \pi \text{ cm}^3/\text{min}$. En el momento en que el radio mide 3 cm, el volumen es $36\pi \text{ cm}^3$. Halla la tasa de variación de la altura del cilindro en ese momento.



① Como $f'(-1)=0$
 $f'(-1^-) < 0$
 $f'(-1^+) > 0$ \Rightarrow f'

	-1	
-		+
\swarrow		\searrow
MIN		

f tendrá un mínimo local en $x=-1$

Como: $f'(2)=0$
 $f'(2^-) > 0$
 $f'(2^+) > 0$ \Rightarrow f'



	2	
+		+
\swarrow		\searrow

f no tendrá ni máximo ni mínimo local en $x=2$. Tendrá un punto de inflexión con tangente horizontal.

Como f' tiene un máximo local en $x=0$, su derivada será nula:

$$(f')'(0)=0 \rightarrow f''(0)=0 \text{ por } b$$

que f tendrá un punto de inflexión en $x=0$



② $y = \frac{k}{x} + \ln x^2 \rightarrow y' = -\frac{k}{x^2} + \frac{1}{x^2} \cdot 2x = -\frac{k}{x^2} + \frac{2}{x}$

$x=2 \rightarrow y = \frac{k}{2} + \ln 4$

$\rightarrow y' = -\frac{k}{4} + 1$

$3x + 2y = b \rightarrow y = \frac{b-3x}{2} \Rightarrow m = -\frac{3}{2}$

$-\frac{k}{4} + 1 = -\frac{3}{2}$

$-k + 4 = -6$

$\boxed{k=10}$

La recta tangente será:

$x=2 \rightarrow y = \frac{10}{2} + \ln 4 = 5 + \ln 4$

$\rightarrow y' = -\frac{3}{2}$

$y - (5 + \ln 4) = -\frac{3}{2}(x - 2)$

$2y - 10 - 2\ln 4 = -3x + 6$

$3x + 2y = 16 + 2\ln 4$

$\boxed{b = 16 + 2\ln 4}$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{3} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x)^{3/x^2} &= 1^{\infty} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \ln (\cos 2x)^{3/x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{x^2} \ln \cos 2x} = \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos 2x}{x^2}} = e^{\frac{0}{0}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos 2x} \cdot (-\sin 2x) \cdot 2}{2x}} = \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 2x}{x \cos 2x}} = e^{\frac{0}{0}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \cos 2x \cdot 2}{\cos 2x + x \cdot (-\sin 2x) \cdot 2}} = \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4 \cos 2x}{\cos 2x - 2x \sin 2x}} = e^{\frac{-4}{1-0}} = \boxed{e^{-4}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{4} \quad y &= x \arcsin x \\
 y' &= \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \\
 y'' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{\sqrt{1-x^2} - x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}}{(1-x^2)} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{\sqrt{1-x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2} = \\
 &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1-x^2 + x^2}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-x^2+1}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}} = \frac{2-x^2}{(1-x^2)^{3/2}} \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{5} \quad y = \ln(x^2+1)$$

$x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2+1 \geq 1 \Rightarrow \ln(x^2+1)$ está definido para Todo \mathbb{R} .

dom $f = \mathbb{R}$

$$y' = \frac{1}{x^2+1} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2+1}$$

$$y'' = \frac{2(x^2+1) - 2x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{2x^2+2-4x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{2-2x^2}{(x^2+1)^2}$$

$$y''=0 \Rightarrow \frac{2-2x^2}{(x^2+1)^2} = 0 \quad ; \quad 2-2x^2=0 \quad ; \quad x = \pm 1$$

Concava en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$


Cóncava en $(-1, 1)$

Inflexiones en $x=1, x=-1$.

	-1	1	
y''	-	+	-
y	Concava	Cóncava	Concava
	INF	INF	

$$\textcircled{6} \quad V = \pi R^2 H + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 = \pi R^2 H + \frac{2}{3} \pi R^3$$

$$\frac{dV}{dt} = \pi \cdot 2R \frac{dR}{dt} H + \pi R^2 \frac{dH}{dt} + \frac{2}{3} \pi \cdot 3R^2 \frac{dR}{dt}$$



$$\left. \begin{aligned} \frac{dR}{dt} &= 2 \\ \frac{dV}{dt} &= 204\pi \end{aligned} \right\} \rightarrow 204\pi = 2\pi R H \cdot 2 + \pi R^2 \frac{dH}{dt} + 2\pi R^2 \cdot 2 ;$$

$$\frac{dH}{dt} = \frac{204 - 2RH - 2R^2}{R^2}$$

$$R = 3 \quad \left| \rightarrow 36\pi = \pi \cdot 9 \cdot H + \frac{2}{3} \pi \cdot 27 ; \quad H = \frac{36-18}{9} = 2$$

$$V = 36\pi \quad \left| \rightarrow \frac{dH}{dt} = \frac{204 - 2 \cdot 3 \cdot 2 - 2 \cdot 3^2}{3^2} = \boxed{15\frac{1}{3} \text{ cm/min}}$$