

8



DERIVADAS

ACTIVIDADES

- 1** ■■■ Dada la función $f(x) = (1 - x)^2$, calcula su derivada en el punto de abscisa 1. ¿Qué puedes decir acerca de la recta tangente a la gráfica de f en dicho punto?

Sol: $f'(1) = 0$

La recta tangente es horizontal.

- 2** ■■■ Averigua el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva de la función $f(x) = x^2 - 1$ en el punto de abscisa $x = 2$.

Sol: 4

- 3** ■■■ Calcula la pendiente de la tangente a $f(x) = \sqrt{x}$ en el punto de abscisa $x = 4$. A continuación, escribe la ecuación de dicha recta.

Sol: La pendiente es $\frac{1}{4}$ $y = \frac{x}{4} + 1$

- 4** ■■■ Averigua en qué punto de la gráfica de $f(x) = x^2 - 2x$, la pendiente de la recta tangente es 4.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - 2(x+h) - (x^2 - 2x)}{h} = 4$$

Sol: (3,3)

- 5** ■■■ Calcula las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la gráfica de la función $f(x) = \sqrt{x+2}$ en el punto de abscisa $x = 2$.

$$\text{Recta tangente: } y - 2 = \frac{1}{4}(x - 2) \Rightarrow y = \frac{x}{4} + \frac{3}{2}$$

$$\text{Recta normal: } y - 2 = -4(x - 2) \Rightarrow y = -4x + 10$$

- 6** ■■■ Determina, si existe, la derivada de la siguiente función en el punto de abscisa $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x > 1 \\ 2 - x & \text{si } x \leq 1 \end{cases}$$

Sol: $f'(1) = -1$

- 7** ■■■ Calcula si, en el punto de abscisa 2, existe la derivada de la función:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x - 1 & \text{si } x < 2 \\ 2x - 3 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Sol: No.

- 8** ■■■ Calcula si la función $f(x) = |x^2 - 1|$ es derivable en $x = -1$ y $x = 1$.

Sol: No.

- 9** ■■■ Determina si la función $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ es derivable en $x = -1$.

Sol: No.

- 10** ■■■ Determina si es derivable en $x = 2$ la función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & \text{si } x \leq 2 \\ \ln(x - 1) & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Sol: No.

- 11** ■■■ Calcula el valor del parámetro a para que sea derivable en $x = 1/2$ la función:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + x & \text{si } x < \frac{1}{2} \\ -\frac{a}{x} & \text{si } x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

Sol: No tiene solución

- 12** ■■■ Dada la función $f(x) = 3x^2 - x$, calcula $f'(1)$, $f''(-2)$ y $f'''(2)$.

Sol: $f'(1) = 5$, $f''(-2) = 6$, $f'''(2) = 0$

- 13** ■■■ Halla las derivadas sucesivas de la función $f(x) = x^3 - 2$.

Sol: $f'(x) = 3x^2$, $f''(x) = 6x$, $f'''(x) = 6$, $f^{(4)}(x) = 0$, $f^{(5)}(x) = 0 \dots$
 $f^{(n)}(x) = 0$

- 14** ■■■ Calcula la segunda derivada de la función:

$$f(x) = \begin{cases} (x - 5)^2 + 7 & \text{si } x \geq 5 \\ -(x - 5)^2 + 7 & \text{si } x < 5 \end{cases}$$

$$\text{Sol: } f''(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x > 5 \\ -2 & \text{si } x < 5 \end{cases}$$

- 15** ■■■ Determina la función derivada de la función:

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x < 1 \\ \ln x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{Sol: } f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 1 \\ \frac{1}{x} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- 16** ■■■ Calcula la derivada de cada una de las siguientes funciones.

a) $f(x) = x^3 - \frac{2x}{3} - \frac{1}{x}$

c) $f(x) = \sqrt{x^3} - \frac{2}{\sqrt[3]{x^2}}$

b) $f(x) = \frac{2}{x^2} + \frac{3}{5x^5}$

d) $f(x) = 3 - x\sqrt{x} + \frac{3x^2}{\sqrt{x^3}}$

a) $f'(x) = 3x^2 - \frac{2}{3} + \frac{1}{x^2}$

c) $f'(x) = \frac{3\sqrt{x}}{2} + \frac{4}{3x\sqrt[3]{x^2}}$

b) $f'(x) = \frac{-4}{x^3} - \frac{3}{x^6}$

d) $f'(x) = \frac{-3\sqrt{x}}{2} + \frac{3}{2\sqrt{x}}$

17 ■■■ Calcula la derivada de cada una de las siguientes funciones.

a) $f(x) = (x^2 - 2x) \cdot \left(\sqrt{3x} - \frac{1}{x}\right)$

b) $f(x) = \left(2x - \frac{1}{x^2}\right) \cdot (x - 1)^2$

a) $f'(x) = \frac{5x\sqrt{3x}}{2} - 3\sqrt{3x} - 1$

b) $f'(x) = 6x^2 - 8x + 2 - \frac{2}{x^2} + \frac{2}{x^3}$

18 ■■■ Determina:

a) Para qué valores de x la recta tangente a la gráfica de la función $f(x) = x^3 - 6x^2 - 15x$ es paralela a la recta $y = 3$.

b) Los puntos de la gráfica de $f(x)$ cuya tangente es perpendicular a la recta de ecuación $x - 15y + 3 = 0$.

a) $x = -1, x = 5$

b) $(0, 0)$ y $(4, -92)$

19 ■■■ Dada la función $f(x) = ax^2 + bx + c$, determina los coeficientes a , b y c sabiendo que la gráfica de $f(x)$ pasa por los puntos $(1, 0)$ y $(3, 0)$, y que la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en $x = 1$ tiene pendiente igual a -1 .

Sol: $a = \frac{1}{2}; b = -2; c = \frac{3}{2}$

20 ■■■ Dadas las funciones $f(x) = x^2 - 2x + 3$ y $g(x) = ax^2 + b$, calcula a y b para que las gráficas de $f(x)$ y $g(x)$ sean tangentes en el punto de abscisa $x = 2$.

Sol: $a = \frac{1}{2} \quad b = 1$

21 ■■■ Calcula para qué valores de a las tangentes a la gráfica de la función $f(x) = ax^2 + 2x + 3$ en los puntos de abscisa $x = 1$ y $x = -1$ son perpendiculares entre sí.

Sol: $a = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$

22 ■■■ Calcula la derivada de las siguientes funciones.

a) $f(x) = \frac{3x - 2x^2}{x - 1}$ c) $f(x) = \frac{6x - 2x\sqrt{x}}{9 - x}$

b) $f(x) = \frac{(1 - x^3) \cdot (x - 1)}{x + 1}$ d) $f(x) = \frac{1}{x^2 + x + 1}$

a) $f'(x) = \frac{-2x^2 + 4x + 3}{(x - 1)^2}$

b) $f'(x) = \frac{-3x^4 - 2x^3 + 3x^2 + 2}{(x + 1)^2}$

c) $f'(x) = \frac{54 - 27\sqrt{x} + x\sqrt{x}}{(9 - x)^2}$

d) $f'(x) = \frac{-2x - 1}{(x^2 + x + 1)^2}$

23 ■■■ Averigua las ecuaciones de las rectas, de pendiente

$\frac{1}{2}$, tangentes a la gráfica de la función $f(x) = \frac{x - 3}{x - 1}$.

Sol: $y = \frac{x}{2} - \frac{3}{2}$

$y = \frac{x}{2} + \frac{5}{2}$

24 ■■■ Calcula la derivada de las siguientes funciones.

a) $f(x) = e^{2x}$

d) $f(x) = \ln(x + e^{-x})$

b) $f(x) = (1 + x) \cdot 2^{x+1}$

e) $f(x) = \sqrt{2^{2x+1} + 1}$

c) $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$

f) $f(x) = \frac{3xe^{-x}}{\sqrt{e^x}}$

a) $f'(x) = 2e^{2x}$

b) $f'(x) = 2^{x+1} \cdot [1 + (1+x) \ln 2]$

c) $f'(x) = \frac{-4}{e^{2x} + e^{-2x} - 2}$

d) $f'(x) = \frac{1 - e^{-x}}{x + e^{-x}}$

e) $f'(x) = \frac{2^{2x+1} \cdot \ln 2}{\sqrt{2^{2x+1} + 1}}$

f) $f'(x) = \frac{-9x + 6}{2e^x \sqrt{e^x}}$

25 ■■■ Calcula la derivada de las siguientes funciones.

a) $f(x) = \sin 2x$

f) $f(x) = \sin x^2 - \cos x^2$

b) $f(x) = \sin^2 x$

g) $f(x) = \operatorname{tg}^2 x^2$

c) $f(x) = \sin x^2$

h) $f(x) = \operatorname{arc} \operatorname{sen} \sqrt{1 - x^2}$

d) $f(x) = \cos 2x^2$

i) $f(x) = (\operatorname{arc} \operatorname{tg} x^2)^2$

e) $f(x) = \cos(x^2 - 3x)$

j) $f(x) = \ln \cos e^x$

a) $f'(x) = 2 \cos 2x$

b) $f'(x) = \sin 2x$

c) $f'(x) = 2x \cos x^2$

d) $f'(x) = -4x \sin 2x^2$

e) $f'(x) = -(2x - 3) \sin(x^2 - 3x)$

f) $f'(x) = 2x(\cos x^2 + \sin x^2)$

g) $f'(x) = \frac{4x \operatorname{tg} x^2}{\cos^2 x^2}$

h) $f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$

i) $f'(x) = \frac{4x \operatorname{arc} \operatorname{tg} x^2}{1 + x^4}$

j) $f'(x) = -e^x \operatorname{tg} e^x$

26 ■■■ Deriva las siguientes funciones.

a) $f(x) = (\sin x)^x$

b) $f(x) = \sqrt{x - 2}$

c) $f(x) = (x \cdot e^x)^{\sqrt{x}}$

d) $f(x) = \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\right)^{\sin x}$

a) $f'(x) = (\sin x)^x (\ln \sin x + x \operatorname{cotg} x)$

b) $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x - 2}} \left(\frac{-\ln(x - 2)}{x^2} + \frac{1}{x^2 - 2x}\right)$

c) $f'(x) = (x \cdot e^x)^{\sqrt{x}} \left(\frac{x + \ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{1 + x}{\sqrt{x}}\right)$

d) $f'(x) = 2(\operatorname{tg} x)^{2 \sin x} \left(\ln(\operatorname{tg} x)^{\cos x} + \frac{1}{\cos x}\right)$

27 ■■■ Calcula la función derivada de las siguientes funciones.

a) $f(x) = \frac{1 + \operatorname{sen} x}{1 - \operatorname{sen} x}$ con $-\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{\pi}{2}$

b) $f(x) = \sqrt{\frac{1 + \operatorname{sen} x}{1 - \operatorname{sen} x}}$ con $-\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{\pi}{2}$

c) $f(x) = \ln \sqrt{\frac{1 + \operatorname{sen} x}{1 - \operatorname{sen} x}}$ con $-\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{\pi}{2}$

a) $f'(x) = \frac{2 \cos x}{(1 - \operatorname{sen} x)^2}$

b) $f'(x) = \frac{1}{1 - \operatorname{sen} x}$

c) $f'(x) = \frac{1}{\cos x}$

28 ■■■ Halla el punto de la gráfica de $y = x + \ln x$ en el que la recta tangente es perpendicular a la recta $2x + 6y = 5$.

Sol: $P\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} - \ln 2\right)$

Ejercicios problemas

Reglas de derivación función derivada

29 ■■■ Calcula la función derivada de estas funciones.

a) $f(x) = (x^2 + 3x)^3$ g) $f(x) = 3x\sqrt{x^2 - 1}$

b) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4}$ h) $f(x) = 2^x \ln(x + 1)$

c) $f(x) = (\operatorname{sen} x + 1)^2$ i) $f(x) = \frac{x e^x}{\ln x}$

d) $f(x) = x^2 \cdot \operatorname{sen} x$ j) $f(x) = x^2 2^x e^{2x}$

e) $f(x) = \frac{3x + 1}{x^2 - 2}$ k) $f(x) = \frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{\operatorname{tg} x}$

f) $f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$ l) $f(x) = (\operatorname{tg}^2 x + 1) \cos x$

a) $f'(x) = (6x + 9)(x^2 + 3x)^2$

b) $f'(x) = \frac{-2x}{(x^2 + 4)^2}$

c) $f'(x) = \operatorname{sen} 2x + 2 \cos x$

d) $f'(x) = 2x \operatorname{sen} x + x^2 \cdot \cos x$

e) $f'(x) = \frac{-3x^2 - 2x - 6}{(x^2 - 2)^2}$

f) $f'(x) = e^{-x}(2x - x^2)$

g) $f'(x) = \frac{6x^2 - 3}{\sqrt{x^2 - 1}}$

h) $f'(x) = 2^x \left(\ln 2 \cdot \ln(x + 1) + \frac{1}{x + 1} \right)$

i) $f'(x) = \frac{e^x(\ln x + x \ln x - 1)}{(\ln x)^2}$

j) $f'(x) = 2^x e^{2x}(2x + x^2 \ln 2 + 2x^2)$

k) $f'(x) = -\operatorname{sen} x - \cos x - \frac{\cos x}{\operatorname{sen}^2 x}$

l) $f'(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x}$

30 ■■■ Calcula la función derivada de estas funciones.

a) $f(x) = \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(\cos x))$

b) $f(x) = \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(\operatorname{sen}^2 x))$

c) $f(x) = \operatorname{arc} \operatorname{sen}(\cos x)$

d) $f(x) = \cos(\operatorname{arc} \operatorname{sen} x)$

e) $f(x) = \ln(\operatorname{sen} x^2)$

f) $f(x) = \ln(1 - \sqrt{x})^3$

g) $f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{\sqrt{\operatorname{tg}^2 x + 1}}$

h) $f(x) = \operatorname{cotg}^3(3x^3)$

i) $f(x) = e^{\operatorname{tg} x}$

j) $f(x) = \ln\left(\frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)$

k) $f(x) = 3x + \sqrt{\cos(2x + 1)}$

l) $f(x) = x \cdot \operatorname{arc} \operatorname{sen} \sqrt{1 - x^2}$

m) $f(x) = \ln(\operatorname{sen}(\operatorname{arc} \cos x))$

n) $f(x) = \ln(\operatorname{tg}(\operatorname{arc} \operatorname{sen} x))$

a) $f'(x) = -\cos(\operatorname{sen}(\cos x)) \cdot \cos(\cos x) \cdot \operatorname{sen} x$

b) $f'(x) = \cos(\operatorname{sen}(\operatorname{sen}^2 x)) \cdot \cos(\operatorname{sen}^2 x) \cdot \operatorname{sen} 2x$

c) $f'(x) = -1$

d) $f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{1 - x^2}}$

e) $f'(x) = 2x \operatorname{cotg} x^2$

f) $f'(x) = \frac{-3}{2\sqrt{x}(1 - \sqrt{x})}$

g) $f'(x) = \cos 2x$

h) $f'(x) = \frac{-27x^2 \operatorname{cotg}^2(3x^3)}{\operatorname{sen}^2(3x^3)}$

i) $f'(x) = \frac{e^{\operatorname{tg} x}}{\cos^2 x}$

j) $f'(x) = \operatorname{cotg} x - \frac{1}{x}$

k) $f'(x) = 3 - \frac{\operatorname{sen}(2x + 1)}{\sqrt{\cos(2x + 1)}}$

l) $f'(x) = \operatorname{arc} \operatorname{sen} \sqrt{1 - x^2} - \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$

m) $f'(x) = \frac{-x}{1 - x^2}$

n) $f'(x) = \frac{1}{x(1 - x^2)}$

31 ■■■ De las siguientes funciones halla la derivada del orden que se indica:

a) $f(x) = \cos 2x \Rightarrow f^{(4)}(x)$

b) $f(x) = 2^{1/x} \Rightarrow f'''(x)$

c) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1} \Rightarrow f^{(4)}(x)$

d) $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \Rightarrow f'''(x)$

e) $f(x) = \frac{e^{-3x} + e^{3x}}{e^x} \Rightarrow f'''(x)$

f) $f(x) = \ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \Rightarrow f''(x)$

a) $f^{(4)}(x) = 16 \cos 2x$

b) $f'''(x) = -2^{1/x} \left(\frac{\ln^3 2}{x^6} + \frac{6 \ln^2 2}{x^5} - \frac{6 \ln 2}{x^4} \right)$

c) $f^{(4)}(x) = \frac{24(5x^4 - 10x^2 + 1)}{(x^2 + 1)^5}$

d) $f'''(x) = \frac{-1}{\sqrt{(x^2 - 1)^3}} + \frac{3x^2}{\sqrt{(x^2 - 1)^5}}$

e) $f'''(x) = -64 e^{-4x} + 8 e^{2x}$

f) $f''(x) = \frac{2x}{(1 - x^2)^2}$

32 ■■■ Averigua la expresión de la derivada n -ésima de las siguientes funciones.

a) $f(x) = x \cdot e^{-x}$

b) $f(x) = 2^x$

a) $f^{(n)}(x) = (-1)^n \cdot (x - n) \cdot e^{-x}$

b) $f^{(n)}(x) = (\ln 2)^n \cdot 2^x$

33 ■■■ Calcula la función derivada de las funciones indicadas a continuación.

a) $f(x) = (2x + 1)^{\sqrt{x}}$

d) $f(x) = (\sin x)^{\cos x}$

b) $f(x) = (\ln x)^{x^2 + 1}$

e) $f(x) = \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x$

c) $f(x) = x^{x^2}$

f) $f(x) = \sqrt[x]{x \cdot \cos x}$

a) $f'(x) = (2x + 1)^{\sqrt{x}} \left[\frac{\ln(2x + 1)}{2\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}}{2x + 1} \right]$

b) $f'(x) = (\ln x)^{x^2 + 1} \left[2x \ln(\ln x) + \frac{x^2 + 1}{x \ln x} \right]$

c) $f'(x) = x^{x^2} (2x \ln x + x)$

d) $f'(x) = (\sin x)^{\cos x} \left[\ln(\sin x)^{-\sin x} + \frac{\cos^2 x}{\sin x} \right]$

e) $f'(x) = \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x \left[\ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) - \frac{2x}{x^2 - 1} \right]$

f) $f'(x) = \sqrt[x]{x \cdot \cos x} \left[\frac{1 - \ln(x \cos x)}{x^2} - \frac{\operatorname{tg} x}{x} \right]$

34 ■■■ Halla y' siendo $y = f(x)$.

a) $x + xy - x^2 y^2 = 3$

b) $x^y = y^x$

a) $y' = \frac{2xy^2 - y - 1}{x - 2x^2 y}$

b) $y' = \frac{y \cdot (x \ln y - y)}{x \cdot (y \ln x - x)}$

35 ■■■ Si $f(x) = \sqrt{x}$, $g'(x) = \sin 2x$ y $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$, determina

$(f \circ g)' \left(\frac{\pi}{4} \right)$ y $(g^{-1})' \left(\frac{1}{2} \right)$.

Sol:

$(f \circ g)' \left(\frac{\pi}{4} \right) = f' \left(g \left(\frac{\pi}{4} \right) \right) \cdot g' \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2\sqrt{1/2}} \cdot \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$(g^{-1})' \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{g'(g^{-1}(1/2))} = \frac{1}{g'(\pi/4)} = 1$







36 ■■■ Dadas las funciones $f(x) = x^2 + \pi$ y $g(x) = \sin x + \cos x$, calcula la derivada en $x = 0$ de las funciones $f(g(x))$ y $g(f(x))$.

Sol:

$[f(g(0))] = 2$


$[g(f(0))] = 0$

37 ■■■ Relaciona las gráficas de las dos columnas, de manera que a cada función le asignes su derivada.




Sol: Las correspondencias son: I, b; II, c; III, a.

- 38 ■■■ La gráfica de una función es la que se muestra en la figura. ¿Cuál es la gráfica de su función derivada? ¿En qué puntos no es continua la derivada?



Sol: La función derivada es:

$$f'(x) = \begin{cases} 3 & \text{si } -1 < x < 0 \\ -2 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{si } 1 < x < 4 \end{cases}$$



f' no es continua en $x = 0$ y $x = 1$. Son puntos angulosos de f .

Derivada de una función en un punto

- 39 ■■■ Considera la función definida por $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$ calcula el valor de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa $x = 0$. Determina si hay otros puntos en los cuales la pendiente de la recta tangente sea igual a la obtenida.

Sol: La pendiente es -1 . También es el valor de la pendiente en $x = -2$ y $x = 0$

- 40 ■■■ Aplica la definición de derivada de una función en un punto y calcúlala para las siguientes funciones en los puntos que se indica:

a) $f(x) = -1 + x$ en $x = -1$

b) $f(x) = x^2 - 2x - 3$ en $x = 2$

c) $f(x) = (1 - x)^2 + 1$ en $x = 1$

d) $f(x) = \ln(2x + 1)$ en $x = 0$

e) $f(x) = \frac{-1}{x + 1}$ en $x = 2$

f) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$ en $x = -1$

g) $f(x) = \sqrt{x - 1}$ en $x = 1$

a) 1

b) 2

c) 0

d) 2

e) $\frac{1}{9}$

f) $\frac{\sqrt{2}}{4}$

g) $\frac{1}{2}$

- 41 ■■■ Calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $f(x) = 1/2\sqrt{x}$ en el punto de abscisa $x = 1$.

Sol: $x + 4y - 3 = 0$

- 42 ■■■ Averigua las ecuaciones de la tangente y la normal a la curva $f(x) = \ln(2 - x)$ en $x = 1$.

Sol: Ecuación de la recta tangente: $y = -x + 1$

Ecuación de la normal: $y = x - 1$

- 43 ■■■ Calcula las ecuaciones de las tangentes a la curva $2x^2 + y^2 = 1$ que pasan por el punto $(1, 1)$.

Sol: $y = 1$ $y = 4x - 3$

- 44 ■■■ Halla el punto de la función $f(x) = \sin x^2$ en que la recta tangente tiene pendiente $-2\sqrt{\pi}$ y escribe su ecuación.

Sol: $(\sqrt{\pi}, 0)$ $y = -2\sqrt{\pi}x + 2\pi$

- 45 ■■■ Averigua los puntos de la gráfica de la función $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + x$, en que la recta tangente es paralela a la recta $2x - 3y + 5 = 0$.

Sol: $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{9}\right)$ $\left(\frac{1}{9}, \frac{22}{243}\right)$

- 46 ■■■ ¿En qué punto la recta tangente a la función $f(x) = x \cdot e^x$ es paralela al eje de abscisas? Escribe la ecuación de la recta tangente en este punto.

Sol: El punto de tangencia es: $P(-1, -e^{-1})$.

La recta tangente tiene de ecuación $y = -\frac{1}{e}$

- 47 ■■■ Calcula las abscisas de los puntos de la gráfica de $f(x) = 2x^3 + x^2 + x - 2$ en que la tangente es paralela a la secante que corta la curva en $x = 0$ y $x = 1$.

Sol: $x = \frac{-1 \pm \sqrt{19}}{6}$

- 48 ■■■ Halla el valor de a y b para que la recta tangente a la curva de $f(x) = ax^4 + bx^2 + 1$ en el punto $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ sea paralela al eje de abscisas.

Sol: $a = 16$ y $b = -8$

- 49 ■■■ Averigua para que valor de x la recta tangente a la curva $y = \ln(x^2 + 1)$ es paralela a la recta $y = x$. Escribe la ecuación de esta recta tangente.

Sol: $x = 1$ $y = x + \ln 2 - 1$

- 50 ■■■ Dada la parábola $y = x^2$:

a) Halla la ecuación de su recta tangente que es paralela a la recta $-4x + y + 3 = 0$.

b) Halla las ecuaciones de sus tangentes que pasan por el punto $(2, 0)$.

a) $y = 4x - 4$

b) $y = 0$
 $y = 8x - 16$

- 51 ■■■ Considera la función $f(x) = \frac{3 - 2x}{x}$:

a) Halla los puntos de la gráfica en los cuales la recta tangente es paralela a la recta $3x + 4y + 5 = 0$.

b) Calcula la ecuación de estas rectas tangentes.

a) Los puntos son $P_1(2, -1/2)$ y $P_2(-2, -7/2)$

b) Las ecuaciones de las rectas son:

$y = -\frac{3}{4}x + 1$ $y = -\frac{3}{4}x - 5$

- 52 ■■■ Calcula la pendiente de la recta tangente a la gráfica de $f(x) = \ln(3x - 2)$ en $x = 2$, y en qué punto la tangente es perpendicular a la anterior.

Sol: $\frac{3}{4}$

No existe ningún punto

- 53 ■■■ Dada la función $f(x) = \ln(x^2 + x + 1)$, averigua los puntos en que la recta tangente es perpendicular a la tangente en el punto de abscisa $x = -1$.

Sol: Los puntos buscados son $(0, 0)$ y $(1, \ln 3)$.

- 54 ■■■ Averigua el número de rectas tangentes a la gráfica de la función $f(x) = x^3 - 4x$ que contienen el punto $(0, 1)$.

Sol: Solo hay una tangente a f que pase por $(0, 1)$.

- 55 ■■■ Determina en qué punto $a \in (0, \pi)$, la tangente a la curva $f(x) = \ln(\sin x)$ es perpendicular a la bisectriz del primer cuadrante.

Sol: $a = \frac{3\pi}{4}$

- 56 ■■■ Dada la parábola de ecuación $y = x^2 - 2x + 5$, halla la ecuación de la recta tangente que es paralela a la recta que une los puntos de dicha parábola de abscisas $x = 1$ y $x = 3$.

Sol: $y = 2x + 1$.

- 57 ■■■ Halla los puntos de la parábola $y = -2(x - 2)^2$ cuya recta tangente pasa por el origen de coordenadas. A continuación averigua las ecuaciones de dichas tangentes.

Sol: $y = 0$.

$y = 16x$.

- 58 ■■■ Dada la función $f(x) = x^3$, averigua si la recta tangente a la gráfica de esta función en el punto de abscisa 3 pasa por el punto $(1, 5)$.

A continuación, encuentra todas las rectas del plano que pasan por el punto $(1, 5)$ y son tangentes a la gráfica en algún punto.

Sol: La tangente no pasa por $(1, 5)$.

Hay una única recta tangente: $y = 3x + 2$

- 59 ■■■ Se considera la función $f(x) = x^2 + m$, donde $m > 0$ es una constante.

a) Para cada valor de m halla el valor $a > 0$ tal que la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(a, f(a))$ pase por el origen de coordenadas.

b) Halla el valor de m para que la recta $y = x$ sea tangente a la gráfica de $f(x)$.

a) $a = \sqrt{m}$

b) $m = 1/4$

- 60 ■■■ Halla la derivada de $f(x) = ax + b + \sin x$. Calcula a y b si el punto $(0, 0)$ es un punto de la curva $y = f(x)$ en que la recta tangente es el eje X .

Sol: $f'(x) = a + \cos x$

$b = 0$

$a = -1$

Continuidad y derivabilidad

- 61 ■■■ Indica en qué puntos $f(x) = |2x^2 + x - 1|$ no es derivable.

Sol: En $x = 1/2$ y en $x = -1$

- 62 ■■■ Estudia la derivabilidad de la función $f(x) = \sqrt{|x|}$ en $x = 0$.

Sol: En $x = 0$, hay un punto de retroceso.

- 63 ■■■ Razona si son derivables en el cero cada una de las siguientes funciones de variable real.

a) $f(x) = \begin{cases} x-1 & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \\ x+3 & \text{si } x > 0 \end{cases}$ b) $g(x) = \sqrt{x^3 + x^2}$

a) No es derivable en $x = 0$

b) La derivada no existe en $x = 0$.

- 64 ■■■ Justifica si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. En el caso de que consideres que la afirmación es falsa, pon un ejemplo ilustrativo.

a) Para cualquier función polinómica de segundo grado existe un punto tal que la recta tangente a la función en ese punto es una recta paralela al eje de abscisas.

b) Si $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ verifican $h'(x) = g'(x)$, entonces $h(x) = g(x)$.

a) Verdadera.

b) Falsa.

- 65 ■■■ Estudia la derivabilidad de la función:

$f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - x^2 & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ x & \text{si } x > 1 \end{cases}$

Sol: Es derivable en $\mathbb{R} - \{0, 1\}$

- 66 ■■■ Estudia la derivabilidad de la función:

$f(x) = \begin{cases} E(x-1) & \text{si } x < 2 \\ 4 - 2x & \text{si } 2 \leq x \leq \pi \\ x^2 - 9 & \text{si } x > \pi \end{cases}$

Sol: La función es derivable en \mathbb{R} , excepto en los valores enteros $z \leq 3$, y en el valor π .

- 67 ■■■ Sea f la función definida por

$\begin{cases} e^x - 1 & \text{si } x \geq 0 \\ xe^{-x^2} & \text{si } x < 0 \end{cases}$

Estudia la derivabilidad de f en $x = 0$ y, si es posible, calcula la derivada de f en dicho punto.

Sol: $f'(0) = 1$


- 68 ■■■ Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2 - x|x|$.

a) Esboza la gráfica de f .

b) Estudia la derivabilidad de f en $x = 0$.

c) Halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 2$.

a) $f(x) = \begin{cases} 2 + x^2 & \text{si } x > 0 \\ 2 - x^2 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$



b) $f'(0) = 0$

c) $y = -4x + 6$

39 ■■■ Estudia la derivabilidad de $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1 - |x|} & \text{si } x \neq -1 \text{ y } x \neq 1 \\ 0 & \text{si } x = -1 \text{ o } x = 1 \end{cases}$$

Sol: En $x = 1$ y $x = -1$ derivable.

70 ■■■ Estudia la derivabilidad de $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{3+x^2} - x & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ \frac{1}{x} - \frac{x^2}{4} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Calcula la función derivada.

Sol: en $x = 1$ no es derivable.

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sqrt{3+x^2}} - 1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ -\frac{1}{x^2} - \frac{x}{2} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

71 ■■■ Considera esta función: $f(x) = \begin{cases} \text{sen } x & \text{si } x \leq 0 \\ x - ax^2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

¿Existen valores de a con los cuales f sea derivable en toda la recta real? En cualquier caso, razona la respuesta y, si es afirmativa, encuentra dichos valores.

Sol: La función es derivable para todo valor de a .

72 ■■■ Se sabe que $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - \frac{1}{2}x + c & \text{si } -1 < x < 0 \\ \sqrt{1-x} & \text{si } 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

es derivable en el intervalo $(-1, 1)$.

a) Determina el valor de la constante c .

b) Calcula la función derivada f' .

c) Halla las ecuaciones de las rectas tangentes a la gráfica de f que son paralelas a la recta de ecuación $y = -x$.

a) $c = 1$

b)

$$f'(x) = \begin{cases} 4x - 1/2 & \text{si } -1 < x < 0 \\ \frac{-1}{2\sqrt{1-x}} & \text{si } 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

c)

$$y = -x + \frac{31}{32} \quad y = -x + 5/4$$

73 ■■■ Determina los valores de los parámetros a y b para que la función siguiente sea continua y derivable en $x = 2$.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2x + 3 & \text{si } x < 2 \\ x^3 + bx + 5 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Sol: $a = \frac{7}{2}, b = 4$

74 ■■■ Determina el valor del parámetro a para que la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} x \log x & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ a(1 - e^{-x}) & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

sea derivable en $x = 1$.

Sol: f no es derivable en $x = 1$ para ningún valor de a .

75 ■■■ Averigua el valor de los parámetros a y b para que la siguiente función sea derivable en $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - ax + b & \text{si } x \leq 1 \\ a \ln x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Sol: $a = 1, b = 0$

76 ■■■ Se sabe que la función $f: [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} ax + bx^2 & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ -4 + \sqrt{x-1} & \text{si } 2 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

es derivable en el intervalo $(0, 5)$. Calcula las constante a y b .

Sol: $a = -7/2$ y $b = 1$

77 ■■■ Determina b y c para que la función:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{si } x \leq 2 \\ -x^2 + bx + c & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

a) Sea derivable en todos los puntos de \mathbb{R} .

b) Calcula la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa 1.

a) $b = 16$ y $c = -20$

b) $y = 3x - 2$

78 ■■■ Determina:

a) Los valores de las constantes a y b sabiendo que la gráfica de la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{si } x \leq 0 \\ ax + b & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

admite recta tangente en el punto $(0, 1)$.

b) Los valores de las constantes c y d para las cuales la gráfica de la función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$g(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{si } x \leq 0 \\ cx^2 + d & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

admite recta tangente en el punto $(0, 1)$.

a) $1 = b$

$-1 = a$

b) No es posible.

79 ■■■ Calcula los valores de a y b para que la función:

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 2 & \text{si } x < 0 \\ x^2 + 2a \cos x & \text{si } 0 \leq x < \pi \\ ax^2 + b & \text{si } x \geq \pi \end{cases}$$

sea continua para todo valor de x . Estudia la derivabilidad de $f(x)$ para los valores de a y b obtenidos.

Sol: $a = 1$ $b = -2$

En $x = 0$ la función no es derivable.

En $x = \pi$ la función es derivable.

Ejercicios de aplicación

30 ■■■ Dada la función $f(x) = 1 - x^2$, se pide:

a) Halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $P(a, f(a))$, donde $0 < a < 1$.

b) Halla los puntos A y B en los que la recta hallada en el apartado a) corta a los ejes vertical y horizontal respectivamente.

c) Determina el valor de $a \in (0, 1)$ para el cual la distancia entre el punto A y el punto $P(a, f(a))$ es el doble de la distancia entre el punto B y el punto $P(a, f(a))$.

a) $y = a^2 - 2ax + 1$

b) $A(0, a^2 + 1), B\left(\frac{a^2 + 1}{2a}, 0\right)$.

c) $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$

31 Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función continua definida por

$$f(x) = \begin{cases} 2-x & \text{si } x < a \\ x^2 - 5x + 7 & \text{si } x \geq a \end{cases}$$

donde a es un número real.

a) Determina a .


b) Halla la función derivada de f .

a) $a = 3$

$$b) f'(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 2 \\ 1 & \text{si } 2 < x < 3 \\ 2x - 5 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

La función no es derivable en $x = 2$, ni en $x = 3$.

32 La curva $f(x)$ de la figura tiene por dominio el conjunto de los números reales.



a) Determina los puntos en los que la función vale 0 y los valores de x para los cuales la función es positiva.

b) Calcula en qué puntos se anula la derivada y en qué puntos $f'(x) < 0$.

c) Halla la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa $x = 2$.

d) Determina la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa $x = -1$, sabiendo que $f'(x)$ comienza por $-x^2$.

e) Determina a sabiendo que $f(x) = a(x+1)(x-2)^2$.

a) Vale 0 para $x = -1$ y para $x = 2$ y es positiva para $x < -1$.


b) Se anula para $x = 0$ y para $x = 2$ y $f'(x) < 0$ para $x < 0$ y $x > 2$.

c) La recta tangente para $x = 2$ es $y = 0$.

d) $y = -3x - 3$

e) $a = -1/3$

33 En la figura se puede ver parte de la gráfica de una función f que está definida en el intervalo $(-3, 3)$ y que es simétrica respecto al origen de coordenadas.




a) Razona cuál debe ser el valor de $f(0)$.

b) Completa la gráfica de f .

c) Halla $f'(x)$ para los $x \in (-3, 3)$ en los que dicha derivada exista.

a) No existe $f(0)$.



$$c) f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } -3 < x < -1 \\ 0 & \text{si } -1 < x < 0 \\ 0 & \text{si } 0 < x < 1 \\ \frac{1}{2} & \text{si } 1 < x < 3 \end{cases}$$

34 Un globo de radio r , que contiene hidrógeno, aumenta su volumen un 5%. Calcula su variación de área.

Sol: 3,33 %.

35 Dadas las curvas $y = x^2 - 1$ y $x^2 + xy - 1 = 0$, averigua sus puntos de intersección y calcula las pendientes de las rectas tangentes en cada uno de ellos. A continuación, halla para cada punto el ángulo que forman dichas tangentes.

Sol: Puntos de intersección: $(1, 0)$ y $(-1, 0)$.

En $(1, 0)$ la pendiente de la tangente es $m = 2$, y en $(-1, 0)$, $m = -2$.

En el punto $(-1, 0)$ el ángulo es cero.

En el punto $(1, 0)$ el ángulo es $53,13^\circ$

36 Halla la ecuación de las tangentes a la curva de ecuación $2x^2 - y^2 + xy = 0$ en los puntos $x = 1$.

Sol: $y = -x$

$y = 2x$

37 Calcula los valores de a para los que las tangentes a las curvas $y = e^x$ e $y = e^{-2x}$ en los puntos (a, e^a) y (a, e^{-2a}) sean perpendiculares.

Sol: $a = \ln 2$

38 A partir del enunciado anterior, estudia si puede existir algún valor de a para que las tangentes en los puntos indicados sean paralelas.

Sol: No es posible.

39 Un incendio se extiende en forma circular de manera uniforme. El radio del círculo quemado crece a la velocidad constante de 1,8 m/min.

a) Determina el área quemada en función del tiempo t transcurrido desde el inicio del incendio.

b) Calcula la velocidad de crecimiento del área del círculo quemado en el instante en que el radio llegue a 45 m.

a) $A = 3,24\pi t^2$ m², donde t está expresado en minutos.

b) $v(25) \cong 508,94$ m²/min

Actividad de tipo test

Escoge y razona la respuesta correcta en cada caso:

- 90 Considera la función $f(x) = x^3 - 5x^2 + 5x + 3$ y la recta $r: 2x + y = 6$.

Determina, si es posible, un punto de la gráfica de f en el que la recta tangente sea r .

- a) (1, 4)
- b) (4, 1)
- c) (4, 0)

Sol: La respuesta correcta es la **a**).

- 91 Considera la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} 3ax + b & \text{si } x \leq 0 \\ e^{x(ax+b)} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Determina a y b sabiendo que f es derivable.

- a) $a = b = 1$
- b) $a = \frac{1}{3}$ y $b = -1$
- c) $a = \frac{1}{3}$ y $b = 1$

Sol: La respuesta correcta es la **c**).

- 92 Calcula el ángulo que forman las rectas tangentes a las curvas de ecuaciones $xy = 1$ y $x^2 - y^2 = 1$, en los puntos de intersección de dichas curvas.

- a) Puntos de intersección: (a, b) y $(-a, -b)$. Son perpendiculares las tangentes en ambos puntos.
- b) Puntos de intersección: (a, b) y $(-a, -b)$. En (a, b) las tangentes son perpendiculares y en $(-a, -b)$ forman un ángulo de 45° .
- c) Puntos de intersección: (a, b) y $(-a, -b)$. En (a, b) las tangentes son perpendiculares y en $(-a, -b)$ forman un ángulo de 0° .

Sol: La respuesta correcta es la **a**).

1. Calcula la derivada de estas funciones.

a) $f(x) = \ln \sqrt{\sin x}$

b) $f(x) = \sin(\arccos x(\sin x))$

c) $f(x) = \ln \sin^2 \sqrt{x}$

a) $f'(x) = 1/2 \cotg x$

b) $f'(x) = -\frac{x \sin x (\sin x + x \cos x)}{\sqrt{1 - x^2} \sin^2 x}$

c) $f'(x) = \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x} \cdot \sin \sqrt{x}}$

d) $f(x) = \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$

e) $f(x) = \frac{x e^{-x}}{\sqrt{x}}$

d) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}$

e) $f'(x) = \frac{1-2x}{2e^x \sqrt{x}}$

2. Halla el valor de a y de b para que la siguiente función sea derivable en $x = 0$.

$$f(x) = \begin{cases} a(1 + e^x) & \text{si } x < 0 \\ b + \ln(x + 1) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Sol: $a = 1, b = 2$.

3. Sea la función:

$$f(x) = \begin{cases} a \sin x + b \cos x & \text{si } x < \frac{\pi}{2} \\ \sin^2 x - a \cos x & \text{si } x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Halla los valores de a y de b para que sea derivable en \mathbb{R} .

Sol: $a = 1 \quad b = -1$

4. Halla la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a la gráfica de la función $f(x) = \sqrt[3]{(x+1)^2}$ en el punto de abscisa $x = -1$.

Sol: No existe ni recta tangente, ni recta normal.

5. Dada la función $f(x) = \frac{x+1}{e^x}$, determina la ecuación de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto en el que se anula la segunda derivada.

Sol: $x + ey - 3 = 0$.

6. Halla el valor de a y de b para que la función $f(x) = ax^3 - 2x^2 + b$ su recta tangente en el punto de abscisa $x = 1$ sea $y = 5x + 1$.

Sol: $a = 3 \quad b = 5$.

7. Una persona camina a una velocidad constante de 3 m/s y se aleja horizontalmente y en línea recta desde la base de una farola cuyo foco se encuentra a 10 m de altura. Sabiendo que la altura de la persona es 1,70 m, calcula:

a) La longitud de la sombra cuando la persona se encuentra a 5 m de la farola.

b) La velocidad de crecimiento de la sombra a los t segundos de empezar a andar.

a) 1,024 m

b) 0,614 m/s