

1. Sabiendo que el determinante de la matriz $A = \begin{pmatrix} x & y & z \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ es 2, calcula los

Siguientes determinantes indicando las propiedades que utilices.

$$\text{a) } \det(3A) \cdot \text{b) } \det(A^{-1}) \cdot \text{c) } \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 3x & 2y & z \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} \cdot \text{d) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x+2 & y+4 & z+6 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

Sol: a) 54 b) 1/2 c) -12 d) -2

2. Sea M una matriz cuadrada de orden 3 tal que su determinante es $\det(M) = 2$. Calcula:
- [0'5 puntos] El rango de M^3 . **R(A)=3**
 - [0'75 puntos] El determinante de $2M^t$ (M^t es la matriz traspuesta de M). **Sol 16**
 - [0'75 puntos] El determinante de $(M^{-1})^2$. **Sol 1/4**
 - [0'5 puntos] El determinante de N, donde N es la matriz resultante de intercambiar la primera y segunda filas de M. **Sol. -2**
3. Sean A y B dos matrices cuadradas de orden 3 cuyos determinantes son $|A| = 1/2$ y $|B| = -2$. Halla:
- [0'5 puntos] $|A^3|$. **Sol: 1/8**
 - [0'5 puntos] $|A^{-1}|$. **Sol: 2**
 - [0'5 puntos] $|-2A|$. **Sol: -4**
 - [0'5 puntos] $|AB^t|$, siendo B^t la matriz traspuesta de B. **Sol: -1**
 - [0'5 puntos] El rango de B. **Sol: rg(B)=3**

4. De la matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ se sabe que $\det(A) = 4$. Se pide:

(a) [1'25 puntos] Halla $\det(-3A^t)$ y $\det \begin{pmatrix} 2b & 2a \\ -3d & -3c \end{pmatrix}$ propiedades que utilizas.

(A^t es la matriz traspuesta de A). **Sol: 36, 24**

(b) [0'75 puntos] Calcula $\det(A^{-1} \cdot A^t)$. **Sol: 1**

(c) [0'5 puntos] Si B es una matriz cuadrada tal que $B^3 = I$, siendo I la matriz identidad, halla $\det(B)$. **Sol: 1**

5. Sean F_1, F_2, F_3 , las filas primera, segunda y tercera, respectivamente, de una matriz B de orden 3, cuyo determinante vale -2. Calcula, indicando las propiedades que utilices:
- [0'5 puntos] El determinante de B^{-1} . **Sol: -1/2**
 - [0'5 puntos] El determinante de $(B^t)^4$ (B^t es la matriz traspuesta de B). **Sol: 16**
 - [0'5 puntos] El determinante de $2B$. **Sol: -16**
 - [1 punto] El determinante de una matriz cuadrada cuyas filas primera, segunda y tercera son, respectivamente, $5F_1 - F_3, 3F_3, F_2$. **Sol: 30**

6. Sabiendo que $|A| = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 2$, calcula, indicando las propiedades que utilices, los siguientes determinantes:

(a) [1 punto] $|-3A|$ y $|A^{-1}|$

(b) [0'75 puntos] $\begin{vmatrix} c & b & a \\ f & e & d \\ 2i & 2h & 2g \end{vmatrix}$ (c) [0'75 puntos] $\begin{vmatrix} a & b & a-c \\ d & e & d-f \\ g & h & g-i \end{vmatrix}$ (e) $\begin{vmatrix} 3a & 3b & 15c \\ d & e & 5f \\ g & h & 5i \end{vmatrix}$ (f) $\begin{vmatrix} a+2b & c & b \\ d+2e & f & e \\ g+2h & i & h \end{vmatrix}$

(c) **Sol: a) 1/2, b) -4, c) -2 e) 30 f) -2**

7. Sean C_1 , C_2 y C_3 las columnas primera, segunda y tercera, respectivamente, de una matriz cuadrada A de orden 3 cuyo determinante vale 5. Calcular, indicando las propiedades utilizadas:

- El determinante de A^3 .
- El determinante de A^{-1} .
- El determinante de $2A$.
- El determinante de una matriz cuadrada cuyas columnas primera, segunda y tercera son, respectivamente, $3C_1 - C_3$, $2C_3$ y C_2 .

Sol: $|A^3| = 125$; $|A^{-1}| = \frac{1}{5}$; $|2A| = 40$; $|3C_1 - C_3, 2C_3, C_2| = -30$

Rango

8.

Considera $A = \begin{pmatrix} k & 0 & k \\ k+1 & k & 0 \\ 0 & k+1 & k+1 \end{pmatrix}$.

(a) [1'5 puntos] Discute el rango de A según los valores de "k".

(b) [1 punto] Para "k = 1", calcula el determinante de $2(A^t A^{-1})^{2017}$, siendo A^t la traspuesta de A .

Sol: a) $k=0, k=-1; k=-2$ $R(A) = 2$ resto valores $R(A) = 3$ b) 8 (Aplicamos propiedades determinantes)

9. Considera las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & m \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & m & 0 \\ 3 & 2 & m \end{pmatrix}$$

- Encuentra el valor, o los valores, de m para los que A y B tienen el mismo rango. Sol: $m=0$ $R(A)=R(B)=2$
- Determina, si existen, los valores de m para los que A y B tienen el mismo determinante.

Sol $m = -1$ y $m = -4$, el $\det(A) = \det(B)$.

10.

Sea $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & m+1 & 0 \\ 1 & 1 & m-1 \end{pmatrix}$

- [0'75 puntos] Determina los valores de m para que los vectores fila de M sean linealmente independientes. Sol: si $m \neq 0$ y $m \neq -1$, $|M| \neq 0$ y los vectores fila son linealmente independientes.
- [1 punto] Estudia el rango de M según los valores de m .

Sol: Si $m \neq 0$ y $m \neq -1$, $|M| \neq 0$ y rango $(M) = 3$. Para los otros valores rango $= 2$

(c) [0'75 puntos] Para $m = 1$, calcula la inversa de M . Sol: $M^{-1} = (1/2) \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

11. Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & -1 \\ 1 & \alpha & -1 \\ -1 & -1 & \alpha \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

a) Calcula el rango de A dependiendo de los valores α . Sol: $\alpha = 1$ $R(A) = 1$ $\alpha = -2$ $R(A) = 2$ resto

$R(A) = 3$. b) Para $\alpha = 2$, resuelve la ecuación matricial $A \cdot X = B$ Sol: $X = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

12. Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & k \\ k & 1 & 3 \\ 1 & 7 & k \end{pmatrix}$$

(a) [1'25 puntos] Estudia el rango de A en función de los valores del parámetro k .

a) Sol: Si $k \neq +\sqrt{3}$ y $k \neq -\sqrt{3}$ rango $(A) = 3$ Si $k = +\sqrt{3}$ y $k = -\sqrt{3}$, rango $(A) = 2$

$$A^{-1} = \frac{1}{-12} \begin{pmatrix} -21 & 0 & 9 \\ 3 & 0 & -3 \\ -1 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

(b) [1'25 puntos] Para $k = 0$, halla la matriz inversa de A .

13. Considera las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

a) Calcula el rango de $A \cdot B^t + \lambda I$ según los valores de λ (B^t es la matriz traspuesta de B , I es la matriz identidad de orden 3).

b) Calcula la matriz X que verifica: $C \cdot X - X = 2I$

Sol:

Si $\lambda \neq 0 \Rightarrow \text{Rango}(A) = 3$. $\begin{pmatrix} -4 & -2 & -2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$
 Si $\lambda = 0 \Rightarrow \text{Rango}(A) = 1$.

a) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & m \\ m-1 & 0 & 2 \\ 0 & 1-m & 0 \end{pmatrix}$

14. Considera la matriz:

- a) Halla el valor, o valores, de m para los que la matriz A tiene rango 2. **Sol: $m=0$ y $m=1$**
 b) Para $m=1$ determina A^{2016} **Sol: O_3**

15. Considera las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

a) [1 punto] Halla, si es posible, A^{-1} y B^{-1} . **Sol: no existe B^{-1} . $A^{-1} = (1/2) \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$**

b) [0'25 puntos] Halla el **determinante** de $AB^{2013}A^t$, siendo A^t la matriz traspuesta de A . **Sol: 0**

c) [1'25 puntos] Calcula la matriz X que satisface $AX - B = AB$. **Sol: $\begin{pmatrix} -2 & -2 & 5/2 \\ 3 & -1 & 1/2 \\ 0 & 0 & -3/2 \end{pmatrix}$**

16. Considera las matrices $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$

a) [0'75 puntos] Halla A^{-1} . **Sol: $(-1/2) \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$**

b) [1'25 puntos] Calcula la matriz X que satisface $AX = B^t C$ **Sol: $\begin{pmatrix} 0 & 8 \\ -1 & 14 \\ 1 & -6 \end{pmatrix}$**

c) [0'5 puntos] Halla el **determinante** de $A^{2013} B^t B (A^{-1})^{2013}$. **Sol: =0**

17. Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -4 & -5 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

(a) [0'5 puntos] Demuestra que se verifica la igualdad $A^3 = -I$, siendo I la matriz identidad de orden 3.

(b) [1'25 puntos] Justifica que A es invertible y halla su inversa.

(c) [0'75 puntos] Calcula razonadamente A^{100} .

Sol: b) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & -4 & -4 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ **c) $A^{100} = -A$**

18. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

(a) [1'75 puntos] Comprueba que $A^2 = 2 \cdot I$ y calcula A^{-1} . **Sol: $A^{-1} = (1/2) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$**

(b) [1 punto] Calcula A^{2013} y su inversa. **Sol: $A^{-1} = \frac{1}{2^{1007}} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ $A = (2^{1006}) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$**

19. Consideramos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -4 & -5 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

a) Siendo I la matriz identidad 3×3 y O la matriz nula 3×3 , probar que $A^3 + I = O$.

b) Calcular A^{10} .

Solución: $A^{10} = -A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & -4 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix}$

20. Considera las matrices $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, y $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$.

a) [1'5 puntos] Determina la matriz X para la que $A^t X B^{-1} = C$, (A^t la matriz traspuesta de A).

b) [1 punto] Calcula el determinante de $B^{-1}(C^t C)B$, (C^t la matriz traspuesta de C).

Sol: a) $(1/3) \cdot \begin{pmatrix} -21 & 10 & 0 \\ -9 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ **b)0**

21. Sea la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & k & 1 \end{pmatrix}$$

(a) [1 punto] ¿Para qué valores del parámetro k no existe la matriz inversa de la matriz A ? Justifica la respuesta.

(b) [1'5 puntos] Para $k = 0$, resuelve la ecuación matricial $(X + I) \cdot A = A^t$, donde I de nota la matriz identidad y A^t la matriz traspuesta de A .

Sol: a) La matriz **A no tiene inversa si $k = 1/2$.** **B)** $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$

22. Sean A, B, C y X matrices que verifican $AXB = C$

a) Si las matrices son cuadradas de orden 3, y se sabe que el determinante de A es 3 , el de B es -1 y el de C es 6 , calcula el determinante de las matrices X y $2X$ **Sol:-16**

b) Calcula la matriz X Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ **Sol:** $\begin{pmatrix} -14 & 8 \\ 8 & -5 \end{pmatrix}$

23. Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} \lambda+1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

(a) [1,25 puntos] Determina los valores de λ para los que la matriz $A^2 + 3A$ no tiene inversa.

Sol: $\lambda = -1$ y $\lambda = -4$.

(b) [1,25 puntos] Para $\lambda = 0$, halla la matriz X que verifica la ecuación $AX + A = 2I$, siendo I la matriz identidad de orden 2.

Sol: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$.

24. Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ -\alpha & 3 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

(a) [1'25 puntos] Calcula los valores de α para los que la matriz inversa de A es $(1/12) \cdot A$. **Sol: $\alpha = -3$.**

(b) [1'25 puntos] Para $\alpha = -3$, determina la matriz X que verifica la ecuación $A^t \cdot X = B$, siendo A^t la matriz traspuesta de A . **Sol:**

$(1/12) \cdot \begin{pmatrix} -6 & 3 & 3 \\ -2 & 15 & 7 \end{pmatrix}$

Considera A, siendo a un número real.

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & -a \end{pmatrix}$$

(a) [1 punto] Calcula el valor de a para que $A^2 - A = \begin{pmatrix} 12 & -1 \\ 0 & 20 \end{pmatrix}$ **Sol a=4**

(b) [1 punto] Calcula, en función de a, los determinantes $2A$ y A^t , siendo A^t la traspuesta de A.

Sol:- $4a^2, -a^2$

(c) [0'5 puntos] ¿Existe algún valor de a para el que la matriz A sea simétrica? Razona la respuesta.

Sol: No es posible

25. Sean las matrices A =

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \text{ y } C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

(a) [1 punto] ¿Tiene A inversa? En caso afirmativo, calcúlala

(b) [1'5 puntos] Determina la matriz X que cumple que $A \cdot X + C \cdot B^t = B \cdot B^t$, siendo B^t la matriz traspuesta de B.

Sol:a) $\frac{1}{|A|} \text{Adj}(A^t) = \frac{1}{-7} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/7 & 1/7 \\ 3/7 & -2/7 \end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix} -4/7 & 6/7 \\ 1/7 & -26/7 \end{pmatrix}$

26. Sea I la matriz identidad de orden 3 y sea A =

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & b \end{pmatrix}$$

(a) [1'25 puntos] Determina el valor de b para el que $A^2 - 2A + I = O$.

(b) [1'25 puntos] Para b = 2 halla la matriz X que cumple que $A \cdot X - 2A^t = O$, donde A^t denota la matriz traspuesta de A.

Sol: a) la única solución que verifica las cuatro ecuaciones es b = 2. b)

$$\begin{pmatrix} -2 & -6 & 8 \\ -2 & -2 & 6 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

27. Sea la matriz A =

$$\begin{pmatrix} 5 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

(a) [1'25 puntos] Comprueba que se verifica $2A - A^2 = I$.

(b) [1'25 puntos] Calcula A^{-1} . (Sugerencia: Puedes utilizar la igualdad del apartado (a)). Sol:

$$\begin{pmatrix} -3 & 4 & -2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 4 & -4 & 3 \end{pmatrix}$$

Sistemas de Ecuaciones

28. Sean A y B las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -9 & 5 \end{pmatrix}$$

a) [1'25 puntos] Calcula las matrices X e Y para las que $2X - Y = A$ y $X - 3Y = B$.

b) [1'25 puntos] Halla la matriz Z que verifica $B^2 + ZA + B^t = 3I$ (I denota la matriz identidad y B^t la matriz traspuesta de B).

Sol: a) X $= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ **Y** $= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ **b) Sol Z** $= \begin{pmatrix} -76 & -39 \\ 101 & 48 \end{pmatrix}$

29. Considera las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a) [1'25 puntos] Calcula X e Y tales que $X - Y = A^t$ y $2X - Y = B$ (A^t es la matriz traspuesta)

b) [1'25 puntos] Calcula Z tal que $AZ = BZ + A$.

Sol: a) X $= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ **Y** $= \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$ **b) Z** $= \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

30. a) [1 puntos] Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

a) [1 punto] Calcula, si existe, la matriz inversa de A

b) [1'5 puntos] Calcula las matrices X e Y que satisfacen las ecuaciones matriciales $XA = A + 2B$ y $AY = A + 2B$

Sol: a) $\begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ **b) X** $= \begin{pmatrix} -9 & 32 \\ 20 & -67 \end{pmatrix}$ **Y** $= \begin{pmatrix} -59 & 40 \\ 26 & -17 \end{pmatrix}$