**<u>Ejercicio</u> 1.** **Calificación máxima:** 3 puntos.

Estudiar la continuidad y derivabilidad de la función:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2+3x+1}{x} & si \quad x \geq -1 \\ \dfrac{2x}{x-1} & si \quad x < -1 \end{cases}$$

**<u>Ejercicio</u> 2.** **Calificación máxima:** 3 puntos.

a) Calcular $\lim_{x\to+\infty}\left(2x-\sqrt{4x^2+2x}\right)$

b) Se considera la función $f(x) = e^{\frac{1}{x-2}}$. Se pide calcular $\lim_{x\to 2} f(x)$.

**<u>Ejercicio</u> 3.** **Calificación máxima:** 2 puntos.

Dada la función $f(x)$:

$$f(x) = \frac{1}{xe^x + e^x}$$

a) (0.5 puntos) Calcular el dominio de $f(x)$.

b) (1.5 puntos) Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en $x = 0$.

**<u>Ejercicio</u> 4.** **Calificación máxima:** 2 puntos.

Obtener el dominio de la función $f(x) = ln\,(x^3 + 2x^2 - x - 2)$

**Ejercicio 1.** Estudiar la continuidad y derivabilidad de la función:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2+3x+1}{x} & si \quad x \geq -1 \\ \dfrac{2x}{x-1} & si \quad x < -1 \end{cases}$$

**SOLUCIÓN**

- (0.75p) Continuidad de $f(x)$ en $x = -1$:

$$\lim_{x\to -1^+} \frac{x^2+3x+1}{x} = \frac{1-3+1}{-1} = 1$$

$$\lim_{x\to -1^-} \frac{2x}{x-1} = \frac{-2}{-2} = 1$$

$$f(-1) = \frac{1-3+1}{-1} = 1$$

Como $\lim_{x\to -1^+} f(x) = \lim_{x\to -1^-} f(x) = f(-1) = 1$, $f(x)$ es continua en $x = -1$.

- (1.25p) Derivabilidad de $f(x)$ en $x = -1$:

$$f'(x) = \begin{cases} \dfrac{(2x+3)\cdot x - (x^2+3x+1)\cdot 1}{x^2} & si \quad x \geq -1 \\ \dfrac{2\cdot(x-1) - 2x\cdot 1}{(x-1)^2} & si \quad x < -1 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \dfrac{2x^2+3x-x^2-3x-1}{x^2} & si \quad x \geq -1 \\ \dfrac{2x-2-2x}{(x-1)^2} & si \quad x < -1 \end{cases} \rightarrow \quad f'(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-1}{x^2} & si \quad x \geq -1 \\ \dfrac{-2}{(x-1)^2} & si \quad x < -1 \end{cases}$$

$$\lim_{x\to -1^+} \frac{x^2-1}{x^2} = \frac{1-1}{1} = 0$$

$$\lim_{x\to -1^-} \frac{-2}{(x-1)^2} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$$

Como $\lim_{x\to -1^+} f'(x) = 0 \neq \lim_{x\to -1^-} f'(x) = -1/2$, $f(x)$ no es derivable en $x = -1$.

Para $x = 0$ se anula el denominador de la función definida para $x \geq -1$, luego habrá que estudiar la continuidad y derivabilidad de la función en dicho punto.

- (0.75p) Continuidad de $f(x)$ en $x = 0$:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x^2+3x+1}{x} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{x^2+3x+1}{x} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$f(0) = \frac{0^2 + 3 \cdot 0 + 1}{0} = \frac{1}{0} = \nexists$$

Como $\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty \neq \lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty$, $f(x)$ presenta una discontinuidad inevitable de salto infinito en $x = 0$.

- (0.25p) Derivabilidad de $f(x)$ en $x = 0$:

  Por ser $f(x)$ discontinua en $x = 0$, $f(x)$ no es derivable en $x = 0$.

**Ejercicio 2.**

a) Calcular $\lim_{x \to +\infty} \left(2x - \sqrt{4x^2 + 2x}\right)$

b) Se considera la función $f(x) = e^{\frac{1}{x-2}}$. Se pide calcular $\lim_{x \to 2} f(x)$.

**SOLUCIÓN**

a) $$\lim_{x \to +\infty} \left(2x - \sqrt{4x^2 + 2x}\right) = \infty - \infty = \lim_{x \to +\infty} \frac{\left(2x - \sqrt{4x^2 + 2x}\right)\left(2x + \sqrt{4x^2 + 2x}\right)}{2x + \sqrt{4x^2 + 2x}} =$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \frac{(2x)^2 - \left(\sqrt{4x^2 + 2x}\right)^2}{2x + \sqrt{4x^2 + 2x}} = \lim_{x \to +\infty} \frac{4x^2 - (4x^2 + 2x)}{2x + \sqrt{4x^2 + 2x}} = \lim_{x \to +\infty} \frac{4x^2 - 4x^2 - 2x}{2x + \sqrt{4x^2 + 2x}} =$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \frac{-2x}{2x + \sqrt{4x^2 + 2x}} = \frac{\infty}{\infty} = \lim_{x \to +\infty} \frac{-2x}{2x + \sqrt{4x^2}} = \lim_{x \to +\infty} \frac{-2x}{2x + 2x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{-2x}{4x} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$$

b) Como el límite del exponente es del tipo $k/0$, se calculan los límites laterales en $x = 2$:

$$\lim_{x \to 2^+} e^{\frac{1}{x-2}} = e^{\frac{1}{0^+}} = e^{+\infty} = +\infty$$

$$\lim_{x \to 2^-} e^{\frac{1}{x-2}} = e^{\frac{1}{0^-}} = e^{-\infty} = \frac{1}{e^{+\infty}} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

$$\lim_{x \to 2} e^{\frac{1}{x-2}} = \nexists$$

**Ejercicio 3.** Dada la función $f(x)$:

$$f(x) = \frac{1}{xe^x + e^x}$$

a) Calcular el dominio de $f(x)$.

b) Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en $x = 0$.

**SOLUCIÓN**

a) Buscamos los valores que anulan el denominador:

$$xe^x + e^x = 0 \quad \rightarrow \quad e^x(x+1) = 0 \quad \rightarrow \quad \begin{cases} e^x = 0 & \rightarrow \quad \nexists \\ x + 1 = 0 & \rightarrow \quad x = -1 \end{cases}$$

$$Dom\, f(x) = x \in \mathbb{R} - \{-1\}$$

b) La ecuación punto-pendiente de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ es: $y - y_0 = m(x - x_0)$

$$x_0 = 0 \quad \rightarrow \quad y_0 = f(0) = \frac{1}{0 \cdot e^0 + e^0} = \frac{1}{1} = 1$$

$$f'(x) = \frac{(1)' \cdot (xe^x + e^x) - 1 \cdot (xe^x + e^x)'}{(e^x + xe^x)^2} = \frac{-(e^x + xe^x + e^x)}{(e^x + xe^x)^2} \quad \rightarrow$$

$$m = f'(0) = \frac{-(1+0+1)}{(1+0)^2} = \frac{-2}{1} = -2$$

Sustituyendo:

$$y - 1 = -2(x - 0) \quad \rightarrow \quad y - 1 = -2x \quad \rightarrow \quad y = -2x + 1$$

**Ejercicio 4.** Obtener el dominio de la función $f(x) = ln\,(x^3 + 2x^2 - x - 2)$

**SOLUCIÓN**

El dominio de la función será la solución de la inecuación $x^3 + 2x^2 - x - 2 > 0$ **(I)**.

Buscamos las raíces de la ecuación $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$. Aplicando Ruffini:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | −1 | −2 |
| 1 | | 1 | 3 | 2 |
| | 1 | 3 | 2 | 0 |

La primera de las raíces buscadas es $x_1 = 1$.

Obtenemos las otras dos raíces resolviendo la ecuación de segundo grado $x^2 + 3x + 2 = 0$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 1} = \frac{-3 \pm \sqrt{9-8}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{-3 \pm 1}{2}$$

$$x_3 = \frac{-3+1}{2} = \frac{-2}{2} = -1 \quad \rightarrow \quad x_2 = -1$$

$$x_4 = \frac{-3-1}{2} = \frac{-4}{2} = -2 \quad \rightarrow \quad x_3 = -2$$

Situamos las raíces obtenidas sobre la recta real y comprobamos si un valor de cada intervalo verifica o no la inecuación **(I)**:

$x = -3 \quad \rightarrow \quad -27 + 18 + 3 - 2 \geq 0 \quad \rightarrow \quad -8 \geq 0$ NO

$x = -1{,}5 \quad \rightarrow \quad 3{,}375 + 4{,}5 + 1{,}5 - 2 \geq 0 \quad \rightarrow \quad 0{,}625 \geq 0$ SÍ

$x = 0 \quad \rightarrow \quad -2 \geq 0$ NO

$x = 2 \quad \rightarrow \quad 8 + 8 - 2 - 2 \geq 0 \quad \rightarrow \quad 12 \geq 0$ SÍ




$Dom\ f(x) = (-2, -1) \cup (1, +\infty)$