

**PROBLEMAS RESUELTOS  
SELECTIVIDAD ANDALUCÍA  
2020**

**MATEMÁTICAS II**

**TEMA 2: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES**

- Junio, Ejercicio 7
- Reserva 1, Ejercicio 7
- Septiembre, Ejercicio 3
- Septiembre, Ejercicio 7

Considera  $A = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 1 & 0 & 1 & | \\ 4 & 1 & 4 & \end{pmatrix}$ ;  $B = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 3a \end{pmatrix}$  y  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

a) (1'25 puntos) Discute el sistema dado por  $AX = B$ , según los valores de  $a$ .

b) (1'25 puntos) Para  $a = 0$ , resuelve el sistema dado por  $AX = B$ . Calcula, si es posible, una solución en la que  $y + z = 4$ .

**MATEMÁTICAS II. 2020. JUNIO. EJERCICIO 7.**

### R E S O L U C I Ó N

$$a) AX = B \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = a \\ x + z = 2a \\ 4x + y + 4z = 3a \end{cases}$$

Calculamos el determinante de la matriz de los coeficientes.

$$\begin{vmatrix} 1 & & & \\ 1 & 0 & 1 & \\ 4 & 1 & 4 & \end{vmatrix} = 4 + 1 - 4 - 1 = 0 \Rightarrow \text{Rango}(A) = 2, \text{ ya que } \begin{vmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

Calculamos el determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & a & \\ 1 & 0 & 2a \\ 4 & 1 & 3a \end{vmatrix} = 8a + a - 3a - 2a = 4a = 0 \Rightarrow a = 0$$

	R(A)	R(M)	
$a = 0$	2	2	S. Compatible indeterminado
$a \neq 0$	2	3	S. Incompatible

b) Para  $a = 0$ , el sistema es:  $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} = -t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}$

Veamos si es posible que una solución sea:  $y + z = 4 \Rightarrow x + 4 = 0 \Rightarrow x = -4$

Luego, la solución es  $x = -4$ ;  $y = 0$ ;  $z = 4$

(2'5 puntos) Siendo  $\lambda$  un número real, considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales con

$$\left. \begin{array}{l} +\lambda y = 2 \\ \text{dos incógnitas } \begin{array}{l} 2x + 4y = 1 \\ \lambda x + y = 2\lambda \end{array} \end{array} \right\}$$

Discútelo según los valores de  $\lambda$  y resuélvelo cuando sea posible.

**MATEMÁTICAS II. 2020. RESERVA 1. EJERCICIO 7**

### R E S O L U C I Ó N

Calculamos el determinante de la matriz ampliada del sistema y lo igualamos a cero

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ \lambda & 1 & 2\lambda \end{vmatrix} = 8\lambda + \lambda^2 + 4 - 8\lambda - 4\lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow -3\lambda^2 + 3 = 0 \Rightarrow \lambda = -1; \lambda = 1$$

A continuación, calculamos los rangos de la matriz de los coeficientes y de la matriz ampliada del sistema y hacemos la discusión:

Para  $\lambda = 1 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow R(A) = 2$ , ya que  $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$

Para  $\lambda = 1 \Rightarrow M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow R(M) = 2$ , ya que  $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$

Para  $\lambda = -1 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow R(A) = 2$ , ya que  $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$

Para  $\lambda = -1 \Rightarrow M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow R(M) = 2$ , ya que  $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$

	R(A)	R(M)	
$\lambda = 1$	2	2	S. Compatible determinado
$\lambda = -1$	2	2	S. Compatible determinado
$\lambda \neq 1, -1$	2	3	S. Incompatible

Lo resolvemos para  $\lambda = 1$ . El sistema es  $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 4y = 1 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{7}{2}; y = -\frac{3}{2}$

Lo resolvemos para  $\lambda = -1$ . El sistema es  $\begin{cases} x - y = 2 \\ 2x + 4y = 1 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{3}{2}; y = -\frac{1}{2}$

Considera el sistema de ecuaciones dado por  $AX = B$  siendo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ m & 4 & -2 \\ 0 & m+2 & 3 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 2m \\ 1 \end{pmatrix}$$

a) (1'5 puntos) Discute el sistema según los valores de  $m$ .

b) (1 punto) Para  $m = -2$ , ¿existe alguna solución con  $z = 0$ ? En caso afirmativo, calcúlala. En caso negativo, justifica la respuesta.

**MATEMÁTICAS II. 2020. SEPTIEMBRE. EJERCICIO 3.**

### R E S O L U C I Ó N

a) Calculamos el determinante de la matriz de los coeficientes y lo igualamos a cero

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ m & 4 & -2 \\ 0 & m & 2 \end{vmatrix} = -12 + m^2 + 2m - 6m + 2m + 4 = m^2 - 2m - 8 \Rightarrow m = 4 \quad y \quad m = -2$$

Calculamos el rango de la matriz de los coeficientes y de la ampliada y hacemos la discusión del sistema.

$$\text{Para } m = 4 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 4 & 4 & -2 \\ 0 & 6 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow R(A) = 2, \text{ ya que } \begin{vmatrix} 1 & - \\ 4 & - \end{vmatrix} = 12 \neq 0$$

$$\text{Para } m = 4 \Rightarrow M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 6 & -3 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow R(M) = 3, \text{ ya que } \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 4 & 4 & 8 \\ 0 & 6 & 1 \end{vmatrix} = 12 \neq 0$$

$$\text{Para } m = -2 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow R(A) = 2, \text{ ya que } \begin{vmatrix} 4 & - \\ 0 & - \end{vmatrix} = -12 \neq 0$$

$$\text{Para } m = -2 \Rightarrow M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ -2 & 4 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow R(M) = 2, \text{ ya que } \begin{vmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & -4 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

	R(A)	R(M)	
$m = 4$	2	3	Sistema incompatible
$m = -2$	2	2	Sistema compatible indeterminado
$m \neq 4 \text{ y } -2$	3	3	Sistema compatible determinado

b) Para  $m = -2$ , el sistema que tenemos que resolver es:

$$\left. \begin{array}{l} x - 2y + z = \\ -2x + 4y - 2z = -4 \\ -3z = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x - 2y + z = \\ -z = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 2 + 2t - z = \frac{7}{3} + 2t \\ y = t \\ z = -\frac{1}{3} \end{array} \right.$$

No existe ninguna solución con  $z = 0$ .

Considera  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$  y  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

a) (1'25 puntos) Halla los valores de  $\lambda$  tales que  $|A - \lambda I| = 0$ , donde  $I$  es la matriz identidad de orden 3.

b) (1'25 puntos) Para  $\lambda = 1$ , resuelve el sistema dado por  $(A - \lambda I)X = 0$ . ¿Existe alguna solución tal que  $z = 1$ ? En caso afirmativo, calcúlala. En caso negativo, justifica la respuesta.

**MATEMÁTICAS II. 2020. SEPTIEMBRE. EJERCICIO 7**

### R E S O L U C I Ó N

a) Calculamos la matriz  $A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 & 3 \\ 0 & -\lambda & 2 \\ 0 & 1 & 1-\lambda \end{pmatrix}$

Calculamos su determinante:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 3 \\ 0 & -\lambda & 2 \\ 0 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda + 2\lambda^2 + \lambda - 2 = 0 \Rightarrow \lambda = 1; \lambda = -1; \lambda = 2$$

b) Resolvemos el sistema para  $\lambda = 1$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2y + 3z = 0 \\ -y + 2z = 0 \\ = 0 \end{cases} \Rightarrow y = 0; z = 0$$

Luego, no hay ninguna solución  $z = 1$