

**PRUEBA DE ACCESO (LOGSE)****UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO****JUNIO – 2008**

(RESUELTOS por Antonio Menguiano)

**MATEMÁTICAS II****Tiempo máximo: 1 hora y 30 minutos**

Nota: En cada bloque debe contestarse o la cuestión o el problema. Cada uno de los ejercicios será valorado entre 0 y 2 puntos.

**BLOQUE A**

Cuestión A.- Sean las matrices  $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$  y  $M = \begin{pmatrix} m & n \\ p & q \end{pmatrix}$ . Encontrar las condiciones que deben cumplir  $m$ ,  $n$ ,  $p$  y  $q$  para que se verifique que el producto de ambas matrices efectuado en las dos formas posibles sea el mismo.

$$\left. \begin{array}{l} A \cdot M = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} m & n \\ p & q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3m+2p & 3n+2q \\ m+3p & n+3q \end{pmatrix} \\ M \cdot A = \begin{pmatrix} m & n \\ p & q \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3m+n & 2m+3n \\ 3p+q & 2p+3q \end{pmatrix} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3m+2p & 3n+2q \\ m+3p & n+3q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3m+n & 2m+3n \\ 3p+q & 2p+3q \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 3m+2p=3m+n \rightarrow n=2p \\ m+3p=3p+3q \rightarrow m=3q \\ 3n+2q=2m+3n \rightarrow m=q \\ n+q=2p+3q \rightarrow n=2p+2q \end{array} \right. \Rightarrow \underline{\underline{m=q=0 \ ; \ n=2p}}$$

\*\*\*\*\*

Problema A.- Estudiar la compatibilidad del sistema  $S \equiv \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ 3x + 2y + 3z = 1 \\ 4x + y + \alpha z = \alpha \end{cases}$ . Resolver es sistema en el caso de indeterminación.

-----

Las matrices de coeficientes y ampliada son las siguientes:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & \alpha \end{pmatrix} \text{ y } M' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & \alpha & \alpha \end{pmatrix}$$

El rango de M en función de  $\alpha$  es el siguiente:

$$|M| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & \alpha \end{vmatrix} = 2\alpha + 6 - 12 - 16 - 3 + 3\alpha = 5\alpha - 25 = 5(\alpha - 5) = 0 \Rightarrow \underline{\alpha = 5}$$

Para  $\alpha \neq 5 \Rightarrow \text{Rango } M = \text{Rango } M' = 3 = n^\circ \text{ incógnitas} \Rightarrow \text{Compatible Determinado}$

Veamos el rango de M' para  $\alpha = 5$ :

$$\text{Rango } M' \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \{C_1, C_2, C_4\} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 10 + 12 - 4 - 32 - 1 + 15 = 37 - 37 = 0 \\ \{C_1, C_3, C_4\} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 5 \end{vmatrix} = 15 + 60 + 8 - 48 - 5 - 30 = 83 - 83 = 0 \\ \{C_2, C_3, C_4\} \Rightarrow \begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 5 & 5 \end{vmatrix} = -15 + 40 + 2 - 12 + 5 - 20 = 47 - 47 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$\Rightarrow \text{Para } \alpha = 5 \Rightarrow \text{Rango } M' = 2$

Para  $\alpha = 5 \Rightarrow \text{Rango } M = \text{Rango } M' = 2 < n^\circ \text{ incógnitas} \Rightarrow \text{Compatible Indeterminado}$

Resolvemos en el caso de compatible indeterminado.

$$\text{El sistema resulta } S \equiv \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ 3x + 2y + 3z = 1 \\ 4x + y + 5z = 5 \end{cases}$$

Eliminando, por ejemplo, la tercera ecuación y parametrizando una de las incógnitas, por ejemplo  $z = \lambda$ , resulta:

$$\left. \begin{array}{l} x - y = 4 - 2\lambda \\ 3x + 2y = 1 - 3\lambda \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2x - 2y = 8 - 4\lambda \\ 3x + 2y = 1 - 3\lambda \end{array} \right\} \Rightarrow 5x = 9 - 7\lambda \quad ; ; \quad \underline{x = \frac{9}{5} - \frac{7}{5}\lambda}$$
$$\left. \begin{array}{l} -3x + 3y = -12 + 6\lambda \\ 3x + 2y = 1 - 3\lambda \end{array} \right\} \Rightarrow 5y = -11 + 3\lambda \quad ; ; \quad \underline{y = -\frac{11}{5} + \frac{3}{5}\lambda}$$

$$\text{Solución: } \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{9}{5} - \frac{7}{5}\lambda \\ y = -\frac{11}{5} + \frac{3}{5}\lambda, \quad \forall \lambda \in R \\ z = \lambda \end{array} \right.$$

---

---

\*\*\*\*\*

www.yoquieroaprobar.es

## BLOQUE B

Cuestión B.- Sean los puntos del espacio A(3, 4, 1+2a) y B(-3, 0, 1-2a). Se sabe que dichos puntos son simétricos respecto a un plano  $\pi$ . Hallar de forma razonada la ecuación de dicho plano.

-----

El punto medio de A y B es:  $M \equiv \left( \frac{3-3}{2}, \frac{4+0}{2}, \frac{1+2a+1-2a}{2} \right) \Rightarrow \underline{M(0, 2, 1)}$ .

El vector  $\vec{v}$  que determinan los puntos B y A es:

$$\vec{v} = \vec{BA} = A - B = (3, 4, 1+2a) - (-3, 0, 1-2a) = (6, 4, 4a).$$

El plano  $\pi$  tiene como vector normal a cualquier vector linealmente dependiente del vector  $\vec{v}$ .

El vector normal puede ser  $\vec{n} = (3, 2, 2a)$ .

El plano  $\pi$  es de la forma  $\pi \equiv 3x + 2y + 2az + D = 0$ .

Para determinar el valor de D tenemos en cuenta que contiene a M(0, 2, 1):

$$\left. \begin{array}{l} \pi \equiv 3x + 2y + 2az + D = 0 \\ M(0, 2, 1) \end{array} \right\} \Rightarrow 3 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 2a \cdot 1 + D = 0 \quad ; ; \quad \underline{D = -2a - 4}.$$

El plano pedido, en función de a, es el siguiente:

$$\underline{\underline{\pi \equiv 3x + 2y + 2az - (2a + 4) = 0}}$$

\*\*\*\*\*

Problema B.- Calcular la ecuación cartesiana de la recta r que contiene a los puntos A y B de coordenadas A(1, 1, a) y B(1, 0, 3). ¿Existe algún valor de a tal que el punto P(1, 3, 3) pertenezca a la recta? Razonar la respuesta.

-----

La recta r tiene por vector director al vector  $\vec{v}$  que determinan los puntos A y B.

$$\vec{v} = \overrightarrow{AB} = B - A = (1, 0, 3) - (1, 1, a) = (0, -1, 3 - a).$$

La expresión de r por unas ecuaciones continuas, considerando al vector  $\vec{v}$  y al punto B es la siguiente:  $r \equiv \frac{x-1}{0} = \frac{y}{-1} = \frac{z-3}{3-a}$ .

De la expresión anterior de r se pueden obtener unas ecuaciones paramétricas o implícitas, como se nos pide:  $r \equiv \begin{cases} x-1=0 \\ (3-a)y = -z+3 \end{cases}$ .

$$\underline{\underline{r \equiv \begin{cases} x-1=0 \\ (3-a)y + z - 3 = 0 \end{cases}}}$$

Para que el punto P(1, 3, 3) pertenezca a la recta r tiene que satisfacer su ecuación, por lo tanto:

$$r \equiv \begin{cases} x-1=0 \\ (3-a)y + z - 3 = 0 \end{cases} \Bigg|_{P(1, 2, 3)} \Rightarrow (3-a) \cdot 2 + 3 - 3 = 0 \ ; \ ; \ 6 - 2a = 0 \Rightarrow \underline{\underline{a=3}}$$

Para a = 3 el punto P(1, 3, 3) pertenece a la recta r.

\*\*\*\*\*

## BLOQUE C

Cuestión C.- Sea  $f$  una función derivable en todos los puntos y tal que  $f(0) = 1$ ,  $f'(0) = 2$  y  $f''(0) = 3$ . Sea  $g(x)$  la función definida por  $g(x) = 3[f(x)]^2 + 8f(x)$ . Calcular razonadamente  $g''(0)$ .

-----

$$g'(x) = 6f(x) \cdot f'(x) + 8f'(x) = \underline{2f'(x) \cdot [3f(x) + 4]} = g'(x)$$

$$g''(x) = 2 \cdot \{f''(x) \cdot [3f(x) + 4] + f'(x) \cdot 3f'(x)\} = \underline{2 \cdot \{f''(x) \cdot [3f(x) + 4] + 3[f'(x)]^2\}} = g''(x)$$

$$g''(x) = 2 \cdot \{f''(x) \cdot [3f(x) + 4] + 3[f'(x)]^2\} \Rightarrow \{f(0) = 1 ; ; f'(0) = 2 ; ; f''(0) = 3\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow g''(0) = 2 \cdot \{f''(0) \cdot [3f(0) + 4] + 3[f'(0)]^2\} = 2 \cdot [3 \cdot (3 \cdot 1 + 4) + 3 \cdot 2^2] = 2 \cdot (3 \cdot 7 + 12) =$$

$$= 2 \cdot (21 + 12) = 2 \cdot 33 = \underline{\underline{66}} = g''(0)$$

\*\*\*\*\*

www.yoquieroaprobar.es

Problema C.- Sea la función  $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + 5$ . Encontrar los valores de A y B para que dicha función tenga un máximo en  $x = 1$  y un mínimo en  $x = 2$ .

-----

La condición necesaria para que una función tenga un máximo o un mínimo relativo en un punto es que se anule su derivada en ese punto.

$$f'(x) = 3x^2 + 2Ax + B \Rightarrow \begin{cases} f'(1) = 0 \Rightarrow 3 \cdot 1^2 + 2A \cdot 1 + B = 0 \quad ; ; \quad \underline{2A + B = -3} & (1) \\ f'(2) = 0 \Rightarrow 3 \cdot 2^2 + 2A \cdot 2 + B = 0 \quad ; ; \quad \underline{4A + B = -12} & (2) \end{cases}$$

Resolviendo el sistema formado por (1) y (2) obtenemos los valores de A y B:

$$\left. \begin{array}{l} 2A + B = -3 \\ 4A + B = -12 \end{array} \right\} \begin{array}{l} -2A - B = 3 \\ 4A + B = -12 \end{array} \Rightarrow 2A = -9 \quad ; ; \quad \underline{\underline{A = -\frac{9}{2}}}$$

$$2A + B = -3 \quad ; ; \quad B = -3 - 2A = -3 - 2 \cdot \left(-\frac{9}{2}\right) = -3 + 9 = \underline{\underline{6 = B}}$$

Vamos a justificar las condiciones de máximo y mínimo:

$$f'(x) = 3x^2 + 2Ax + B = 3x^2 + 2 \cdot \left(-\frac{9}{2}\right)x + 6 = 3x^2 - 9x + 6 = \underline{3(x^2 - 3x + 2)} = f'(x)$$

$$f''(x) = 3(2x - 3) \Rightarrow \begin{cases} f''(1) = 3(2 \cdot 1 - 3) = -3 < 0 \Rightarrow \underline{\underline{Máximo para x=1, c.q.j.}} \\ f''(2) = 3(2 \cdot 2 - 3) = 3 > 0 \Rightarrow \underline{\underline{Mínimo para x=2, c.q.j.}} \end{cases}$$

\*\*\*\*\*

## BLOQUE D

Cuestión D.- Calcular la siguiente integral:  $I = \int \frac{1}{x^2 - (a+1)x + a} \cdot dx$ , donde se supone que  $a$  no es cero.

-----

$$x^2 - (a+1)x + a = 0 \quad ; ; \quad x = \frac{a+1 \pm \sqrt{(a+1)^2 - 4a}}{2} = \frac{a+1 \pm \sqrt{a^2 + 2a + 1 - 4a}}{2} = \frac{a+1 \pm \sqrt{a^2 - 2a + 1}}{2} =$$

$$= \frac{a+1 \pm \sqrt{(a-1)^2}}{2} = \frac{a+1 \pm (a-1)}{2} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{a+1+a-1}{2} = \frac{2a}{2} = a = x_1 \\ x_2 = \frac{a+1-a+1}{2} = \frac{2}{2} = 1 = x_2 \end{cases}$$

$$I = \int \frac{1}{x^2 - (a+1)x + a} \cdot dx = \int \frac{1}{(x-a)(x-1)} \cdot dx = \int \left( \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-1} \right) \cdot dx = I \quad (*)$$

$$\frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-1} = \frac{Ax - A + Bx - aB}{(x-a)(x-1)} = \frac{(A+B)x + (-A - aB)}{(x-a)(x-1)} = \frac{1}{(x-a)(x-1)} \Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ -A-aB=1 \end{cases}$$

$$B - aB = 1 \quad ; ; \quad B(1-a) = 1 \quad ; ; \quad B = \frac{1}{1-a} \quad ; ; \quad A = \frac{-1}{1-a}$$

Sustituyendo en (\*) los valores obtenidos de A y B:

$$I = \int \left( \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-1} \right) \cdot dx = \int \left( \frac{1}{x-a} + \frac{-1}{x-1} \right) \cdot dx = \frac{1}{a-1} \int \frac{1}{x-a} \cdot dx - \frac{1}{a-1} \int \frac{1}{x-1} \cdot dx =$$

$$= \frac{1}{a-1} \cdot L|x-a| - \frac{1}{a-1} \cdot L|x-1| + C = \frac{1}{a-1} \cdot L \left| \frac{x-a}{x-1} \right| + C = I$$

\*\*\*\*\*



Problema D.- Sea R el rectángulo del plano con vértices  $V_1(0, 0)$ ,  $V_2(3, 0)$ ,  $V_3(3, 9)$  y  $V_4(0, 9)$ . Demostrar que para todo valor de A la curva de ecuación  $y = Ax^2 + (3-3A)x$  pasa por los vértices  $V_1$  y  $V_3$  y divide al rectángulo en dos regiones. Calcular el área de dichas regiones y encontrar el valor de A para que la región situada por encima de la curva tenga un área doble que la situada por debajo de la curva.

-----


Los valores de la curva para las abscisas de los puntos  $V_1(0, 0)$  y  $V_3(3, 9)$  son los siguientes:

$y(0) = A \cdot 0^2 + (3-3A) \cdot 0 = 0 \Rightarrow$  La curva pasa por el punto  $V_1(0, 0)$ , para cualquier valor de A.

$y(3) = A \cdot 3^2 + (3-3A) \cdot 3 = 9A + 9 - 9A = 9 \Rightarrow$  La curva pasa por el punto  $V_3(3, 9)$ , para cualquier valor de A.

En efecto, la curva pasa por los vértices  $V_1$  y  $V_3$  para todo valor real de A, c. q. d.

La representación gráfica de la situación es, aproximadamente, la expresada en la figura.



El punto P de corte de la curva con el eje X se obtiene para  $y = 0$ :

$$y = [Ax + (3-3A)]x = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \rightarrow V_1 \\ x_2 = \frac{3A-3}{A} \rightarrow P \end{cases}$$

De la observación de la figura se deduce que  $S_1 = 27 - S_2$ . (\*)

$$S_2 = \int_{\frac{3A-3}{A}}^3 y \cdot dx = \int_{\frac{3A-3}{A}}^3 [Ax^2 + (3-3A)x] \cdot dx =$$

$$= \left[ \frac{Ax^3}{3} + \frac{(3-3A)x^2}{2} \right]_{\frac{3A-3}{A}}^3 =$$

$$= \left[ \frac{A \cdot 3^3}{3} + \frac{(3-3A) \cdot 3^2}{2} \right] - \left[ \frac{A \cdot \left(\frac{3A-3}{A}\right)^3}{3} + \frac{(3-3A) \cdot \left(\frac{3A-3}{A}\right)^2}{2} \right] =$$

$$\begin{aligned}
&= 9A + \frac{27 - 27A}{2} - \left[ \frac{\frac{3^3(A-1)^3}{A^2}}{3} + \frac{(3-3A) \cdot \frac{3^2(A-1)^2}{A^2}}{2} \right] = \frac{18A + 27 - 27A}{2} - \frac{9(A-1)^3}{A^2} + \frac{27(A-1)^3}{2A^2} = \\
&= \frac{27 - 9A}{2} - \frac{18(A-1)^3 - 27(A-1)^3}{2A^2} = \frac{27 - 9A}{2} + \frac{9(A-1)^3}{2A^2} = \frac{9}{2} \cdot \left[ 3 - A + \frac{(A-1)^3}{A^2} \right] = \\
&= \frac{9}{2} \cdot \left[ 3 - A + \frac{A^3 - 3A^2 + 3A - 1}{A^2} \right] = \frac{9}{2} \cdot \frac{3A^2 - A^3 + A^3 - 3A^2 + 3A - 1}{A^2} = \frac{9}{2} \cdot \frac{3A - 1}{A^2} = S_2
\end{aligned}$$

Por condición del enunciado del ejercicio es  $S_1 = 2S_2$  y teniendo en cuenta la expresión (\*):

$$27 - \frac{9}{2} \cdot \frac{3A - 1}{A^2} = 2 \cdot \frac{9}{2} \cdot \frac{3A - 1}{A^2} \quad ; ; \quad 27 = 3 \cdot \frac{9}{2} \cdot \frac{3A - 1}{A^2} \quad ; ; \quad 2A^2 = 3A - 1 \quad ; ; \quad \underline{2A^2 - 3A + 1 = 0}$$

$$A = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 8}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{1}}{4} = \frac{3 \pm 1}{4} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = 1 \\ A_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Para  $A = 1$  resulta la curva  $y = x^2$  y para  $A = \frac{1}{2}$  resulta la curva  $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x$ , cuyo punto de corte (además del origen) resulta para  $x = -3$  que carece de sentido lógico.

Solución:  $A = 1$ .

\*\*\*\*\*

## BLOQUE E

Cuestión E.- Un comerciante compró plumas estilográficas, lapiceros y gomas de borrar. Cada pluma estilográfica le costó 10 euros. Cada lapicero 1 euro. Y por cada 8 gomas de borrar pagó 1 euro. Si en total pagó 100 euros y compró 100 artículos, ¿cuántos artículos de cada clase compró?

-----

Sean  $x$ ,  $y$ ,  $z$  el número de plumas, lapiceros y gomas, respectivamente.

De la atenta lectura del enunciado se deduce el siguiente sistema de ecuaciones lineales: 
$$\left. \begin{array}{l} 10x + y + \frac{z}{8} = 100 \\ x + y + z = 100 \end{array} \right\}, \text{ equivalente a } \left. \begin{array}{l} 80x + 8y + z = 800 \\ x + y + z = 100 \end{array} \right\}.$$

El sistema tiene dos ecuaciones y tres incógnitas. Para resolverlo parametrizamos una de las incógnitas, por ejemplo,  $z = \lambda$ , con lo que resulta:

$$\left. \begin{array}{l} 80x + 8y = 800 - \lambda \\ x + y = 100 - \lambda \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} 80x + 8y = 800 - \lambda \\ -8x - 8y = -800 + 8\lambda \end{array} \right\} \Rightarrow 72x = 7\lambda \quad ;; \quad x = \frac{7}{72} \lambda$$

$$x + y = 100 - \lambda \quad ;; \quad y = 100 - \lambda - x = 100 - \lambda - \frac{7}{72} \lambda = 100 - \frac{79}{72} \lambda = y$$

La solución del sistema es 
$$\left\{ \begin{array}{l} x = \frac{7}{72} \lambda \\ y = 100 - \frac{79}{72} \lambda, \quad \forall \lambda \in R. \\ z = \lambda \end{array} \right.$$

Teniendo en cuenta que  $x$ ,  $y$ ,  $z$  tienen que ser números naturales, la solución del sistema tiene sentido para el valor de  $\lambda = 72$ , siendo la solución:  $x = 7$ ,  $y = 21$  y  $z = 72$ .

Compró 7 plumas estilográficas, 21 lapiceros y 72 gomas de borrar.

\*\*\*\*\*

Problema E.- Se sabe que la suma de 45 números naturales consecutivos es igual a 1485. Encontrar de forma razonada dichos números.

-----

Sea  $x$  el primero de los números. El último tiene que ser  $(x + 44)$ .

El valor medio de los números es  $\frac{x + x + 44}{2} = \frac{2x + 44}{2} = x + 22$ .

Según el enunciado tiene que cumplirse que  $45 \cdot (x + 22) = 1485$ .

$$x + 22 = \frac{1485}{45} = \frac{297 \cdot 2}{9} = 33 \cdot 2 = 66 \quad ; ; \quad x = 66 - 22 = \underline{44 = x}$$

El primer número es el 44 y el último el 88.

Los números son 44, 45, 46, 47, ....., 88.

\*\*\*\*\*

www.yoquieroaprobar.es