

**PRUEBA DE ACCESO (EBAU)**

**UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO**

**SEPTIEMBRE – 2020**

(RESUELTOS por Antonio Menguiano)

MATEMÁTICAS CC SS

Tiempo máximo: 1 hora y 30 minutos

Ese examen tiene ocho ejercicios. Debes contestar a cuatro de ellos. En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas se corregirán en orden hasta llegar el número necesario. No se podrán usar calculadoras que tengan pantalla gráfica, posibilidad de transmitir datos, programables, que resuelvan ecuaciones, que hagan operaciones con matrices, que calculen determinantes, que resuelvan integrales o que almacenen datos alfanuméricos.

1º) Determinar el valor máximo de la función objetivo  $F(x, y) = 5x + 4y$  restringida

por las siguientes condiciones: 
$$\begin{cases} 2y - x \geq 0 \\ y \leq 2x - 3 \\ x + y \leq 9 \\ x \leq 4 \end{cases}$$

-----

La región factible es la que aparece sombreada en la figura adjunta.

①  $\Rightarrow 2y - x \geq 0 \Rightarrow y \geq \frac{x}{2} \Rightarrow P(1, 0) \rightarrow No.$

x	0	4
y	0	2

②  $\Rightarrow y \leq 2x - 3 \Rightarrow O(0, 0) \rightarrow No.$

x	2	3
y	1	3

③  $\Rightarrow x + y \leq 9 \Rightarrow y \leq 9 - x \Rightarrow O(0, 0) \rightarrow Si.$

x	4	6
y	5	3


Los vértices de la zona factible son los siguientes:

$A \Rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x + y = 9 \end{cases} \Rightarrow A(4, 5).$

$B \Rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ 2y - x = 0 \end{cases} \Rightarrow B(4, 2).$

$C \Rightarrow \begin{cases} 2y - x = 0 \\ y = 2x - 3 \end{cases} \Rightarrow$

$4x - 6 - x = 0; x = 2 \Rightarrow C(2, 1).$



La función de objetivos es la siguiente:  $F(x, y) = 5x + 4y$ .

Los valores de la función de objetivos en cada uno de los vértices son los siguientes:

$$A \Rightarrow f(4, 5) = 5 \cdot 4 + 4 \cdot 5 = 20 + 20 = 40.$$

$$B \Rightarrow f(4, 2) = 5 \cdot 4 + 4 \cdot 2 = 20 + 8 = 28.$$

$$C \Rightarrow f(2, 1) = 5 \cdot 2 + 4 \cdot 1 = 10 + 4 = 14.$$

El máximo se produce en el punto  $A(4, 5)$ .

También se hubiera obtenido el punto  $A$  por la pendiente de la función de objetivos, como puede observarse en la figura.

$$F(x, y) = 5x + 4y = 0 \Rightarrow y = -\frac{5}{4}x \Rightarrow m = -\frac{5}{4}.$$

El máximo se obtiene para  $x = 4$  e  $y = 5$ .

El máximo es 40.

\*\*\*\*\*

2º) Sea la función  $f(x) = ax^3 + bx + 1$ :

a) Calcula los valores de los parámetros  $a$  y  $b$  para que  $f(x)$  tenga un extremo relativo en el punto  $P(1, -5)$ .

b) Para  $a = 2$  y  $b = -6$ , estudiar los máximos y mínimos relativos, y los puntos de inflexión de la función  $f(x)$ .

c) Para  $a = 2$  y  $b = -6$ , calcula el área comprendida entre la función y la recta de ecuación  $y = 2x + 1$ . Realiza la representación gráfica.

a)

Por contener al punto  $P(1, -5) \Rightarrow f(1) = -5$ :

$$f(1) = a \cdot 1^3 + b \cdot 1 + 1 = -5; \quad a + b + 1 = -5; \quad a + b = -6. \quad (1)$$

Por tener un extremo relativo en  $P(1, -5) \Rightarrow f'(1) = 0$ :

$$f'(x) = 3ax^2 + b.$$

$$f'(1) = 3a \cdot 1^2 + b = 0; \quad 3a + b = 0. \quad (2)$$

Resolviendo el sistema formado por las ecuaciones (1) y (2):

$$\left. \begin{array}{l} a + b = -6 \\ 3a + b = 0 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} -a - b = 6 \\ 3a + b = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow 2a = 6; \quad \underline{a = 3}. \quad 3 + b = -6 \Rightarrow \underline{b = -9}.$$

b)

Para  $a = 2$  y  $b = -6$  la función resulta  $f(x) = 2x^3 - 6x + 1$ .

$$f'(x) = 6x^2 - 6.$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 6x^2 - 6 = 0; \quad x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 1.$$

$$f''(x) = 12x.$$

$$f''(-1) = 12 \cdot (-1) = -12 < 0 \Rightarrow \text{Máximo relativo para } x = -1.$$

$$f(-1) = 2 \cdot (-1)^3 - 6 \cdot (-1) + 1 = -2 + 6 + 1 = 5.$$

$$\underline{\underline{\text{Máximo relativo} \Rightarrow P(-1, 5)}}.$$

$$f''(1) = 12 \cdot 1 = 12 > 0 \Rightarrow \text{Mínimo relativo para } x = 1.$$

$$f(1) = 2 \cdot 1^3 - 6 \cdot 1 + 1 = 2 - 6 + 1 = -3.$$

Mínimo relativo  $\Rightarrow Q(1, -3)$ .

Una función polinómica tiene un punto de inflexión cuando se anula su segunda derivada:

$$f''(x) = 0 \Rightarrow 12x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow \text{Punto de inflexión para } x = 0.$$

$$f(0) = 2 \cdot 0^3 - 6 \cdot 0 + 1 = 1.$$

Punto de inflexión  $\Rightarrow R(0, 1)$ .

c)

Para  $a = 2$  y  $b = -6$  la función resulta  $f(x) = 2x^3 - 6x + 1$ .


Los puntos de corte de la función y la recta tienen por abscisas las raíces de la ecuación que resulta de la igualación de sus expresiones:

$$2x^3 - 6x + 1 = 2x + 1; \quad 2x^3 - 6x - 2x = 0; \quad 2x^3 - 8x = 0;$$

$$2x(x^2 - 4) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \rightarrow R(0, 1) \\ x_2 = -2 \rightarrow A(-2, -3) \\ x_3 = 2 \rightarrow B(2, 5) \end{cases}$$

La representación gráfica de la situación se expresa, de forma aproximada, en la figura adjunta.

De la observación de la figura se deduce que en el intervalo  $(-2, 0)$  las ordenadas de la función son mayores que las correspondientes ordenadas de la recta y que, en el intervalo  $(0, 2)$  ocurre lo contrario, por lo cual, la superficie a calcular es la siguiente:



$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^0 [f(x) - y] \cdot dx + \int_0^2 [y - f(x)] \cdot dx = \\ &= \int_{-2}^0 [(2x^3 - 6x + 1) - (2x + 1)] \cdot dx + \int_0^2 [(2x + 1) - (2x^3 - 6x + 1)] \cdot dx = \\ &= \int_{-2}^0 (2x^3 - 6x + 1 - 2x - 1) \cdot dx + \int_0^2 (2x + 1 - 2x^3 + 6x - 1) \cdot dx = \\ &= \int_{-2}^0 (2x^3 - 8x) \cdot dx + \int_0^2 (8x - 2x^3) \cdot dx = \left[ \frac{2x^4}{4} - \frac{8x^2}{2} \right]_{-2}^0 + \left[ \frac{8x^2}{2} - \frac{2x^4}{4} \right]_0^2 = \end{aligned}$$

$$= \left[ \frac{x^4}{2} - 4x^2 \right]_{-2}^0 + \left[ 4x^2 - \frac{x^4}{2} \right]_0^2 = 0 - \left[ \frac{(-2)^4}{2} - 4 \cdot (-2)^2 \right] + \left( 4 \cdot 2^2 - \frac{2^4}{2} \right) - 0 =$$
$$= -8 + 16 + 16 - 8 = 16.$$

$$\underline{S = 16 u^2.}$$

\*\*\*\*\*

3º) En un instituto, el 90 % del alumnado matriculado ha nacido en la ciudad en la que está localizado dicho centro. El 42 % del alumnado son chicos, y el 54 % son chicas nacidas en la ciudad en la que se ubica el instituto.

a) Elegida una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea nacida en la ciudad donde se ubica el instituto?

b) ¿Y la probabilidad de que sea chica y no haya nacido en la localidad donde se ubica el instituto?

c) Se ha elegido una persona al azar entre el alumnado y ha resultado ser nacida en la ciudad donde se ubica el instituto. ¿Cuál es la probabilidad de que sea chico?

-----

Este ejercicio se puede hacer mediante una tabla de contingencia:

	<i>Varón</i>	<i>Mujer</i>	
<i>Nacido en ciudad</i>		54	90
<i>No nacido en ciudad</i>			
	42		100

Completando la tabla de contingencia:

	<i>Varón</i>	<i>Mujer</i>	
<i>Nacido en ciudad</i>	<b>36</b>	54	90
<i>No nacido en ciudad</i>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
	42	<b>58</b>	100

Ahora basta con aplicar la regla de Laplace:

a)

$$P = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}} = \frac{10}{100} = \underline{0,10}.$$

b)

$$P = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}} = \frac{4}{100} = \underline{0,04}.$$

c)

$$P = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}} = \frac{36}{90} = \underline{0,40}.$$

\*\*\*\*\*

4º) Las notas obtenidas por los estudiantes de un determinado grupo en una asignatura siguen una distribución normal de media 6,2 puntos y desviación típica 2 puntos. Se elige un estudiante al azar. Calcula:

a) La probabilidad de que su nota sea superior a 7.

b) La probabilidad de que haya obtenido una nota comprendida entre 5 y 8 puntos.

c) Si el 25 % del alumnado con mejor nota, consiguió la calificación de "sobresaliente", ¿cuál es la nota mínima para obtener dicha calificación?

-----

a)

Datos:  $\mu = 6,2$ ;  $\sigma = 2$ .

$X \rightarrow N(\mu; \sigma) = N(6,2; 2)$ . Tipificando la variable:  $Z = \frac{X-6,2}{2}$ .

$$P = P(X > 7) = P\left(Z > \frac{7-6,2}{2}\right) = P\left(Z > \frac{0,8}{2}\right) = P(Z > 0,4) = \\ = 1 - P(Z \leq 0,4) = 1 - 0,6554 = \underline{0,3446}.$$

b)

$$P = P(5 \leq X \leq 8) = P\left(\frac{5-6,2}{2} \leq Z \leq \frac{8-6,2}{2}\right) = P\left(\frac{-1,2}{2} \leq Z \leq \frac{1,8}{2}\right) = \\ = P(-0,6 \leq Z \leq 0,9) = P(Z < 0,9) - [1 - P(Z < 0,6)] = \\ = P(Z < 0,9) - 1 + P(Z < 0,6) = 0,8159 - 1 + 0,7257 = 1,5416 - 1 = \underline{0,5416}.$$

c)

Se debe hallar  $\gamma$  tal que:  $P = P(X > \gamma) = 0,25 \Rightarrow P\left(Z > \frac{\gamma-6,2}{2}\right) = 0,25$ .

Como el valor 0,25 no está en la tabla  $N(0, 1)$  se hace lo siguiente:

$$P\left(Z > \frac{\gamma-6,2}{2}\right) = 1 - P\left(Z \leq \frac{\gamma-6,2}{2}\right) = 0,25; P\left(Z \leq \frac{\gamma-6,2}{2}\right) = 1 - 0,25 = 0,75.$$

Mirando de forma inversa en la tabla  $N(0,1)$  a 0,75 le corresponde, aproximadamente, 0,675:

$$\frac{\gamma-6,2}{2} = 0,675; \gamma - 6,2 = 1,35; \gamma = 6,2 + 1,35 = 7,55.$$

La nota mínima para "sobresaliente" es de 7,55.

\*\*\*\*\*

5º) Sean las matrices  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$  y  $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ .

a) Calcular la inversa de la matriz  $(A \cdot A^t)$ .

b) ¿Admite inversa la matriz  $(A^t \cdot A)$ ?

c) Calcular, cuando sea posible:  $A \cdot B$  y  $A^t \cdot B$ .

a)

$$A \cdot A^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 8 & 14 \end{pmatrix}. \quad (A \cdot A^t)^t = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 8 & 14 \end{pmatrix} = A \cdot A^t.$$

$$|A \cdot A^t| = \begin{vmatrix} 5 & 8 \\ 8 & 14 \end{vmatrix} = 70 - 64 = 6. \quad \text{Adj. de } (A \cdot A^t)^t = \begin{pmatrix} 14 & -8 \\ -8 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$(A \cdot A^t)^{-1} = \frac{\text{Adj. de } (A \cdot A^t)^t}{|A \cdot A^t|} = \frac{\begin{pmatrix} 14 & -8 \\ -8 & 5 \end{pmatrix}}{6} \Rightarrow \underline{(A \cdot A^t)^{-1} = \frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} 14 & -8 \\ -8 & 5 \end{pmatrix}}.$$

b)

Una matriz es invertible cuando su determinante es distinto de cero.

$$A^t \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 8 & 13 \end{pmatrix}.$$

$$|A^t \cdot A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 8 & 13 \end{vmatrix} = 65 + 48 + 48 - 45 - 64 - 52 = 161 - 161 = 0.$$

La matriz  $(A^t \cdot A)$  no tiene inversa por ser  $|A^t \cdot A| = 0$ .

c)

Para que dos matrices se puedan multiplicar es necesario que el número de columnas de la primera se igual que el número de filas de la segunda.

El producto  $A_{2 \times 3} \cdot B_{2 \times 2}$  no es posible por lo expuesta anteriormente.

$$A^t \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{A^t \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}}.$$

\*\*\*\*\*

6°) a) Determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y los máximos y mínimos relativos de la función  $y = 4 - x^2$ .

b) Representar gráficamente la función  $f(x) = \begin{cases} 4 - x^2 & \text{si } -2 \leq x < 0 \\ 4 - x & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \end{cases}$ .

c) Hallar el área de la región limitada por la gráfica de  $f(x)$  y el eje de abscisas.

a)

La función  $y = 4 - x^2$  es una parábola cóncava ( $\cap$ ) por ser negativo el coeficiente de  $x^2$ ; su vértice (máximo) es el punto siguiente:

$$y'(x) = -2x. \quad y'(x) = 0 \Rightarrow -2x = 0 \Rightarrow x = 0.$$

$$y(0) = 4 - 0^2 = 4 \Rightarrow \underline{\text{Máximo absoluto: } P(0, 4)}.$$

Teniendo en cuenta lo anterior y que la función es continua en su dominio, que es  $\mathbb{R}$ , los intervalos de crecimiento y decrecimiento son los siguientes:


$$\underline{\text{Crecimiento: } y'(x) > 0 \Rightarrow x \in (-\infty, 0)}.$$

$$\underline{\text{Decrecimiento: } y'(x) < 0 \Rightarrow x \in (0, +\infty)}.$$

b)

En el intervalo  $[-2, 0)$  la función es una rama parabólica cóncava ( $\cap$ ) que contiene a los puntos  $A(-2, 0)$ ,  $B(-1, 3)$  y  $C(0, 4)$ .

En el intervalo  $[0, 4]$  la función es una recta de pendiente la unidad negativa y contiene a los puntos  $C(0, 4)$  y  $D(4, 0)$ .




La representación gráfica se expresa en la figura adjunta.

c)

El área de la región limitada por la gráfica de  $f(x)$  y el eje de abscisas es la que

aparece sombreada en la siguiente figura.



$$S = \int_{-2}^0 (4 - x^2) \cdot dx + \int_0^4 (4 - x) \cdot dx = \left[ 4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^0 + \left[ 4x - \frac{x^2}{2} \right]_0^4 =$$
$$= 0 - \left[ 4 \cdot (-2) - \frac{(-2)^3}{3} \right] + \left( 4 \cdot 4 - \frac{4^2}{2} \right) = 8 - \frac{8}{3} + 16 - 8 = 16 - \frac{8}{3} = \frac{48-8}{3} = \frac{40}{3}.$$


$$\underline{S = \frac{40}{3} u^2 \cong 13,33 u^2.}$$

\*\*\*\*\*

7º) En un centro de enseñanza de Estados Unidos hay 1.000 estudiantes y 100 profesores. El 10 % de los profesores son demócratas y el resto republicanos. Entre los estudiantes las proporciones son las contrarias, es decir, el 10 % de ellos son republicanos y el resto son demócratas.

a) Si se elige una persona al azar, ¿cuál es probabilidad de que sea republicana?

b) Se ha elegido al azar una persona de dicho centro y ha resultado ser republicana. ¿Cuál es la probabilidad de que se trate de un estudiante?



a)

$$\begin{aligned}
 P &= P(R) = P(\text{Pr} \cap R) + P(\text{Al} \cap R) = \\
 &= P(\text{Pr}) \cdot P(R|\text{Pr}) + P(\text{Al}) \cdot P(R|\text{Al}) = \frac{1}{11} \cdot 0,9 + \frac{10}{11} \cdot 0,1 = \\
 &= 0,0818 + 0,0909 = \underline{0,1727}.
 \end{aligned}$$

b)

$$P = P(\text{Al}/R) = \frac{P(\text{Al} \cap R)}{P(R)} = \frac{P(\text{Al}) \cdot P(R|\text{Al})}{P(R)} = \frac{\frac{10}{11} \cdot 0,0909}{0,1727} = \frac{0,0909}{0,1727} = \underline{0,5264}.$$

\*\*\*\*\*

8º) El tiempo que necesitan los alumnos de un grupo para finalizar el examen de una determinada asignatura se distribuye normalmente, con una media de 60 minutos y una desviación típica de 10 minutos.

a) Si se dan 75 minutos para realizar el examen, ¿qué proporción de alumnos conseguirán finalizarlo?

b) Si se dan 80 minutos para realizar el examen, ¿qué proporción de alumnos no conseguirá finalizarlo?

c) ¿Qué tiempo haya que dar para la realización de dicho examen si se quiere que el 96 % de los alumnos consigan terminarlo?

a)

Datos:  $\mu = 60$ ;  $\sigma = 10$ .

$X \rightarrow N(\mu; \sigma) = N(60, 10)$ . Tipificando la variable:  $Z = \frac{X-60}{10}$ .

$$P = P(X \leq 75) = P\left(Z \leq \frac{75-60}{10}\right) = P\left(Z \leq \frac{15}{10}\right) = P(Z \leq 1,5) = 0,9332.$$

Conseguirán terminar el examen el 93,32 % de los alumnos.

b)

$$P = P(X > 80) = P\left(Z > \frac{80-60}{10}\right) = P\left(Z > \frac{20}{10}\right) = P(Z > 2) = \\ = 1 - P(Z \leq 2) = 1 - 0,9772 = 0,0228.$$

No terminarán el examen el 2,28 % de los alumnos.

c)

Se debe hallar  $\gamma$  tal que:  $P = P(X \leq \gamma) = 0,96 \Rightarrow P\left(Z \leq \frac{\gamma-60}{10}\right) = 0,96$ .

Mirando de forma inversa en la tabla  $N(0,1)$  a 0,96 le corresponde, muy aproximadamente, 1,75:

$$\frac{\gamma-60}{10} = 1,75; \gamma - 60 = 17,5; \gamma = 60 + 17,5 = 77,5.$$

Terminarán el examen el 96 % de los alumnos con 77,5 minutos.

\*\*\*\*\*