

## QUÍMICA

El examen consta de 8 preguntas de 2 puntos, de las que podrá responder un **MÁXIMO DE 5**, combinadas como quiera. Cada pregunta vale **2 puntos (1 punto por apartado)**. Si responde más preguntas de las permitidas, **solo se corregirán las 5 primeras respondidas**.

### PREGUNTA 1.

Conteste a cada una de las siguientes cuestiones justificando la respuesta.

**1.1.** Indique si las moléculas CS<sub>2</sub> y NCl<sub>3</sub> tienen o no momento dipolar.


**1.2.** Explique por qué la molécula de cloro es covalente mientras que el CsCl es un compuesto iónico.

Indique una propiedad de cada compuesto.

### PREGUNTA 2.

**2.1.** Para los elementos A, B y C de números atómicos 7, 9 y 37, respectivamente, ordénelos de mayor a menor radio atómico e indique cuál tendrá más tendencia a captar un electrón para formar un anión. Justifique la respuesta.

**2.2.** Complete las siguientes reacciones químicas orgánicas empleando las fórmulas semidesarrolladas e indique el tipo de reacción a lo que pertenecen:



### PREGUNTA 3.

**3.1.** La ecuación de velocidad de una reacción es  $v = k \cdot [\text{A}] \cdot [\text{B}]^2$ . Razone si las unidades de la constante de velocidad son mol<sup>-1</sup>·L·s.

**3.2.** Se dispone de una disolución acuosa saturada de CaCO<sub>3</sub> en equilibrio con su sólido; indique como se verá modificada su solubilidad al añadirle En Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, considerando esta sal totalmente disociada. Razone la respuesta indicando el equilibrio y la expresión de la constante del producto de solubilidad (K<sub>ps</sub>).

### PREGUNTA 4.

En un recipiente de 10 litros se introducen 2 moles de N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> gaseoso a 50 °C produciéndose el siguiente equilibrio de disociación: N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>(g) ⇌ 2 NO<sub>2</sub>(g). Si la constante K<sub>p</sub> a dicha temperatura es de 1,06; calcule:

**4.1.** Las concentraciones de los dos gases tras alcanzar el equilibrio y el porcentaje de disociación del N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>.

**4.2.** Las presiones parciales de cada gas y la presión total en el equilibrio.

### PREGUNTA 5.

Una disolución acuosa 0,03 M de un ácido monoprótico (HA) tiene un pH de 3,98. Calcule:

**5.1.** La concentración molar de A<sup>-</sup> en la disolución y el grado de disociación del ácido.

**5.2.** El valor de la constante del ácido (K<sub>a</sub>) y el valor de la constante de su base conjugada (K<sub>b</sub>).

### PREGUNTA 6.

El dicromato de potasio (K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>) reacciona con sulfato de hierro(II), en medio ácido sulfúrico, dando sulfato de hierro(III), sulfato de cromo(III), sulfato de potasio y agua.

**6.1.** Ajuste las ecuaciones iónica y molecular por el método del ión-electrón.

**6.2.** Calcule los gramos de sulfato de cromo(III) que podrán obtenerse a partir de 5,0 g de K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> si el rendimiento de la reacción es del 60 %.

### PREGUNTA 7.

Se mezclan 20 mL de una disolución acuosa de BaCl<sub>2</sub> 0,5 M con 80 mL de una disolución acuosa de CaSO<sub>4</sub> 0,04 M.

**7.1.** Escriba la reacción química que tiene lugar, nombre y calcule la cantidad en gramos del precipitado obtenido.

**7.2.** Nombre y dibuje el material y describa el procedimiento que emplearía en el laboratorio para separar el precipitado.

### PREGUNTA 8.

Al valorar 20,0 mL de una disolución de Ca(OH)<sub>2</sub> se gastan 18,1 mL de una disolución de HCl 0,250 M.

**8.1.** Escriba la reacción que tiene lugar y calcule la concentración molar de la disolución de la base.

**8.2.** Indique el material y reactivos necesarios, dibuje el montaje y explique el procedimiento realizado.

Datos: R = 8,31 J·K<sup>-1</sup>·mol<sup>-1</sup> = 0,082 atm·L·K<sup>-1</sup>·mol<sup>-1</sup>; 1 atm = 101,3 kPa; K<sub>w</sub> = 1,0·10<sup>-14</sup>.



## Soluciones

1.1. Contesta a la siguiente cuestión justificando la respuesta:

a) Indica si las moléculas CS<sub>2</sub> y NCl<sub>3</sub> tienen o no momento dipolar.

(A.B.A.U. Jul. 21)

**Solución:**

Molécula	CS <sub>2</sub>	NCl <sub>3</sub>
Átomo central	C	N
Configuración electrónica fundamental	(2s) <sup>2</sup> (2p <sub>x</sub> ) <sup>1</sup> (2p <sub>y</sub> ) <sup>1</sup>	(2s) <sup>2</sup> (2p <sub>x</sub> ) <sup>1</sup> (2p <sub>y</sub> ) <sup>1</sup> (2p <sub>z</sub> ) <sup>1</sup>
Configuración electrónica excitada	(2s) <sup>1</sup> (2p <sub>x</sub> ) <sup>1</sup> (2p <sub>y</sub> ) <sup>1</sup> (2p <sub>z</sub> ) <sup>1</sup>	(2s) <sup>2</sup> (2p <sub>x</sub> ) <sup>1</sup> (2p <sub>y</sub> ) <sup>1</sup> (2p <sub>z</sub> ) <sup>1</sup>
Diagrama de Lewis	$\text{:S:}^{\cdot\cdot}\text{C:}^{\cdot\cdot}\text{:S:}$	$\begin{array}{c} \text{:Cl:}^{\cdot\cdot}\text{N:}^{\cdot\cdot}\text{:Cl:} \\ \text{:Cl:}^{\cdot\cdot} \end{array}$
Pares $\sigma$	2	3
Pares $\pi$	2	0
Pares no enlazantes	0	1
Pares que se repelen	2	4
Disposición de los pares	lineal	tetraédrica
Ángulo de enlace	180°	107°
Forma de la molécula	lineal	piramidal achatada
	S = C = S	
Momento dipolar de enlace	S <sup>δ-</sup> → C <sup>δ+</sup>	No
Momento dipolar de la molécula	S <sup>δ-</sup> → C <sup>δ+</sup> ← S <sup>δ-</sup>	
	No	Sí

La molécula de CS<sub>2</sub> no es polar. Es una molécula lineal en la que los dipolos S<sup>δ-</sup> → C<sup>δ+</sup> valen lo mismo y están dirigidos en sentidos contrarios. La resultante de los momentos dipolares es nula.

La molécula de NCl<sub>3</sub> es polar. Las electronegatividades de los átomos de Cl y N son muy similares y los enlaces Cl-N tienen un momento dipolar nulo (o muy pequeño). Pero el par no enlazante del nitrógeno no se compensa. Como está muy próximo al átomo de nitrógeno, el momento dipolar será pequeño.

1.2. b) Explica por qué la molécula de cloro es covalente mientras que el CsCl es un compuesto iónico. Indica una propiedad de cada compuesto.

(A.B.A.U. Jul. 21)

**Solución:**

Cl<sub>2</sub>

El enlace covalente se emplea para explicar la unión entre átomos de electronegatividad parecida. Los dos átomos de cloro tienen la misma electronegatividad. El enlace se produce por el hecho de compartir electrones desapareados para intentar que cada átomo quede rodeado por ocho electrones (regla del octeto). El diagrama de Lewis sería  $\text{:Cl:}^{\cdot\cdot}\text{:Cl:}^{\cdot\cdot}$

El cloro es un gas a la temperatura ambiente, porque las fuerzas intermoleculares entre las moléculas son relativamente pequeñas.

Nos conduce la corriente eléctrica al no disponer de cargas libres.

CsCl

El enlace iónico explica la unión entre átomos de diferente electronegatividad. El cloro es un elemento muy electronegativo, tanto que la captura de un electrón es un proceso exotérmico, favorecido por el hecho de que el ion cloruro consigue la configuración electrónica de un gas noble. El cesio es muy poco electronegativo, y la pérdida de un electrón para tener una configuración estable es un proceso que requiere una cantidad muy pequeña de energía. La energía de red, junto con la afinidad electrónica, compensa los aportes energéticos necesarios para su formación.

El cloruro de cesio es un sólido con un punto de fusión relativamente alto. No conduce la corriente eléctrica en esta sólido pero sí disuelto en agua o fundido.

- 2.1. Para los elementos A, B y C de números atómicos 7, 9 y 37, respectivamente, ordénalos de mayor a menor radio atómico e indica cuál tendrá más tendencia a captar un electrón para formar un anión. Justifique la respuesta.

(A.B.A.U. Jul. 21)

**Solución:**

El radio atómico de un elemento se define como la mitad de la distancia internuclear en la molécula diatómica (si formase moléculas diatómicas) o de la distancia entre dos átomos en la estructura cristalina. Las predicciones de la variación de radio atómico a lo largo de un período se basan en el efecto de la fuerza de atracción que ejerce la carga nuclear sobre los electrones externos haciendo que se aproximen al núcleo y den un tamaño menor.

Como regla sencilla, se dice que el radio atómico aumenta en un período de la tabla periódica hacia la izquierda.

Los elementos A ( $Z = 7$ ) y B ( $Z = 9$ ) se encuentran en el mismo 2.º periodo. El elemento A queda más a la izquierda y tendrá un radio mayor.

En un grupo, el radio atómico aumenta hacia abajo, porque los átomos tienen niveles de energía más externos y más alejados de núcleo.



El elemento C ( $Z = 37$ ) se encuentra en el periodo 5. Queda mucho más abajo que los otros y tendrá un radio mayor.

$$r(C) > r(A) > r(B)$$

La tendencia a captar un electrón para formar un anión se mide por la afinidad electrónica, que es la energía que se desprende cuando un mol de átomos en fase gaseosa y en estado fundamental captan un mol de electrones para dar iones mononegativos gaseosos. Es tanto mayor cuanto más próxima a la estructura electrónica de gas noble sea la estructura electrónica del átomo.



El elemento B ( $Z = 9$ ) se encuentra justo a la izquierda de un gas noble. Tiene la mayor tendencia a coger un electrón para conseguir la estructura de gas noble. Es el que tiene la mayor afinidad electrónica.


- 2.2. Completa las siguientes reacciones químicas orgánicas empleando las fórmulas semidesarrolladas e indica el tipo de reacción al que pertenecen:



(A.B.A.U. Jul. 21)

**Solución:**





3.1. La ecuación de velocidad de una reacción es  $v = k \cdot [\text{A}] \cdot [\text{B}]^2$ . Razona si las unidades de la constante de velocidad son  $\text{mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{s}$ .

(A.B.A.U. Jul. 21)

**Solución:**

La ecuación de velocidad es:

$$v = k \cdot [\text{A}] \cdot [\text{B}]^2$$

Como las unidades de la velocidad de reacción son  $[v] \text{ mol/dm}^3/\text{s}$ , las unidades de la constante de velocidad son

$$k = \frac{v}{[\text{A}] \cdot [\text{B}]^2} = \frac{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}}{(\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}) \cdot (\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3})^2}$$

$$[k] = \text{dm}^6 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$$

3.2. Se dispone de una disolución acuosa saturada de  $\text{CaCO}_3$  en equilibrio con su sólido. Indique cómo se verá modificada su solubilidad al añadirle  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ , considerando esta sal totalmente disociada. Razone la respuesta indicando el equilibrio y la expresión de la constante del producto de solubilidad ( $K_{ps}$ ).


(A.B.A.U. Jul. 21)

**Solución:**

La solubilidad del  $\text{CaCO}_3$  será menor que antes por efecto del ion común. El  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  soluble se disociará totalmente:



lo que produce un aumento en la concentración del ion  $\text{CO}_3^{2-}$  en la disolución. Esto provocará un desplazamiento del equilibrio



hacia la formación de la sal sólida, ya que en la expresión del producto de solubilidad,

$$K_s = [\text{Ca}^{2+}]_e \cdot [\text{CO}_3^{2-}]_e$$

un aumento en la concentración del ion  $\text{CO}_3^{2-}$  tendrá que ser compensada con una disminución en la concentración del ion  $\text{Ca}^{2+}$  para mantener constante el valor del producto de solubilidad, que es una constante de equilibrio que solo cambia con la temperatura.

Es decir, la sal estará menos disociada y la solubilidad será menor.

P.4. En un recipiente de 10 litros se introducen 2 moles de  $\text{N}_2\text{O}_4$  gaseoso a  $50^\circ\text{C}$  produciéndose el siguiente equilibrio de disociación:  $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NO}_2(\text{g})$ . Si la constante  $K_p$  a dicha temperatura es de 1,06. Calcula:

a) Las concentraciones de los dos gases tras alcanzar el equilibrio y el porcentaje de disociación del  $\text{N}_2\text{O}_4$ .

b) Las presiones parciales de cada gas y la presión total en el equilibrio.

Datos:  $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ;  $1 \text{ atm} = 101,3 \text{ kPa}$ .

(A.B.A.U. Jul. 21)

**Rta.:** a)  $[\text{N}_2\text{O}_4] = 0,160 \text{ mol/dm}^3$ ;  $[\text{NO}_2] = 0,0800 \text{ mol/dm}^3$ ;  $\alpha = 20,0 \%$ ;

b)  $p(\text{N}_2\text{O}_4) = 4,24 \text{ atm} = 430 \text{ kPa}$ ;  $p(\text{NO}_2) = 2,12 \text{ atm} = 215 \text{ kPa}$ ;  $p = 6,36 \text{ atm} = 645 \text{ kPa}$ .

**Datos**

Gas: Volumen  
 Temperatura  
 Cantidad inicial de tetraóxido de dinitrógeno  
 Constante de equilibrio (en función de las presiones en atm)  
 Constante de los gases ideales

**Incógnitas**

Concentraciones de los dos gases en el equilibrio  
 Presión parcial de cada gas y presión total en el equilibrio

**Ecuaciones**

Ley de Dalton de las presiones parciales  
 Concentración de la sustancia X  
 Grado de disociación  
 Ecuación de estado de los gases ideales  
 Constante del equilibrio:  $a A + b B \rightleftharpoons c C + d D$

**Cifras significativas: 3**

$V = 10,0 \text{ dm}^3$   
 $T = 50 \text{ }^\circ\text{C} = 323 \text{ K}$   
 $n_0(\text{N}_2\text{O}_4) = 2,00 \text{ mol N}_2\text{O}_4$   
 $K_c = 1,06$   
 $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{dm}^3\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$

$[\text{N}_2\text{O}_4]_e, [\text{NO}_2]_e$   
 $p_e(\text{N}_2\text{O}_4), p_e(\text{NO}_2), p_{et}$

$$p_t = \sum p_i$$

$$[\text{X}] = n(\text{X}) / V$$


$$\alpha = \frac{n_d}{n_0}$$

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$K_c = \frac{[\text{C}]_e^c \cdot [\text{D}]_e^d}{[\text{A}]_e^a \cdot [\text{B}]_e^b} \quad K_p = \frac{p_e^c(\text{C}) \cdot p_e^d(\text{D})}{p_e^a(\text{A}) \cdot p_e^b(\text{B})}$$

**Solución:**

b) La ecuación química es:



La ecuación de la constante de equilibrio en función de las presiones (en atm) es:

$$K_p = \frac{p_e^2(\text{NO}_2)}{p_e(\text{N}_2\text{O}_4)}$$

Suponiendo comportamiento ideal para los gases, la presión viene dada por:

$$p = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$$

La presión inicial del tetraóxido de dinitrógeno es:

$$p(\text{N}_2\text{O}_4) = \frac{2,00 \text{ mol N}_2\text{O}_4 \cdot 0,082 \text{ atm}\cdot\text{dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 323 \text{ K}}{10,0 \text{ dm}^3} = 5,30 \text{ atm}$$

Se llama  $x$  a la presión de tetraóxido de dinitrógeno que se transforma en dióxido de nitrógeno. Por la estequiometría de la reacción,

		$\text{N}_2\text{O}_4$	$\rightleftharpoons$	$2 \text{NO}_2$	
Presión inicial	$p_0$	5,30		0	atm
Presión que reacciona o se forma	$p_r$	$x$		$2x$	atm
Presión en el equilibrio	$p_e$	$5,30 - x$		$2x$	atm

Sustituyendo en la ecuación de la constante obtenemos:

$$1,06 = \frac{(2x)^2}{5,30 - x}$$

$$5,62 - 1,06x = 4x^2$$

$$x = 1,06 \text{ atm}$$

Las presiones parciales serían:

$$p_e(\text{NO}_2) = 2x = 2,12 \text{ atm}$$

$$p_e(\text{N}_2\text{O}_4) = 5,30 - x = 5,30 - 1,06 = 4,24 \text{ atm}$$

Y la presión total se obtiene por la ley de Dalton:

$$p_{\text{et}} = p(\text{NO}_2) + p(\text{N}_2\text{O}_4) = 2,12 + 4,24 = 6,36 \text{ atm}$$

a) La concentración se obtiene de la ecuación de los gases ideales:

$$p = \frac{n \cdot R \cdot T}{V} \Rightarrow \frac{n}{V} = \frac{p}{R \cdot T}$$

$$[\text{NO}_2]_e = \frac{2,12 \text{ atm}}{0,082 \cdot \text{atm} \cdot \text{dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 323 \text{ K}} = 0,0800 \text{ mol/dm}^3$$

$$[\text{N}_2\text{O}_4]_e = \frac{4,24 \text{ atm}}{0,082 \cdot \text{atm} \cdot \text{dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 323 \text{ K}} = 0,160 \text{ mol/dm}^3$$

El grado de disociación es:

$$\alpha = \frac{n_d}{n_0} = \frac{p_d}{p_0} = \frac{1,06}{5,30} = 0,200 = 20 \%$$

P.5. Una disolución acuosa de concentración  $0,03 \text{ mol/dm}^3$  de un ácido monoprótico (HA) tiene un pH de 3,98. Calcula:

- La concentración molar de  $\text{A}^-$  en la disolución y el grado de disociación del ácido.
- El valor de la constante del ácido ( $K_a$ ) y el valor de la constante de su base conjugada ( $K_b$ ).

(A.B.A.U. Jul. 21)

**Rta.:** a)  $[\text{A}^-] = 1,05 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$ ;  $\alpha = 0,349 \%$ ; b)  $K_a = 3,67 \cdot 10^{-7}$ ;  $K_b = 2,73 \cdot 10^{-8}$ .

### Datos

Concentración de ácido monoprótico

pH de la disolución

### Incógnitas

Concentración del anión

Grado de disociación

Constante de acidez del ácido


Constante de basicidad da base conjugada

### Otros símbolos

Concentración de la sustancia X

### Ecuaciones

Constante de acidez de un ácido monoprótico:



pH

Producto iónico del agua

Grado de disociación

### Cifras significativas: 3

$$[\text{HA}]_0 = 0,0300 \text{ mol/dm}^3$$

$$\text{pH} = 3,98$$

$$[\text{A}^-]$$

$$\alpha$$

$$K_a$$

$$K_b$$

$$[\text{X}]$$

$$K_a = \frac{[\text{A}^-]_e \cdot [\text{H}^+]_e}{[\text{HA}]_e}$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

$$K_w = [\text{H}^+]_e \cdot [\text{OH}^-]_e = 1,00 \cdot 10^{-14}$$

$$\text{p}K_w = \text{pH} + \text{pOH} = 14,00$$

$$\alpha = \frac{n_d}{n_0} = \frac{[\text{s}]_d}{[\text{s}]_0}$$

### Ecuaciones

Relación entre la constante de acidez y la de basicidad de la base conjugada-  $K_a \cdot K_b = K_w$


### Solución:

a) Como  $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ ,

$$3,98 = -\log[\text{H}^+]$$

$$[\text{H}^+]_e = 10^{-3,98} = 1,05 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$$

De la estequiometría de la reacción de disociación



se deduce que la concentración de ácido disociado  $[\text{HA}]_d$  es la misma que la de los iones hidrógeno producidos  $[\text{H}^+]_e$  y la de los aniones  $[\text{A}^-]_e$

$$[\text{HA}]_d = [\text{H}^+]_e = [\text{A}^-]_e = 1,05 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$$

Escribiendo en una tabla las concentraciones de cada especie:

		HA	$\rightleftharpoons$	$\text{H}^+$	$\text{A}^-$	
$[\text{X}]_0$	Concentración inicial	0,0300		$\approx 0$	0	$\text{mol/dm}^3$
$[\text{X}]_d$	Concentración disociada o formada	$1,05 \cdot 10^{-4}$	$\rightarrow$	$1,05 \cdot 10^{-4}$	$1,05 \cdot 10^{-4}$	$\text{mol/dm}^3$
$[\text{X}]_e$	Concentración en el equilibrio	$0,0300 - 1,05 \cdot 10^{-4} = 0,0299$		$1,05 \cdot 10^{-4}$	$1,05 \cdot 10^{-4}$	$\text{mol/dm}^3$


El grado de disociación es:

$$\alpha = \frac{[\text{s}]_d}{[\text{s}]_0} = \frac{1,05 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3}{0,0300 \text{ mol/dm}^3} = 0,00349 = 0,349 \%$$

b) La constante de equilibrio  $K_a$  es:

$$K_a = \frac{[\text{A}^-]_e \cdot [\text{H}^+]_e}{[\text{HA}]_e} = \frac{1,05 \cdot 10^{-4} \cdot 1,05 \cdot 10^{-4}}{0,00299} = 3,67 \cdot 10^{-7}$$

La base  $\text{A}^-$  conjugada del ácido, puede reaccionar con el agua hasta conseguir el equilibrio:



La constante  $K_b$  de este equilibrio es:

$$K_b = \frac{[\text{OH}^-]_e \cdot [\text{AH}]_e}{[\text{A}^-]_e}$$

Multiplicando esta expresión por la de la constante de acidez, obtenemos la relación entre ambas.


$$K_a \cdot K_b = \frac{[\text{A}^-]_e \cdot [\text{H}^+]_e}{[\text{HA}]_e} \cdot \frac{[\text{OH}^-]_e \cdot [\text{AH}]_e}{[\text{A}^-]_e} = [\text{H}^+]_e \cdot [\text{OH}^-]_e = K_w$$

$$K_b = \frac{K_w}{K_a} = \frac{1,00 \cdot 10^{-14}}{3,67 \cdot 10^{-7}} = 2,73 \cdot 10^{-8}$$

P.6. El dicromato de potasio ( $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ) reacciona con sulfato de hierro(II), en medio ácido sulfúrico, dando sulfato de hierro(III), sulfato de cromo(III), sulfato de potasio y agua.

a) Ajusta las ecuaciones iónica y molecular por el método del ión-electrón.

b) Calcula los gramos de sulfato de cromo(III) que podrán obtenerse a partir de 5,0 g de  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  si el rendimiento de la reacción es del 60 %.

**Datos**

Masa de dicromato de potasio

**Cifras significativas: 3**

$m(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = 5,00 \text{ g}$

Rendimiento de la reacción

$r = 60,0 \%$

Masa molar: Dicromato de potasio

$M(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = 294 \text{ g/mol}$

Sulfato de cromo(III)



$M(\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3) = 392 \text{ g/mol}$

**Incógnitas**Masa de  $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$  que se obtiene con un rendimiento del 60 % $m$ **Otros símbolos**


Cantidad de sustancia (número de moles)

 $n$ **Solución:**

a) Las semirreacciones iónicas son:



Multiplicando la primera semirreacción por 6 y sumando se obtiene la reacción iónica ajustada:

Sumando  $2 \text{K}^+$  y  $7 \text{SO}_4^{2-}$  a cada lado de la ecuación y juntando los iones de signos opuestos se obtiene la reacción global:

b) La cantidad de dicromato de potasio que hay en 5,00 g es:

$$n(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = 5,00 \text{ g K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \frac{1 \text{ mol K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}{294 \text{ g K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} = 0,017 \text{ mol K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$$

Cada mol de dicromato de potasio produciría un mol de sulfato de cromo(III) si el rendimiento fuese del 100 %. Pero como es del 60,0 %, la cantidad de sulfato de cromo(III) obtenida será:

$$n(\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3) = 0,017 \text{ mol K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \frac{1 \text{ mol Cr}_2(\text{SO}_4)_3}{1 \text{ mol K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \frac{60,0 \text{ mol obtenidos}}{100 \text{ mol esperados}} = 0,010 \text{ mol Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \text{ obt.}$$

La masa obtenida es:


$$m(\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3) = 0,010 \text{ mol Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \frac{392 \text{ g Cr}_2(\text{SO}_4)_3}{1 \text{ mol Cr}_2(\text{SO}_4)_3} = 4,00 \text{ g Cr}_2(\text{SO}_4)_3$$

P.7. Se mezclan  $20 \text{ cm}^3$  de una disolución acuosa de  $\text{BaCl}_2$  de concentración  $0,5 \text{ mol/dm}^3$  con  $80 \text{ cm}^3$  de una disolución acuosa de  $\text{CaSO}_4$  de concentración  $0,04 \text{ mol/dm}^3$ .

a) Escribe la reacción química que tiene lugar, nombra los compuestos y calcula la cantidad en gramos del precipitado obtenido.

b) Nombra y dibuja el material y describe el procedimiento que emplearía en el laboratorio para separar el precipitado.

(A.B.A.U. Jul. 21)


**Solución:**

Se obtiene un precipitado de sulfato de bario.

La reacción de precipitación es:



Si solo escribimos la reacción iónica que tiene lugar, será:



Cálculo de la cantidad de precipitado (suponiendo 2 cifras significativas)

Se calcula la masa de sulfato de bario que debería obtenerse a partir de los datos de las disoluciones de cloruro de bario y sulfato de calcio.

Cantidades iniciales de los reactivos:

$$n_0(\text{BaCl}_2) = 20 \text{ cm}^3 \text{ D } \frac{1 \text{ dm}^3}{10^3 \text{ cm}^3} \frac{0,50 \text{ mol}}{1 \text{ dm}^3} = 10 \cdot 10^{-3} \text{ mol BaCl}_2$$

$$n_0(\text{CaSO}_4) = 80 \text{ cm}^3 \text{ D } \frac{1 \text{ dm}^3}{10^3 \text{ cm}^3} \frac{0,040 \text{ mol}}{1 \text{ dm}^3} = 3,2 \cdot 10^{-3} \text{ mol CaSO}_4$$

Como reaccionan tierna a tierna, la cantidad de sulfato de calcio necesaria para reaccionar con el cloruro de bario es

$$n(\text{CaSO}_4) = 10 \cdot 10^{-3} \text{ mol CaSO}_4$$

Como solo hay  $3,2 \cdot 10^{-3}$  mol, menos del necesario, el reactivo limitante es el sulfato de calcio.

La masa teórica de precipitado sería:

$$m = 3,2 \cdot 10^{-3} \text{ mol CaSO}_4 \frac{1 \text{ mol BaSO}_4}{1 \text{ mol CaSO}_4} \frac{233 \text{ g BaSO}_4}{1 \text{ mol BaSO}_4} = 0,75 \text{ g BaSO}_4$$


### Procedimiento

Para separar el precipitado, colóquese un papel de filtro circular en un embudo büchner ajustándolo para no dejar orificios libres y se humedece con agua para que quede adherido.

Se ajustase el embudo büchner sobre uno matraz kitasato y se conecta la rama lateral del kitasato la una trompa de vacío.

Se abre la llave y se vierte el contenido del vaso (precipitado y líquido) en el embudo. Se echa más agua sobre lo precipitado que aún queda en el vaso para llevarlo al embudo.

Cuando ya no gotee más agua en el interior del kitasato, se desencaja el embudo y se cierra la llave. Se quita el papel de filtro y se deja a secar un día o dos.



P.8. Al valorar  $20,0 \text{ cm}^3$  de una disolución de  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  se gastan  $18,1 \text{ cm}^3$  de una disolución de  $\text{HCl}$  de concentración  $0,250 \text{ mol/dm}^3$ .


- Escribe la reacción que tiene lugar y calcula la concentración molar de la disolución de la base.
- Indica el material y reactivos necesarios, dibuja el montaje y explica el procedimiento realizado.

(A.B.A.U. Jul. 21)

**Rta.:** a)  $[\text{Ca}(\text{OH})_2] = 0,113 \text{ mol/dm}^3$  (D).

### **Solución:**

a) La reacción ajustada es



Cálculos: Si se gastaron  $18,1 \text{ cm}^3$  de disolución de ácido clorhídrico de concentración  $0,250 \text{ mol/dm}^3$  la cantidad de ácido clorhídrico que reacciona es:

$$n(\text{HCl}) = 18,1 \text{ cm}^3 \text{ D } \text{HCl} \frac{0,250 \text{ mol HCl}}{1000 \text{ cm}^3 \text{ D NaOH}} = 4,53 \cdot 10^{-3} \text{ mol HCl}$$

La cantidad de hidróxido de calcio que reacciona es:

$$n(\text{Ca}(\text{OH})_2) = 4,53 \cdot 10^{-3} \text{ mol HCl} \frac{1 \text{ mol Ca}(\text{OH})_2}{2 \text{ mol HCl}} = 2,26 \cdot 10^{-3} \text{ mol Ca}(\text{OH})_2$$

Y la concentración de la disolución de HCl es

$$[\text{HCl}] = \frac{2,26 \cdot 10^{-3} \text{ mol HCl}}{20,0 \text{ cm}^3 \text{ D HCl}} \frac{10^3 \text{ cm}^3}{1,00 \text{ dm}^3} = 0,113 \text{ mol HCl/dm}^3 \text{ D}$$

**Procedimiento de valoración:** Con una pipeta de 20 cm<sup>3</sup> se miden 20,0 cm<sup>3</sup> de disolución de Ca(OH)<sub>2</sub> y se vierten en un matraz erlenmeyer de 100 cm<sup>3</sup>. Se añaden dos gotas de fenolftaleína y la disolución se volverá de color rosa fucsia. Se llena una bureta de 25 cm<sup>3</sup> con disolución de HCl de concentración 0,250 mol/dm<sup>3</sup> por encima del cero. Se abre la llave hasta que el pico de la bureta esté lleno y el nivel en cero. Se dejan caer 17 cm<sup>3</sup> sobre lo erlenmeyer y se agita. Se abre la llave de la bureta para dejar caer la disolución de HCl en pequeños chorros mientras se imprime un movimiento circular al erlenmeyer hasta que el color del contenido del erlenmeyer desaparezca. Se anota el volumen de HCl gastado (p. ej. 18,5 cm<sup>3</sup>) y se tira el contenido del erlenmeyer y se lava el matraz. Se vuelve a llenar la bureta con HCl hasta el cero. Se miden otros 20 cm<sup>3</sup> de Ca(OH)<sub>2</sub> con la pipeta, se vierten en el erlenmeyer (lavado, pero no necesariamente seco) y se añaden dos gotas de fenolftaleína. Se coloca el erlenmeyer bajo a bureta y se abre la llave hasta dejar caer casi todo el volumen medido antes (p. ej. 18,0 cm<sup>3</sup>). Ahora se deja caer HCl gota a gota mientras se hace rotar al erlenmeyer, hasta que el indicador gire de color. Se anota este valor. Se repite otras dos veces y se toma cómo volumen correcto el valor medio de las medidas que más se aproximan.

**Material:** Bureta (1) de 25 cm<sup>3</sup> (escalonada en 0,1 cm<sup>3</sup>), pipeta (1) de 20 cm<sup>3</sup> con aspirador, matraz erlenmeyer (1) de 100 cm<sup>3</sup>, disolución de fenolftaleína.

La bureta es un tubo estrecho graduado con una boca superior algo más ancha para llenarlo y una llave de paso en la parte inferior para poder vaciarla.

La pipeta es también un tubo estrecho que puede ser escalonado o tener una marca de aforo. Se llena al aspirar con una especie de jeringa cuando la boca inferior más estrecha está sumergida en la disolución.

El matraz erlenmeyer es un recipiente con forma de tronco de cono, con la boca más estrecha que el fondo, para no salpicar al removerlo con un movimiento circular.

Cuestiones y problemas de las [Pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad](#) (A.B.A.U. y P.A.U.) en Galicia.

[Respuestas](#) y composición de [Alfonso J. Barbadillo Marán](#).

Algunos cálculos se hicieron con una [hoja de cálculo](#) de [LibreOffice](#) u [OpenOffice](#) del mismo autor.

Algunas ecuaciones y las fórmulas orgánicas se construyeron con la extensión [CLC09](#) de Charles Lalanne-Cassou.

La traducción al/desde el gallego se realizó con la ayuda de [traducindote](#), de Óscar Hermida López.

Se procuró seguir las [recomendaciones](#) del Centro Español de Metrología (CEM)

Actualizado: 20/03/22