

MATEMÁTICAS II

TEMA 5: INTEGRALES

- Junio, Ejercicio 3
- Junio, Ejercicio 4
- Reserva 1, Ejercicio 3
- Reserva 1, Ejercicio 4
- Reserva 2, Ejercicio 3
- Reserva 2, Ejercicio 4
- Reserva 3, Ejercicio 3
- Reserva 3, Ejercicio 4
- Reserva 4, Ejercicio 3
- Reserva 4, Ejercicio 4
- Julio, Ejercicio 3
- Julio, Ejercicio 4

Sea f la función definida por: $f(x) = \begin{cases} 2x+4 & \text{si } x < 0 \\ (x-2)^2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

a) Calcula los puntos de corte de la gráfica de f con el eje de abscisas y esboza la gráfica de la función.

b) Halla el área del recinto limitado por la gráfica de f y por el eje de abscisas.

MATEMÁTICAS II. 2022. JUNIO. EJERCICIO 3.

R E S O L U C I Ó N

a) El punto de corte con el eje X es $y = 0 \Rightarrow 2x + 4 = 0 \Rightarrow x = -2 \Rightarrow (-2, 0)$

$$y = 0 \Rightarrow (x-2)^2 = 0 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow (2, 0)$$


Como $f(x) = 2x + 4$, es una recta, hacemos una tabla de valores

x	$f(x) = 2x + 4$
0	4
-1	2
-2	0

Como $f(x) = (x-2)^2$, es una parábola, hacemos una tabla de valores

x	$f(x) = (x-2)^2$
0	4
1	1
2	0
3	1
4	4

Luego la gráfica será:



$$b) \text{Área} = \int_{-2}^0 (2x+4)dx + \int_0^2 (x-2)^2 dx = \left[x^2 + 4x \right]_{-2}^0 + \left[\frac{(x-2)^3}{3} \right]_0^2 = 4 + \frac{8}{3} = \frac{20}{3} u^2$$

Considera la función f definida por: $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 2x + 1}$ para $x \neq 1$. Halla una primitiva de f que pase por el punto $(2, 6)$

MATEMÁTICAS II. 2022. JUNIO. EJERCICIO 4

R E S O L U C I Ó N

Dividimos los dos polinomios, con lo cual la integral se descompone en:

$$\int \frac{x^3}{x^2 - 2x + 1} dx = \int (x + 2) dx + \int \frac{3x - 2}{x^2 - 2x + 1} dx = \frac{x^2}{2} + 2x + \int \frac{3x - 2}{x^2 - 2x + 1} dx$$

Calculamos las raíces del denominador: $x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = 1$; $x = 1$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{3x - 2}{x^2 - 2x + 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} = \frac{A(x - 1) + B}{(x - 1)^2}$$

Como los denominadores son iguales, los numeradores también tienen que serlo, luego:

$$\begin{aligned} x = 1 &\Rightarrow 1 = B \\ x = 0 &\Rightarrow -2 = -A + B \Rightarrow -2 = -A + 1 \Rightarrow A = 3 \end{aligned}$$

Con lo cual:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3}{x^2 - 2x + 1} dx &= \frac{x^2}{2} + 2x + \int \frac{3x - 2}{x^2 - 2x + 1} dx = \frac{x^2}{2} + 2x + \int \frac{3}{x - 1} dx + \int \frac{1}{(x - 1)^2} dx = \\ &= \frac{x^2}{2} + 2x + 3 \ln|x - 1| + \int (x - 1)^{-2} dx = \frac{x^2}{2} + 2x + 3 \ln|x - 1| + \frac{(x - 1)^{-1}}{-1} + C = \\ &= \frac{x^2}{2} + 2x + 3 \ln|x - 1| - \frac{1}{x - 1} + C \end{aligned}$$

Calculamos la primitiva que pasa por $(2, 6)$

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{x^2}{2} + 2x + 3 \ln|x - 1| - \frac{1}{x - 1} + C \Rightarrow F(2) = 6 \Rightarrow \frac{2^2}{2} + 2 \cdot 2 + 3 \ln|2 - 1| - \frac{1}{2 - 1} + C = 6 \Rightarrow \\ &\Rightarrow 2 + 4 + 3 \ln|1| - 1 + C = 6 \Rightarrow C = 1 \end{aligned}$$

$$\text{Luego: } F(x) = \frac{x^2}{2} + 2x + 3 \ln|x - 1| - \frac{1}{x - 1} + 1$$

Considera la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = e^x \cdot \text{sen}(2x)$. Halla la primitiva de f cuya gráfica pase por el punto $(0,0)$

MATEMÁTICAS II. 2022. RESERVA 1. EJERCICIO 3

R E S O L U C I Ó N

Es una integral por partes cíclica

$$\begin{aligned} \int e^x \cdot \text{sen}(2x) dx &= -\frac{1}{2} e^x \cos(2x) + \frac{1}{2} \int e^x \cdot \cos(2x) dx = \\ &= -\frac{1}{2} e^x \cos(2x) + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} e^x \text{sen}(2x) - \frac{1}{2} \int e^x \text{sen}(2x) dx \right] = -\frac{1}{2} e^x \cos(2x) + \frac{1}{4} e^x \text{sen}(2x) - \frac{1}{4} \int e^x \text{sen}(2x) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{4}\right) \int e^x \cdot \text{sen}(2x) dx &= -\frac{1}{2} e^x \cos(2x) + \frac{1}{4} e^x \text{sen}(2x) = \\ &= \frac{5}{4} \int e^x \cdot \text{sen}(2x) dx = -\frac{1}{2} e^x \cos(2x) + \frac{1}{4} e^x \text{sen}(2x) \Rightarrow \\ \Rightarrow \int e^x \cdot \text{sen}(2x) dx &= \frac{4}{5} \left(-\frac{1}{2} e^x \cos(2x) + \frac{1}{4} e^x \text{sen}(2x) \right) \Rightarrow \\ \Rightarrow F(x) = \int e^x \cdot \text{sen}(2x) dx &= \frac{-2e^x \cos(2x) + e^x \text{sen}(2x)}{5} + C \end{aligned}$$

$$u = e^x; \quad du = e^x dx$$

$$dv = \text{sen}(2x) dx; \quad v = -\frac{1}{2} \cos(2x)$$

$$u = e^x; \quad du = e^x dx$$

$$dv = \cos(2x) dx; \quad v = \frac{1}{2} \text{sen}(2x)$$

Como pasa por el origen de coordenadas:

$$F(0) = 0 \Rightarrow 0 = \frac{-2e^0 \cos 0^\circ + e^0 \text{sen} 0^\circ}{5} + C \Rightarrow 0 = \frac{-2}{5} + C \Rightarrow C = \frac{2}{5}$$

Luego, la función primitiva que nos piden es: $F(x) = \frac{-2e^x \cos(2x) + e^x \text{sen}(2x)}{5} + \frac{2}{5}$

Considera las funciones $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = 1 - x^2$ y $g(x) = 2x^2$
a) Calcula los puntos de corte de las gráficas de f y g . Esboza el recinto que delimitan.
b) Determina el área del recinto anterior.

MATEMÁTICAS II. 2022. RESERVA 1. EJERCICIO 4


R E S O L U C I Ó N

a) Calculamos los puntos de corte de las dos funciones:

$$1 - x^2 = 2x^2 \Rightarrow 3x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{1}{3}}$$

Luego, los puntos de corte son: $\left(\sqrt{\frac{1}{3}}, \frac{2}{3}\right)$ y $\left(-\sqrt{\frac{1}{3}}, \frac{2}{3}\right)$.

Hacemos el dibujo de las dos parábolas



b) Como es simétrica, el área pedida es:

$$\begin{aligned} A &= 2 \cdot \int_0^{\sqrt{\frac{1}{3}}} (1 - x^2 - 2x^2) dx = 2 \cdot \left[x - \frac{x^3}{3} - \frac{2x^3}{3} \right]_0^{\sqrt{\frac{1}{3}}} = 2 \cdot \left[x - x^3 \right]_0^{\sqrt{\frac{1}{3}}} = 2 \cdot \left[\sqrt{\frac{1}{3}} - \left(\sqrt{\frac{1}{3}} \right)^3 \right] = \\ &= 2 \cdot \left[\sqrt{\frac{1}{3}} - \frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{3}} \right] = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{1}{3}} = 0'7698 \text{ u}^2 \end{aligned}$$

Considera la función $F : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $F(x) = \int_0^x 2t \cdot \cos(t) dt$

a) Determina los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de F .

b) Halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de F en el punto de abscisa $x = \pi$

MATEMÁTICAS II. 2022. RESERVA 2. EJERCICIO 3

R E S O L U C I Ó N

Vamos a calcular la integral $I = \int 2t \cdot \cos t dt$, que es una integral por partes.

$$\begin{aligned} u &= 2t; \quad du = 2 dt \\ dv &= \cos t dt; \quad v = \sin t \end{aligned}$$

$$I = \int 2t \cdot \cos t dt = 2t \sin t - 2 \int \sin t dt = 2t \sin t + 2 \cos t + C$$

La función que nos dan es: $F(x) = \int_0^x 2t \cdot \cos(t) dt = [2t \sin t + 2 \cos t]_0^x = 2x \sin x + 2 \cos x - 2$

Calculamos la primera

$$F'(x) = 2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x = 2x \cos x = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \\ \cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}; x = \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

	$\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$	$\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$	$\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$
Signo $F'(x)$	+	-	+
Función	C	D	C

Luego, la función es creciente en $\left(0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ y decreciente en $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$

Tiene un Máximo en $\left(\frac{\pi}{2}, \pi + 2\right)$ y un mínimo en $\left(\frac{3\pi}{2}, -\pi + 2\right)$.

b) La ecuación de la recta tangente es: $y - F(\pi) = F'(\pi) \cdot (x - \pi)$

Calculamos:

$$F(\pi) = 2\pi \sin \pi + 2 \cos \pi + 2 = -2 - 2 = -4$$

$$F'(\pi) = 2\pi \cos \pi = -2\pi$$

Luego, sustituyendo, tenemos que: $y + 4 = -2\pi \cdot (x - \pi) \Rightarrow y = -2\pi x + 2\pi^2 - 4$

Calcula $\int_0^1 x \cdot \arctg(x) dx$ (donde $\arctg$ denota la función arcotangente).

MATEMÁTICAS II. 2022. RESERVA 2. EJERCICIO 4

R E S O L U C I Ó N

Calculamos la integral indefinida por partes

$$u = \arctg x; \quad du = \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$dv = x \cdot dx; \quad v = \frac{x^2}{2}$$

$$\int x \arctg x \, dx = \frac{x^2}{2} \arctg x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx$$

Dividimos $\frac{x^2}{1+x^2}$ para descomponer la integral

$$\begin{aligned} \int x \arctg x \, dx &= \frac{x^2}{2} \arctg x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \frac{x^2}{2} \arctg x - \frac{1}{2} \left[\int 1 dx + \int \frac{-1}{1+x^2} dx \right] = \\ &= \frac{x^2}{2} \arctg x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \arctg x + C \end{aligned}$$

Calculamos la integral que nos pedían

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \arctg x \, dx &= \left[\frac{x^2}{2} \arctg x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \arctg x \right]_0^1 = \left(\frac{1}{2} \arctg 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \arctg 1 \right) - \left(\frac{1}{2} \arctg 0 \right) = \\ &= \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \right) - \left(\frac{1}{2} \arctg 0 \right) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Considera la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^3 - x$. Calcula el área total de los recintos limitados por la gráfica de la función f y la recta normal a dicha gráfica en el punto de abscisa $x = 0$.

MATEMÁTICAS II. 2022. RESERVA 3. EJERCICIO 3.

R E S O L U C I Ó N

La ecuación de la recta normal es: $y - f(0) = -\frac{1}{f'(0)} \cdot (x - 0)$.


$$f(0) = 0$$

$$f'(x) = 3x^2 - 1 \Rightarrow f'(0) = -1$$

Sustituyendo, tenemos: $y - f(0) = -\frac{1}{f'(0)} \cdot (x - 0) \Rightarrow y - 0 = -\frac{1}{-1} \cdot (x - 0) \Rightarrow y = x$

Calculamos los puntos de corte de la dos funciones

$$x^3 - x = x \Rightarrow x^3 - 2x = 0 \Rightarrow x(x^2 - 2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{2} \end{cases}$$



El área de la región pedida es:

$$A = 2 \int_0^{\sqrt{2}} (x - x^3 + x) dx = 2 \int_0^{\sqrt{2}} (-x^3 + 2x) dx = 2 \left[-\frac{x^4}{4} + x^2 \right]_0^{\sqrt{2}} = 2(-1 + 2) = 2$$

Calcula $\int_0^3 \frac{x}{\sqrt{1+x}} dx$.(Sugerencia: efectúa el cambio de variable $t = \sqrt{1+x}$).

MATEMÁTICAS II. 2022. RESERVA 3. EJERCICIO 4

R E S O L U C I Ó N

Como el cambio es $t = \sqrt{1+x}$, vamos a calcular cuanto vale dx :

$$dt = \frac{1}{2\sqrt{1+x}} dx = \frac{1}{2t} dx \Rightarrow dx = 2t dt$$

$$t = \sqrt{1+x} \Rightarrow t^2 = 1+x \Rightarrow x = t^2 - 1$$

Calculamos los nuevos límites de integración:

$$x=0 \Rightarrow t=1$$

$$x=3 \Rightarrow t=2$$

Sustituyendo, tenemos:

$$\int_1^2 \frac{(t^2-1)}{t} \cdot (2t dt) = 2 \int_1^2 (t^2-1) dt = 2 \left[\frac{t^3}{3} - t \right]_1^2 = 2 \left[\left(\frac{8}{3} - 2 \right) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right) \right] = 2 \left[\left(\frac{2}{3} \right) - \left(-\frac{2}{3} \right) \right] = \frac{8}{3}$$

Calcula $\int \frac{2x^3 + 2x^2 - 2x + 7}{x^2 + x - 2} dx$

MATEMÁTICAS II. 2022. RESERVA 4. EJERCICIO 3

R E S O L U C I Ó N

Dividimos los dos polinomios

$$\begin{array}{r} 2x^3 + 2x^2 - 2x + 7 \\ \hline x^2 + x - 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -2x^3 - 2x^2 + 4x \\ \hline 2x + 7 \end{array}$$

Con lo cual la integral se descompone en:

$$\int \frac{2x^3 + 2x^2 - 2x + 7}{x^2 + x - 2} dx = \int 2x dx + \int \frac{2x + 7}{x^2 + x - 2} dx = x^2 + \int \frac{2x + 7}{x^2 + x - 2} dx$$

Calculamos las raíces del denominador: $x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1 ; x = -2$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{2x + 7}{x^2 + x - 2} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 2} = \frac{A(x + 2) + B(x - 1)}{(x - 1) \cdot (x + 2)}$$

Como los denominadores son iguales, los numeradores también tienen que serlo. Para calcular A y B sustituimos los valores de las raíces en los dos numeradores.

$$x = 1 \Rightarrow 9 = 3A \Rightarrow A = 3$$

$$x = -2 \Rightarrow 3 = -3B \Rightarrow B = -1$$

Con lo cual:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^3 + 2x^2 - 2x + 7}{x^2 + x - 2} dx &= x^2 - 3x + \int \frac{2x + 7}{x^2 + x - 2} dx = x^2 + \int \frac{3}{x - 1} dx - \int \frac{1}{x + 2} dx = \\ &= x^2 + 3 \ln|x - 1| - \ln|x + 2| + C \end{aligned}$$


Considera las funciones $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por: $f(x) = x^2$ y $g(x) = a|x|$, con $a > 0$.
Determina el valor de a para que el área total de los recintos limitados por las gráficas de ambas funciones sea de 9 unidades cuadradas.

MATEMÁTICAS II. 2022. RESERVA 4. EJERCICIO 4

RESOLUCIÓN

a) La función $f(x) = x^2$ es una parábola cuyo vértice está en el punto $(0, 0)$.

La función $g(x) = a|x| = \begin{cases} ax & \text{si } x \geq 0 \\ -ax & \text{si } x < 0 \end{cases}$ son dos rectas.



Calculamos el punto de corte

$$x^2 = ax \Rightarrow x^2 - ax = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = a \end{cases}$$

$$x^2 = -ax \Rightarrow x^2 + ax = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -a \end{cases}$$

Como los recintos son simétricos, el área es:

$$A = 2 \cdot \int_0^a (ax - x^2) dx = 2 \cdot \left[\frac{ax^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^a = 2 \left(\frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{3} \right) = 2 \cdot \frac{a^3}{6} = 9 \Rightarrow a^3 = 27 \Rightarrow a = 3$$

Calcula $\int_3^8 \frac{1}{\sqrt{1+x}-1} dx$.(Sugerencia: efectúa el cambio $t = \sqrt{1+x}-1$)

MATEMÁTICAS II. 2022. JULIO. EJERCICIO 3

R E S O L U C I Ó N

Como el cambio es $\sqrt{1+x}-1=t$, vamos a calcular los nuevos límites de integración.

$$\text{Si } x=3 \Rightarrow \sqrt{1+3}-1=t \Rightarrow t=1$$

$$\text{Si } x=8 \Rightarrow \sqrt{1+8}-1=t \Rightarrow t=2$$

Vamos a calcular cuanto vale dx :

$$\sqrt{1+x}-1=t \Rightarrow \sqrt{1+x}=1+t \Rightarrow 1+x=(1+t)^2, \text{ con lo cual } dx=2 \cdot (1+t) \cdot dt$$

Sustituyendo, nos queda:

$$\begin{aligned} \int_3^8 \frac{1}{\sqrt{1+x}-1} dx &= \int_1^2 \frac{1}{t} \cdot 2 \cdot (1+t) \cdot dt = 2 \int_1^2 \frac{1+t}{t} dt = 2 \int_1^2 \left(1 + \frac{1}{t}\right) dt = \\ &= 2 \left[t + \ln|t| \right]_1^2 = 2 \cdot [(2 + \ln 2) - (1 + \ln 1)] = 2[1 + \ln 2] = 3'38 \end{aligned}$$

Considera las funciones $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = x^3 + 2$ y $g(x) = -x^2 + 2x + 2$

a) Calcula los puntos de corte de las gráficas de f y g . Esboza sus gráficas.

b) Determina el área del recinto limitado por las gráficas de f y g en el primer cuadrante.

MATEMÁTICAS II. 2022. JULIO. EJERCICIO 4


R E S O L U C I Ó N

a) Calculamos los puntos de corte de dichas funciones

$$x^3 + 2 = -x^2 + 2x + 2 \Rightarrow x^3 + x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x(x^2 + x - 2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \end{cases} \end{cases}$$

Luego, los puntos de corte son: $(0, 2)$; $(1, 3)$; $(-2, -6)$

Dibujamos las dos funciones:



b) Calculamos el área entre f y g en el primer cuadrante

$$A = \int_0^1 ((-x^2 + 2x + 2) - (x^3 + 2)) dx = \int_0^1 (-x^3 - x^2 + 2x) dx = \left[-\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + x^2 \right]_0^1 = \left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{3} + 1 \right) - (0) = \frac{5}{12} u^2$$