

1. Dada la función cuadrática $y = \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{3}{2}$:

- Halla su vértice y los puntos de corte con los ejes. **(1 punto)**
- Representa gráficamente la función. **(1 punto)**

Representa también, y en los mismos ejes de coordenadas que la función anterior, la función lineal $y = -\frac{3}{4}x$ **(1 punto)**

Halla los puntos de corte de ambas funciones. **(1 punto)**

2. Dada la función hiperbólica $y = \frac{4x - 3}{2x - 1}$:

- ¿A qué recta vertical se aproxima indefinidamente la gráfica de la función sin llegar a tocarla? ¿Hacia qué número tienden las imágenes de la función cuando x tiende a $+\infty$? Razona la respuesta. **(0,5 puntos)**
- Halla los puntos de corte con los ejes. **(0,5 puntos)**
- Representa gráficamente la función. **(0,5 puntos)**

3. Representa la siguiente función definida por trozos: **(1 punto)**

$$f(x) = \begin{cases} 2^x + 1 & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ \log_2 x + 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

4. Contesta a las siguientes cuestiones relacionadas con los logaritmos:

a) Sabiendo que $\ln x = 0,2345$ y que $\ln y = 0,3456$, calcula el valor de: $\ln \frac{x \cdot y^3}{\sqrt{y^3}}$ (dar el resultado exacto, con 5 cifras decimales). **(1 punto)**

b) Resuelve la siguiente ecuación logarítmica: $\frac{\log 2 + \log(11 - x^2)}{\log(5 - x)} = 2$ **(1 punto)**

5. Dadas las funciones $f(x) = \frac{2}{x - 3}$ y $g(x) = 2x + 3$, hallar:

a) $f \circ g$ **(0,5 puntos)**


b) $g \circ f$ **(0,5 puntos)**

c) Inversa de la función f , es decir, la función f^{-1} **(0,5 puntos)**

Soluciones

1. Vértice: $V(x, y): x = \frac{-b}{2a} = \frac{1}{2 \cdot (1/2)} = 1; y = f(1) = \frac{1}{2}1^2 - 1 - \frac{3}{2} = -2 \Rightarrow V(1, -2)$

El punto de corte con el eje Y es $(0, c) = \left(0, \frac{3}{2}\right)$. Para hallar los puntos de corte con el eje X resolvemos la ecuación $\frac{1}{2}x^2 - x - \frac{3}{2} = 0$. Sus soluciones son $x_1 = -1, x_2 = 3$. Así pues los puntos de corte con el eje X son: $(-1, 0)$ y $(3, 0)$. La representación gráfica de ambas funciones es:



Para hallar los puntos de corte resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{3}{2} \\ y = -\frac{3}{4}x \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{3}{2} = -\frac{3}{4}x \Rightarrow 2x^2 - 4x - 6 = -3x \Rightarrow 2x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{3}{2} \Rightarrow y_1 = -\frac{3}{4} \left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{8} \\ x_2 = 2 \Rightarrow y_2 = -\frac{3}{4} \cdot 2 = -\frac{3}{2} \end{cases}$$


Entonces los puntos donde se cortan las gráficas de ambas funciones son: $\left(-\frac{3}{2}, \frac{9}{8}\right)$ y $\left(2, -\frac{3}{2}\right)$

2. La gráfica de la función $y = \frac{4x - 3}{2x - 1}$ se aproxima indefinidamente a la recta vertical $x = \frac{1}{2}$, que es el punto que anula el denominador. Si hacemos x cada vez más grande y positivo se puede apreciar que las imágenes tienden hacia 2, es decir, que la gráfica de la función también se aproxima a la recta horizontal $y = 2$ sin llegar a tocarla.


Para hallar el punto de corte con el eje X hacemos $y = 0 \Rightarrow \frac{4x - 3}{2x - 1} = 0 \Leftrightarrow 4x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{4}$.
Para hallar el punto de corte con el eje Y hacemos $x = 0 \Leftrightarrow y = 3$.

Así, el punto de corte con el eje X es $\left(\frac{3}{4}, 0\right)$ y el punto de corte con el eje Y es $(0, 3)$.

La representación gráfica de la función es:



3. Representación gráfica de la función definida por trozos:



$$4. \quad a) \ln \frac{x \cdot y^3}{\sqrt{y^3}} = \ln(x \cdot y^3) - \ln(\sqrt{y^3}) = \ln x + \ln y^3 - \ln y^{3/2} = \ln x + 3 \ln y - \frac{3}{2} \ln y =$$

$$= 0,2345 + 3 \cdot 0,3456 - 1,5 \cdot 0,3456 = 0,7529$$

$$b) \frac{\log 2 + \log(11 - x^2)}{\log(5 - x)} = 2 \Leftrightarrow \log 2(11 - x^2) = 2 \log(5 - x) \Leftrightarrow \log(22 - 2x^2) = \log(5 - x)^2$$

$$\Leftrightarrow 22 - 2x^2 = 25 - 10x + x^2 \Leftrightarrow 3x^2 - 10x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 36}}{6} = \frac{10 \pm 8}{6} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{18}{6} = \frac{9}{3} = 3 \\ x_2 = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$5. \quad a) (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{2}{x-3}\right) = 2 \frac{2}{x-3} + 3 = \frac{4}{x-3} + 3 = \frac{4}{x-3} + \frac{3x-9}{x-3} = \frac{3x-5}{x-3}$$

$$b) (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x+3) = \frac{2}{2x+3-3} = \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}$$

$$c) y = \frac{2}{x-3}. \text{ Despejemos } x \text{ en funci3n de } y:$$

$$y(x-3) = 2 \Rightarrow xy - 3y = 2 \Rightarrow xy = 3y + 2 \Rightarrow x = \frac{3y+2}{y}$$

$$\text{Entonces la funci3n inversa de } f \text{ es } f^{-1}(x) = \frac{3x+2}{x}$$