

## REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN

**Observación:** La mayoría de los problemas resueltos a continuación se han propuesto en los exámenes de Selectividad.

---

1. Se considera la función  $f(x) = \frac{x^2 - 3}{x^2 - 4}$ . Se pide:

- Encontrar los intervalos donde esta función es creciente y donde es decreciente. (4 puntos)
- Calcular las asíntotas. (2 puntos)
- Hacer una gráfica de la función. (4 puntos)

**Solución:**

a) El dominio de esta función es  $\mathbf{R} - \{-2, 2\}$ .

Su derivada es:

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 - 4) - 2x(x^2 - 3)}{(x^2 - 4)^2} = \frac{-2x}{(x^2 - 4)^2}$$

La derivada se anula en  $x = 0$ . Como además no está definida en  $x = -2$  y en  $x = 2$ , hay que considerar los intervalos que indicamos a continuación:

- Si  $x < -2$ ,  $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$  crece.
- Si  $-2 < x < 0$ ,  $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$  crece.
- Si  $0 < x < 2$ ,  $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$  decrece. (En  $x = 0$  se tendrá un máximo relativo.)
- Si  $x > 2$ ,  $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$  decrece.

Nota: Podría observarse que la función es par.

b)  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 3}{x^2 - 4} = \infty \Rightarrow x = -2$  es una asíntota vertical.

- Si  $x \rightarrow -2^-$ ,  $f(x) \rightarrow +\infty$
- Si  $x \rightarrow -2^+$ ,  $f(x) \rightarrow -\infty$


$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3}{x^2 - 4} = \infty \Rightarrow x = 2$  es una asíntota vertical.

- Si  $x \rightarrow 2^-$ ,  $f(x) \rightarrow -\infty$
- Si  $x \rightarrow 2^+$ ,  $f(x) \rightarrow +\infty$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 3}{x^2 - 4} = 1 \Rightarrow y = 1$  es una asíntota horizontal.

(La recta va por debajo de la curva, pues  $x^2 - 3 > x^2 - 4$ .)

Su gráfica aproximada es la adjunta.



2. Representar gráficamente la función  $f(x) = x - 2\text{sen } x$  en el intervalo  $-\pi < x < \pi$ , determinando sus extremos (máximos y mínimos relativos).

**Solución:**

La función dada está definida en toda la recta real; y, por tanto en el intervalo  $(-\pi, \pi)$

Estudiamos su crecimiento y decrecimiento y sus máximos y mínimos:

$$f(x) = x - 2\text{sen } x \Rightarrow f'(x) = 1 - 2\cos x \Rightarrow f''(x) = 2\text{sen } x$$

$$f'(x) = 1 - 2\cos x = 0 \Rightarrow \cos x = 1/2 \Rightarrow x = -\pi/3, x = \pi/3$$

Como  $f''(-\pi/3) = 2 \text{sen}(-\pi/3) = -\sqrt{3} < 0 \Rightarrow$  en  $x = -\pi/3$  se tiene un máximo.

Como  $f''(\pi/3) = 2 \text{sen}(\pi/3) = \sqrt{3} > 0 \Rightarrow$  en  $x = \pi/3$  se tiene un mínimo.

Por otra parte:

si  $-\pi < x < -\pi/3, f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$  es creciente

si  $-\pi/3 < x < \pi/3, f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$  es decreciente

si  $\pi/3 < x < \pi, f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$  es creciente


Algunos valores de la función son:

x	$-\pi$	$-5\pi/3$	$-\pi/2$	$-\pi/3$	$-\pi/6$	0
f(x)	$-\pi$	$-5\pi/6 + 1$	$-\pi/2 + 2$	$-\pi/3 + \sqrt{3}$	$-\pi/6 + 1$	0

Como la función es impar:

x	0	$\pi/6$	$\pi/3$	$\pi/2$	$5\pi/3$	$\pi$
f(x)	0	$\pi/6 - 1$	$\pi/3 - \sqrt{3}$	$\pi/2 - 2$	$5\pi/6 - 1$	$\pi$

Su gráfica es:



3. Estudia y representa la función  $y = e^{-x^4}$ .

**Solución:**

- La función está definida para todo número real.
- Su recorrido es positivo:  $e^{-x^4} > 0$ .
- Es una función par:  $e^{-(-x)^4} = e^{-x^4}$
- Tiene una asíntota horizontal:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{-x^4} = 0^+$
- Crecimiento y decrecimiento:  
 $y = e^{-x^4} \Rightarrow y' = -4x^3 e^{-x^4} \rightarrow$  se anula en  $x = 0$

Si  $x < 0$ ,  $y' > 0 \Rightarrow$  la función crece.

Si  $x > 0$ ,  $y' < 0 \Rightarrow$  la función decrece  $\Rightarrow$  En  $x = 0$  hay un máximo.

- Concavidad y convexidad:

$$y' = -4x^3 e^{-x^4} \Rightarrow y'' = -12x^2 e^{-x^4} + 16x^6 e^{-x^4} = 4x^2 e^{-x^4} (-3 + 4x^4) \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{se anula en } x = \sqrt[4]{3/4} \approx \pm 0,93 \text{ y en } x = 0$$

Si  $x < -\sqrt[4]{3/4}$ ,  $y'' > 0 \Rightarrow$  la función convexa ( $\cup$ ).


Si  $-\sqrt[4]{3/4} < x < 0$ ,  $y'' < 0 \Rightarrow$  la función cóncava ( $\cap$ ).

Por la simetría: si  $0 < x < \sqrt[4]{3/4}$  la función es cóncava y si  $x > \sqrt[4]{3/4}$  será convexa.

Pueden darse algunos valores:

$$(-1, 1/e) \approx (1, 0,37), (-0,5, 0,94), (0, 1); (0,5, 0,94), (1, 0,37)$$

Se obtiene la gráfica:



4. Se considera la curva definida por la función:  $y = \frac{x^3}{x^2 + 1}$ . Se pide:

1. Dominio de definición, cortes con los ejes y simetrías.
2. Asíntotas.
3. Intervalos de crecimiento de la función. ¿Tiene extremos la función?
4. Representación aproximada de la curva.

5. ¿Cuál será la gráfica de la curva  $y = \frac{x^3}{x^2 + 1} + 1$ ?

### Solución:

1. La función está definida siempre, pues el denominador no se anula en ningún caso.

Corte ejes:

$$\text{si } x = 0 \Rightarrow y = 0 \rightarrow \text{punto } (0, 0)$$

$$\text{si } y = 0 \Rightarrow x = 0 \rightarrow \text{se obtiene el mismo punto.}$$

La función es simétrica respecto del origen de coordenadas (impar), pues

$$f(-x) = \frac{(-x)^3}{(-x)^2 + 1} = -\frac{x^3}{x^2 + 1} = -f(x)$$

2. Tiene una asíntota oblicua ( $y = mx + n$ ), pues:

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x(x^2 + 1)} = 1 \quad \text{y}$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^3}{x^2 + 1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{x^2 + 1} = 0$$

La asíntota es la recta  $y = x$ .

$$\text{Como } y = \frac{x^3}{x^2 + 1} = \frac{x^3 + x - x}{x^2 + 1} = x - \frac{x}{x^2 + 1},$$

cuando  $x \rightarrow +\infty$ , la curva va por debajo de la asíntota ( $-\frac{x}{x^2 + 1}$  resta)

cuando  $x \rightarrow -\infty$ , la curva va por encima de la asíntota ( $-\frac{x}{x^2 + 1}$  suma)

3. Derivamos:  $y' = \frac{3x^2(x^2 + 1) - (x^3 \cdot 2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^2(x^2 + 3)}{(x^2 + 1)^2}$ .


Salvo en  $x = 0$ , la derivada siempre es positiva  $\Rightarrow$  la función es creciente siempre. En consecuencia no tiene extremos. En  $x = 0$  hay un punto de inflexión con tangente horizontal.

4. Algunos valores de la curva son:  $(0, 0)$ ,  $(1, \frac{1}{2})$ ,  $(2, \frac{8}{5})$ ,  $(3, \frac{27}{10})$ , y sus simétricos.

Representándolos se obtiene la gráfica siguiente.

5. La gráfica de  $y = \frac{x^3}{x^2 + 1} + 1$  se obtiene trasladando

una unidad hacia arriba la curva anterior. (En la figura se dibuja de color rojo.)



5. Estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función

$$f(x) = x^4 e^{-x}.$$

Como consecuencia calcular los máximos y mínimos locales de  $f$  y representar su gráfica.

**Solución:**

Hacemos la derivada:

$$f(x) = x^4 e^{-x} \Rightarrow f'(x) = 4x^3 e^{-x} - x^4 e^{-x} = x^3 e^{-x} (4 - x)$$

La derivada se anula cuando  $x = 0$  y  $x = 4$ , por tanto debemos estudiar lo que pasa en los intervalos:  $x < 0$ ;  $0 < x < 4$ ;  $x > 4$ .

- si  $x < 0$ ,  $f'(x) < 0 \Rightarrow f$  es decreciente;
- si  $0 < x < 4$ ,  $f'(x) > 0 \Rightarrow f$  es creciente;
- si  $x > 4$ ,  $f'(x) < 0 \Rightarrow f$  es decreciente;

Como la derivada se anula en  $x = 0$ , es decreciente si  $x < 0$  y creciente cuando  $x > 0$ , en  $x = 0$  la función tiene un mínimo. De manera análoga concluimos que en  $x = 4$  se da un máximo.

Para trazar su gráfica, además de lo dicho, puede observarse que:

- La función siempre toma valores mayores o iguales que 0, pues tanto  $x^4$  como  $e^{-x}$  nunca toman valores negativos.
- La función tiene una asíntota horizontal hacia más infinito (la recta  $y = 0$ ), pues


$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2 - 1} = \infty$$

- Algunos puntos de la gráfica son:

$$(-1, e); (0, 0), \text{ el mínimo}; (1, 1/e) = (1, 0,37); (2, 16/e^2) = (2, 2,2);$$

$$(4, 256/e^4) = (4, 4,7), \text{ máximo}; (8, 1,4)$$

Así se obtiene la gráfica siguiente:



6. Determinar el dominio de definición de la función  $f(x) = x - \ln(x^2 - 1)$  y representar su gráfica, calculando los intervalos de crecimiento y los extremos (máximos y mínimos relativos).

**Solución:**

Dominio:  $\mathbf{R} - [-1, 1]$ .

En  $x = -1$  y en  $x = 1$  la función tiene sendas asíntotas verticales.

$$f'(x) = 1 - \frac{2x}{x^2 - 1} \Rightarrow f'(x) = 0 \text{ si } x^2 - 2x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 + \sqrt{2}$$

Si  $x < -1$ ,  $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$  crece.


Si  $-1 < x < 1 + \sqrt{2}$ ,  $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$  decrece.

Si  $1 + \sqrt{2} < x$ ,  $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$  crece. (En  $x = 1 + \sqrt{2}$  habrá un mínimo.)

$$f''(x) = \frac{2x^2 + 2}{(x^2 - 1)^2} > 0 \text{ para todo punto de su dominio. La función es cóncava } (\cup) \text{ en todo su$$

dominio.


Su gráfica es la siguiente:



**Observación.** Aprovechando los cálculos anteriores, comprueba que la gráfica de la función

$$f(x) = x - \ln(x^2 + 1)$$

es la adjunta



7. Dada la curva  $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$  se pide:

- Dominio de definición de la función y puntos de corte con los ejes, si los hay.
- Asíntotas, si las hay.
- Intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- Máximos y mínimos, si los hay.
- Una representación aproximada de la misma.

**Solución:**

Como el denominador no se anula para ningún valor de  $x$ , el dominio de definición es todo  $\mathbf{R}$ .  
Corte con los ejes:

$$\text{Si } x = 0 \Rightarrow y = -1. \text{ Punto } (0, -1).$$

$$\text{Si } y = 0 \Rightarrow x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = -1, x = 1. \text{ Puntos } (-1, 0) \text{ y } (1, 0).$$

b) No hay asíntotas verticales: la función nunca de va al infinito.

Como  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 1 \Rightarrow$  la recta  $y = 1$  es asíntota horizontal de la curva, tanto hacia  $+\infty$  como hacia  $-\infty$ .

c) Derivando:

$$y' = \frac{2x(x^2 + 1) - (x^2 - 1)2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$$


- Si  $x = 0$ ,  $y' = 0 \Rightarrow$  en  $x = 0$  puede haber máximo o mínimo.
- Si  $x < 0$ ,  $y' < 0 \Rightarrow$  la función es decreciente.
- Si  $x > 0$ ,  $y' > 0 \Rightarrow$  la función es creciente.

d) Como la función decrece a la izquierda de  $x = 0$  y crece a su derecha, en  $x = 0$  hay un punto mínimo.

También puede comprobarse viendo que  $y''(0) > 0$ .

$$\text{El efecto, como } y'' = \frac{4(x^2 + 1)^2 - 4x \cdot 2(x^2 + 1)2x}{(x^2 + 1)^4} = \frac{4 - 4x^2}{(x^2 + 1)^3} \Rightarrow y''(0) = 4 > 0.$$

e) Además de la información obtenida puede verse que la curva es simétrica respecto del eje OY; si calculamos algunos valores más, como  $(-3, 8/10)$ ,  $(-2, 3/5)$ ;  $(2, 3/5)$ ,  $(3, 8/10)$ , puede dibujarse la gráfica siguiente.



8. Se considera la función  $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1}$ . Describir el dominio de definición, los intervalos de crecimiento y los extremos de  $f$ .  
Trazar un esquema de su gráfica.

**Solución:**

La función está definida para todo número real distinto de  $\pm 1$ :  $\text{Dom}(f) = \mathbf{R} - \{-1, 1\}$

- Crecimiento:

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1} \Rightarrow f'(x) = \frac{2x(x^2 - 1) - x^2 \cdot 2x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-2x}{(x^2 - 1)^2}$$

La derivada se anula cuando  $x = 0$ , por tanto debemos estudiar lo que pasa en los intervalos:  $x < -1$ ;  $-1 < x < 0$ ;  $0 < x < 1$ ;  $x > 1$

- si  $x < -1$ ,  $f'(x) > 0 \Rightarrow f$  es creciente;
- si  $-1 < x < 0$ ,  $f'(x) > 0 \Rightarrow f$  es creciente;
- si  $0 < x < 1$ ,  $f'(x) < 0 \Rightarrow f$  es decreciente;
- si  $x > 1$ ,  $f'(x) < 0 \Rightarrow f$  es decreciente;

Como la derivada se anula en  $x = 0$ , es creciente si  $x < 0$  y decreciente cuando  $x > 0$ , en  $x = 0$  la función tiene un máximo.


Para trazar su gráfica, además de lo dicho, puede observarse que:

- La función tiene dos asíntotas verticales,  $x = -1$  y  $x = 1$ , y otra horizontal,  $y = 1$ .  
En efecto:

$$\lim_{x \rightarrow \pm 1} \frac{x^2}{x^2 - 1} = \infty; \quad \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{x^2}{x^2 - 1} = 1$$

- Algunos puntos de la gráfica son:  
 $(-2, 4/3)$ ;  $(-1/2, -1/3)$ ;  
 $(0, 0)$ : máximo;  
 $(1/2, -1/3)$ ;  $(2, 4/3)$

Así se obtiene la gráfica adjunta





9. a) Dibujar la gráfica de la función  $f(x) = \frac{2x}{x+1}$  indicando su dominio, intervalos de crecimiento y decrecimiento y asíntotas.

b) Demostrar que la sucesión  $a_n = \frac{2n}{n+1}$  es monótona creciente.

c) Calcular  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2(a_{n+1} - a_n)$

**Solución:**

a)  $\text{Dom}(f) = \mathbf{R} - \{-1\}$ .

Asíntotas:

Tiene una asíntota vertical, la recta  $x = -1$ , pues  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x}{x+1} = \infty$ .

Cuando  $x \rightarrow -1^-$ ,  $f(x) \rightarrow +\infty$ .

Cuando  $x \rightarrow -1^+$ ,  $f(x) \rightarrow -\infty$ .

La recta  $y = 2$  es una asíntota horizontal, pues  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x+1} = 2$ .

Cuando  $x \rightarrow -\infty$ ,  $f(x) \rightarrow 2^+$  (la curva va por encima de la asíntota.)


Cuando  $x \rightarrow +\infty$ ,  $f(x) \rightarrow 2^-$  (la curva va por debajo de la asíntota.)

Crecimiento:

$$f'(x) = \frac{2(x+1) - 2x}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$$

Como la derivada es positiva para todo  $x$  de su dominio, la curva es siempre creciente.

Su gráfica es la siguiente.



b) Una sucesión es monótona creciente cuando  $a_{n+1} - a_n > 0$ , para todo  $n$ .

En este caso:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2(n+1)}{(n+1)+1} - \frac{2n}{n+1} = \frac{(2n+2)(n+1) - 2n(n+2)}{(n+2)(n+1)} = \frac{2}{(n+2)(n+1)},$$

que, efectivamente, es positivo para todo  $n$ .

$$c) \lim_{n \rightarrow \infty} n^2(a_{n+1} - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( n^2 \cdot \frac{2}{(n+2)(n+1)} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^2 + 3n + 2} = 2$$

**10.** Encontrar razonadamente el punto de la curva  $y = \frac{1}{1+x^2}$  en el que la recta tangente a la curva tiene pendiente máxima y calcular el valor de esta pendiente. (3,3 puntos).

**Solución:**

El punto en el que la curva tiene recta tangente con pendiente máxima (o mínima) es un punto de inflexión de la curva.

(En efecto: la pendiente de la recta tangente a  $f(x)$  en un punto genérico  $x$  viene dada por el valor de  $f'(x)$ ; para evitar confusiones escribiremos  $g(x) = f'(x)$ . El máximo de  $g(x)$  se obtiene en las soluciones de la ecuación  $g'(x) = 0$  que hacen negativa a la función  $g''(x)$ . Por tanto en las soluciones de  $g'(x) = f''(x) = 0$ , que dan los posibles puntos de inflexión de  $f(x)$ .)

Calculamos las tres primeras derivadas de la función:

$$y = \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow y' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2} \Rightarrow y'' = \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3} \Rightarrow y''' = \frac{24x-24x^3}{(1+x^2)^4}$$

La derivada segunda se anula en  $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$  y en  $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$

Como  $y'''(-1/\sqrt{3}) < 0$  y  $y'''(1/\sqrt{3}) > 0$  la curva tiene recta tangente con pendiente máxima en el punto  $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ .

El valor de esa pendiente es  $y'(-1/\sqrt{3}) = \frac{2/\sqrt{3}}{(1+1/3)^2} = \frac{9}{8\sqrt{3}}$

11. Sea  $f$  la función dada por  $f(x) = x^2 - 3|x| + 2$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

- Estúdiase la derivabilidad de  $f$  en  $x = 0$  mediante la definición de derivada.
- Determinense los intervalos de monotonía de  $f$  y sus extremos relativos
- Esbócese la gráfica de  $f$ .

**Solución:**

a) Como  $|x| = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$ , la función dada puede definirse así:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x + 2, & x < 0 \\ x^2 - 3x + 2, & x \geq 0 \end{cases}$$

Esta función está definida siempre y es continua para todo valor de  $x$ , incluido el 0, pues tanto por la izquierda como por la derecha de  $x = 0$ ,  $f(x) \rightarrow 2$ .

Para ver la derivabilidad en  $x = 0$  estudiamos las derivadas laterales.

Por la izquierda:

$$f'(0^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2 + 3h + 2 - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h(h+3)}{h} = 3$$

Por la derecha:

$$f'(0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2 - 3h + 2 - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h(h-3)}{h} = -3$$

Como las derivadas laterales no coinciden, la función no es derivable en  $x = 0$ .


b) Salvo en  $x = 0$ , la derivada de la función es:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + 3, & x < 0 \\ 2x - 3, & x > 0 \end{cases}$$

Esta derivada se anula en los puntos  $x = -3/2$  y  $x = 3/2$ , por tanto se tiene:

- si  $x < -3/2$ ,  $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$  es decreciente
- si  $-3/2 < x < 0$ ,  $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$  es creciente  
La función tiene un mínimo en  $x = -3/2$
- si  $0 < x < 3/2$ ,  $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$  es decreciente. (La función tiene un máximo en  $x = 0$ )
- si  $x > 3/2$ ,  $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$  es creciente  
La función tiene un mínimo en  $x = 3/2$

c) La gráfica de la función viene dada por dos trozos de parábolas,  $f(x) = x^2 + 3x + 2$  hasta  $x = 0$  y  $f(x) = x^2 - 3x + 2$ , desde  $x = 0$ . Se obtiene la siguiente figura.



12. Dibujar la gráfica de la función

$$f(x) = \frac{|x|}{2-x}$$

indicando su dominio, intervalos de crecimiento y decrecimiento y asíntotas.

**Solución:**

La función puede definirse a trozos así:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-x}{2-x}, & x < 0 \\ \frac{x}{2-x}, & x \geq 0 - \{2\} \end{cases}$$

Por tanto,  $\text{Dom}(f) = \mathbf{R} - \{2\}$ .

En el punto  $x = 2$  la curva tiene una asíntota vertical, pues  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{2-x} = \infty$ .

Cuando  $x \rightarrow 2^-$ ,  $f(x) \rightarrow +\infty$ .

Cuando  $x \rightarrow 2^+$ ,  $f(x) \rightarrow -\infty$ .

Por otra parte, las rectas  $y = 1$  e  $y = -1$  son asíntotas horizontales de la función. La primera,  $y = 1$ , hacia  $-\infty$ ; la segunda,  $y = -1$ , hacia  $+\infty$ .

En efecto:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{2-x} = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2-x} = -1$$

Cuando  $x \rightarrow -\infty$ ,  $f(x) \rightarrow 1^-$  (la curva va por debajo de la asíntota.)

Cuando  $x \rightarrow +\infty$ ,  $f(x) \rightarrow -1^-$  (la curva va por debajo de la asíntota.)

Crecimiento y decrecimiento:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-2}{(2-x)^2}, & x < 0 \\ \frac{2}{(2-x)^2}, & x > 0 - \{2\} \end{cases}$$

Como puede verse fácilmente, la función tampoco es derivable en  $x = 0$ , pues por la izquierda su derivada es negativa (tiende a  $-1/2$ ) y por la derecha es positiva (tiende a  $1/2$ ).

También es inmediato ver que:

si  $x < 0$ ,  $f'(x) < 0 \Rightarrow$  la función es decreciente;

si  $x > 0$ ,  $f'(x) > 0 \Rightarrow$  la función es creciente.

Con la información obtenida y dando algunos valores podemos dibujar la gráfica.

Valores:  $(-2, 1/2)$ ;  $(-1, 1/3)$ ;  $(0, 0)$ ;  $(1, 1)$ ;  $(1,5, 3)$ ;  $(2,5, -5)$ ;  $(3, -3)$ ;  $(4, -2)$ ;  $(6, -3/2)$

La gráfica pedida es la adjunta.

