

REGLA DE L'HÔPITAL PARA EL CÁLCULO DE LÍMITES

Observación: La mayoría de los problemas resueltos a continuación se han propuesto en los exámenes de Selectividad.

1. Dada la función:

$$f(x) = \frac{x^5 - x^8}{1 - x^6}$$

- a) (1 punto) Encontrar los puntos de discontinuidad de f . Determinar razonadamente si alguna de las discontinuidades es evitable.
 b) (1 puntos) Estudiar si f tiene alguna asíntota vertical.

Solución:

a) La función es discontinua cuando $1 - x^6 = 0 \Rightarrow x = -1$ o $x = 1$.

La discontinuidad puede evitarse si existe límite.

En $x = -1$ la discontinuidad no puede evitarse pues la función no tiene límite en ese punto:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^5 - x^8}{1 - x^6} = \left[\frac{-2}{0} \right] = \infty$$

En $x = 1$, como $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^5 - x^8}{1 - x^6} = \left[\frac{0}{0} \right] \stackrel{(L'H)}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{5x^4 - 8x^7}{-6x^5} = \frac{5-8}{-6} = \frac{1}{2}$, la discontinuidad puede

evitarse, definiendo $f(1) = \frac{1}{2}$

b) La recta $x = -1$ es asíntota vertical de la función pues $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^5 - x^8}{1 - x^6} = \infty$. Además, puede observarse que si $x \rightarrow -1^{-1}$, $f(x) \rightarrow +\infty$; y si $x \rightarrow -1^{+1}$, $f(x) \rightarrow -\infty$.

c)

2. Calcular los siguientes límites:

a) (1,5 puntos) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x})$

b) (1,5 puntos) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\arctg(e^x) - \frac{\pi}{2} \right]$

Solución:

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x}) &= [\infty - \infty] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x})(\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 - x})}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 - x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x - x^2 + x}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 - x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 - x}} = (\text{dividiendo por } x) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } \lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\operatorname{arctg}(e^x) - \frac{\pi}{2} \right] &= [\infty \cdot (\pi/2 - \pi/2)] = [\infty \cdot 0] = \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left[\operatorname{arctg}(e^x) - \frac{\pi}{2} \right]}{\frac{1}{x}} = \left[\frac{0}{0} \right] = (L'H) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{e^x}{1+e^{2x}}}{-\frac{1}{x^2}} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2 e^x}{1+e^{2x}} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = (L'H) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2xe^x - x^2 e^x}{2e^{2x}} = (\text{dividiendo por } e^x) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x - x^2}{2e^x} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = (L'H) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2 - 2x}{2e^x} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = (L'H) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2}{2e^x} = 0
 \end{aligned}$$

3. Calcular: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + x^2}{2x^2}$

Solución:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + x^2}{2x^2} = \left[\frac{0}{0} \right] = (\text{por L'Hôpital}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x + 2x}{4x} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x + 2}{4} = \frac{3}{4}$$

4. Sea la función

$$f(x) = \frac{4x + \operatorname{sen} 2x}{\operatorname{sen} 3x}$$

Determinar el dominio de f (1 punto) e indicar si f tiene límite finito en algún punto que no sea de su dominio. (1,5 puntos)

Solución:

La función no está definida cuando $\operatorname{sen} 3x = 0 \Rightarrow 3x = k\pi \Rightarrow x = k\pi/3$.

Por tanto, $\operatorname{Dom}(f) = \mathbf{R} - \{k\pi/3, k \in \mathbf{Z}\}$

Es posible que tenga límite finito en $x = 0$, único punto donde también se anula el numerador. Veamos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x + \operatorname{sen} 2x}{\operatorname{sen} 3x} = \left[\frac{0}{0} \right] = (L'H) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 + 2 \cos 2x}{3 \cos 3x} = \frac{6}{3} = 2$$

En el punto $x = 0$ la función tiene límite finito, y vale 2.

5. Calcúlese $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln(x)}{e^x}$.

Solución:

Lo haremos aplicando la regla de L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln(x)}{e^x} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = (L'H) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x) + 1}{e^x} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = (L'H) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{e^x} = \left[\frac{0}{\infty} \right] = 0$$

6. Calcúlese el valor de $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\operatorname{tg}(2x)}{\operatorname{tg}(6x)}$.

Solución:

Lo calcularemos aplicando la regla de L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\operatorname{tg}(2x)}{\operatorname{tg}(6x)} = \left[\frac{0}{0} \right] = (L'H) = \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{(1 + \operatorname{tg}^2(2x)) \cdot 2}{(1 + \operatorname{tg}^2(6x)) \cdot 6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

7. Calcula el límite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \operatorname{sen} x}{1 - \cos x}$

Solución:

El siguiente límite lo haremos aplicando la regla de L'Hôpital.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \operatorname{sen} x}{1 - \cos x} &= \left[\frac{0}{0} \right] = (L'H) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x + x \cos x}{\operatorname{sen} x} = \left[\frac{0}{0} \right] = \\ &= (L'H) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x + \cos x - x \operatorname{sen} x}{\cos x} = \frac{2}{1} = 2 \end{aligned}$$

8. Calcúlese el valor de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos(2x))}{x^2}$.

Solución:

Lo haremos aplicando la regla de L'Hôpital.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos(2x))}{x^2} &= \left[\frac{0}{0} \right] = (L'H) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-2 \operatorname{sen}(2x)}{\cos(2x)}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \operatorname{tag}(2x)}{2x} = \left[\frac{0}{0} \right] = \\ &= (L'H) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2(1 + \operatorname{tag}^2(2x)) \cdot 2}{2} = \frac{-4}{2} = -2 \end{aligned}$$

9. Calcúlense los valores de $\lambda \neq 0$ para los cuales $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x^2)}{\cos^2(\lambda x) - 1} = -1$.

Solución:

Lo calcularemos aplicando la regla de L'Hôpital.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x^2)}{\cos^2(\lambda x) - 1} &= \left[\frac{0}{0} \right] = (L'H) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cos(x^2)}{-2\lambda \cos(\lambda x)(\text{sen } \lambda x)} = \left[\frac{0}{0} \right] = (L'H) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos(x^2) - 4x \text{sen}(x^2)}{-2\lambda(-\lambda \text{sen}^2(\lambda x) + \lambda \cos^2(\lambda x))} = \frac{2}{-2\lambda^2} \end{aligned}$$

Como el límite debe valer -1 se tendrá:

$$\frac{2}{-2\lambda^2} = -1 \Rightarrow \lambda = \pm 1$$

10. Halla los puntos de discontinuidad de la función $y = \frac{\text{tg}(x)}{x}$

Nota: x está expresado en radianes.

Solución:

La función es discontinua los puntos en los que no esté definida, que son: $x = 0$ y $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.

En $x = 0$ la discontinuidad es evitable, pues $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg}(x)}{x} = 1$.

$$\text{En efecto: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg}(x)}{x} = \left[\frac{0}{0} \right] = (L'H) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \text{tg}^2(x)}{1} = 1$$

En $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$, porque la $\text{tg}(x)$ no está definida. En todos esos puntos la discontinuidad no puede evitarse.

11. Calcular el límite: $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$.

Solución:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) = [\infty - \infty] = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x} \right) = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Aplicando L'Hôpital, se tiene:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\ln x}{\ln x + (x-1)/x} \right) = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \right) = \frac{1}{2}$$

12. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right)$.

Solución:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right) = [\infty - \infty] = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} \right) = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Aplicando L'Hôpital, se tiene:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} \right) = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \frac{1}{1+x}}{\ln(1+x) + \frac{x}{1+x}} \right) = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{1}{(1+x)^2}}{\frac{1}{1+x} + \frac{1+x-x}{(1+x)^2}} \right) = \frac{1}{2}$$

13. Calcula $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \ln x$

Solución:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \ln x = [\infty \cdot 0] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \left[\frac{0}{0} \right] = (L'H) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1/x}{1} = 1$$

14. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{4/x}$.

Solución:

Aplicaremos logaritmos y la regla de L'Hôpital (L'H).

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{4/x} = [1^\infty]$$

$$\ln(\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{4/x}) = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+2x)^{4/x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{x} \ln(1+2x) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \ln(1+2x)}{x} = \left[\frac{0}{0} \right] = (L'H) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8}{1+2x} = 8$$

De donde,

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{4/x} = e^8$$

15. Se considera la función $f(x) = x \ln|x|$ si $x \neq 0$.

- a) ¿Qué valor hay que asignar a 0 para que la función sea continua?
 b) ¿La función obtenida es derivable en $x = 0$?

Solución:

a) Será continua cuando $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} x \ln|x|$

Este límite indeterminado se resuelve por L'Hôpital.

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} x \ln|x| = [0 \cdot \infty] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{(-1/x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

La función continua es: $f(x) = \begin{cases} x \ln|x|, & \text{si } x \neq 0 \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}$

b) La función puede definirse a trozos así:

$$f(x) = \begin{cases} x \ln(-x) & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ x \ln x & x > 0 \end{cases} \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} \ln(-x) + 1 & x < 0 \\ ? & x = 0 \\ \ln x + 1 & x > 0 \end{cases}$$

Cuando $x \rightarrow 0$ la función derivada, tanto por la izquierda como por la derecha, tiende a $-\infty$. En consecuencia, no es derivable en ese punto.

Por tanto, la función derivada es $f'(x) = \ln|x| + 1$ si $x \neq 0$

16. Calcula el límite: $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/\sin^2 x}$

Solución:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/\sin^2 x} = [1^\infty].$$

Aplicaremos logaritmos y la regla de L'Hôpital.

$$\ln\left(\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/\sin^2 x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\ln(\cos x)^{1/\sin^2 x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin^2 x} \ln(\cos x) = [\infty \cdot 0]$$

La última indeterminación se transforma en.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{\sin^2 x} = \left[\frac{0}{0}\right] \Rightarrow (\text{aplicando L'H}) \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-\sin x}{\cos x}}{2 \sin x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{2 \cos^2 x} = \frac{-1}{2}$$

El límite pedido vale: $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/\sin^2 x} = e^{-1/2}$

17. Calcular: $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x + \operatorname{sen} x)^{1/x}$

Solución:

Es una forma indeterminada: $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x + \operatorname{sen} x)^{1/x} = [1^\infty]$

Aplicando logaritmos se tiene:

$$\begin{aligned} \ln \left(\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x + \operatorname{sen} x)^{1/x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left((\cos x + \operatorname{sen} x)^{1/x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(\cos x + \operatorname{sen} x) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x + \operatorname{sen} x)}{x} = \left[\frac{0}{0} \right] = (\text{aplicando L'Hôpital}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{sen} x + \cos x}{1} = 1 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x + \operatorname{sen} x)^{1/x} = e^1 = e$$

18. Determina, si es posible, los valores del parámetro $k \in \mathbf{R}$ para que la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+1-e^x}{2x+1-e^{2x}} & \text{si } x < 0 \\ (2x-k)^2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}, \text{ sea continua en } x = 0.$$

Solución:

Para que la función sea continua en $x = 0$ es necesario que los límites laterales en ese punto coincidan con $f(0)$, cuyo valor es k^2 .

$$\text{Por la derecha, } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2x-k)^2 = (-k)^2 = k^2$$

Por la izquierda se tiene un límite indeterminado que hay que resolver con ayuda de la regla de L'Hôpital.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x+1-e^x}{2x+1-e^{2x}} = \left[\frac{0}{0} \right] = (\text{L'H}) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1-e^x}{2-2e^{2x}} = \left[\frac{0}{0} \right] = (\text{L'H}) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-e^x}{-4e^{2x}} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\text{Por tanto, debe cumplirse que } k^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow k = \pm \frac{1}{2}$$

19. a). Continuidad lateral de una función en un punto.

b) Analice la continuidad, en el punto $x = 0$, de la función dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2^x - 1}{x} & \text{si } x < 0 \\ \frac{\cos x}{x^2 + 1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Solución:

a) Una función $f(x)$ es continua en el punto $x = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Las continuidades laterales se definen así:

- $f(x)$ es continua en el punto $x = a$ por la izquierda $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a^-)$
- $f(x)$ es continua en el punto $x = a$ por la derecha $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a^+)$

Para que una función sea continua en $x = a$ es necesario que los límites laterales existan y sean iguales.

b) Por la izquierda:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2^x - 1}{x} = \left[\frac{0}{0} \right] = (\text{aplicando la regla de L'Hôpital}) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2^x \ln 2}{1} = \ln 2 \end{aligned}$$

Por la derecha:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos(x)}{x^2 + 1} = \frac{1}{1} = 1$$

Como esos límites no coinciden, la función no es continua en $x = 0$.

20. Calcula:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - \cos x}{\operatorname{sen}^2 x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$$

Solución:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - \cos x}{\operatorname{sen}^2 x} = \left[\frac{0}{0} \right] = (\text{aplicando L'Hôpital}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 + \operatorname{sen} x}{2 \operatorname{sen} x \cos x} = \left[\frac{0}{0} \right] = (\text{L'H}) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \cos x}{2 \cos x \cos x - 2 \operatorname{sen} x \operatorname{sen} x} = \frac{2}{2} = 1$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x = [1^\infty] = (\text{Transformamos}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x/2}\right)^{(x/2) \cdot 2} = e^2$$

También se puede hacer aplicando logaritmos y la regla de L'Hôpital. Así:

$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{2}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{2}{x}\right)}{1/x} = \left[\frac{0}{0} \right] =$$

$$= (\text{L'H}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x+2} = 2.$$

$$\text{Por tanto: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x = e^2$$

21. Buscad los extremos relativos de la función $f(x) = \frac{(x+1)^2}{e^x}$ (4 puntos). Calculad $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (2 puntos). Haced una gráfica aproximada de esta función (4 puntos).

Solución:

La derivada es:

$$f'(x) = \frac{2(x+1)e^x - (x+1)^2 e^x}{e^{2x}} = \frac{e^x(1-x^2)}{e^{2x}}$$

La derivada se anula en $x = \pm 1$.


- Si $x < -1$, $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$ decrece.
- Si $-1 < x < 1$, $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ crece. Por tanto en $x = -1$ hay un mínimo relativo.
- Si $x > 1$, $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$ decrece. Por tanto, en $x = 1$ hay un máximo relativo.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x+1)^2}{e^x} = \left[\frac{\infty}{0} \right] = +\infty$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)^2}{e^x} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = (L'H) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(x+1)}{e^x} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} = 0^+ \Rightarrow y = 0$ es una asíntota horizontal de la curva.

Algunos valores de la curva son: $(-2, e^2)$; $(-1, 0)$; $(0, 1)$; $(1, 4/e)$; $(2, 9/e^2)$; $(3, 16/e^3)$;

Su gráfica aproximada es:



22. Calcula, si existen, los siguientes límites:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\operatorname{sen}(x))^{tg(x)}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{|x|}; \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} \quad (\text{con } a > 0)$$

Solución:

En los tres casos se trata de formas indeterminadas.

- Para hacer $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\operatorname{sen}(x))^{tg(x)} = [0^0]$ aplicamos límites

$$\begin{aligned} \ln\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} (\operatorname{sen}(x))^{tg(x)}\right) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(\operatorname{sen}(x))^{tg(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} tgx \ln(\operatorname{sen}(x)) = [0 \cdot \infty] = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\operatorname{sen}(x))}{\frac{1}{\operatorname{sen}x}} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = (\text{aplicando L'Hôpital}) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\cos x}{\operatorname{sen}x}}{-\operatorname{sen}^2 x - \cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{\operatorname{sen}^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\operatorname{sen}x}{2 \operatorname{sen}x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{2 \cos x} = 0 \end{aligned}$$

Por tanto, $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\operatorname{sen}(x))^{tg(x)} = e^0 = 1$

- La función $f(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{|x|} = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen}(x)}{-x}, & x < 0 \\ \frac{\operatorname{sen}(x)}{x}, & x > 0 \end{cases}$

Los límites laterales valen:

$$\text{Por la izquierda: } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\operatorname{sen}(x)}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\operatorname{sen}(x)}{-x} = \left[\frac{0}{0} \right] = (L'H) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos x}{-1} = -1.$$

$$\text{Por la derecha: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{sen}(x)}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = \left[\frac{0}{0} \right] = (L'H) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{1} = 1.$$

Como los límites laterales no coinciden no existe el límite cuando $x \rightarrow 0$.

- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{(\sqrt{x} - \sqrt{a})(\sqrt{x} + \sqrt{a})} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} = \frac{1}{2\sqrt{a}}$

23. Halla los siguientes límites:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 + 2}{2 - 2\operatorname{sen}x} \right)^{2/x} \qquad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{2x^2 + x + 5} - 2}{1 - \sqrt{2x - 1}}$$

Solución:

- $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 + 2}{2 - 2\operatorname{sen}x} \right)^{2/x} = [1^\infty]$. Para resolver esta indeterminación aplicamos logaritmos.

$$\begin{aligned} \ln \left[\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 + 2}{2 - 2\operatorname{sen}x} \right)^{2/x} \right] &= \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(\frac{x^2 + 2}{2 - 2\operatorname{sen}x} \right)^{2/x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} \ln \left(\frac{x^2 + 2}{2 - 2\operatorname{sen}x} \right) = [\infty \cdot 0] = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln \left(\frac{x^2 + 2}{2 - 2\operatorname{sen}x} \right)}{x} = \left[\frac{0}{0} \right] = \text{(ahora, aplicando la regla de L'Hôpital)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \left(\frac{2x}{x^2 + 2} - \frac{-2 \cos x}{2 - 2\operatorname{sen}x} \right)}{1} = 2. \end{aligned}$$

Por tanto, $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 + 2}{2 - 2\operatorname{sen}x} \right)^{2/x} = e^2$

- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{2x^2 + x + 5} - 2}{1 - \sqrt{2x - 1}} = \left[\frac{0}{0} \right] = \text{(aplicando la regla de L'Hôpital)} =$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{4x + 1}{3\sqrt[3]{(2x^2 + x + 5)^2}}}{-\frac{2}{2\sqrt{2x - 1}}} = \frac{5}{-\frac{2}{2}} = -\frac{5}{2}$$