

2.8. Rotacional y Divergencia de un campo vectorial F y sus propiedades.

2.8.1. Rotacional: Definición y propiedades.

Definición. Sea F un campo vectorial dado por $F : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 / F(x, y, z) = (F_1(x, y, z), F_2(x, y, z), F_3(x, y, z))$, donde F_1 , F_2 y F_3 tienen derivadas parciales continuas en alguna región R . El **rotacional** del campo F está dado por

$$\text{rot}(F) = \nabla \times F = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) \hat{i} + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \right) \hat{j} + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \hat{k}$$

Para recordar mejor el vector del rotacional de F , se puede considerar el desarrollo del siguiente determinante

$$\text{rot}(F) = \nabla \times F = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) \hat{i} + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \right) \hat{j} + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \hat{k}$$

Propiedades del Rotacional.

1. Si el campo escalar $f(x, y, z)$ tiene derivadas parciales continuas de segundo orden entonces el $\text{rot}(\nabla f) = \vec{0}$.
2. Si $F(x, y, z)$ es un campo vectorial conservativo entonces $\text{rot}(F) = \vec{0}$.
3. Si el campo vectorial $F(x, y, z)$ es una función definida sobre todo \mathbb{R}^3 cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas y el $\text{rot}(F) = \vec{0}$ entonces F es un campo vectorial conservativo.

El rotacional de un campo vectorial tiene su principal interpretación física cuando la función vectorial $F(x, y, z)$ representa el flujo de un fluido, el rotacional en este caso se interpreta como la circulación que presenta el fluido alrededor de un punto (x_0, y_0, z_0) .

Si el campo vectorial F representa el flujo de un fluido y $\text{rot}(F) = \vec{0}$ entonces se dice que el fluido es irrotacional.

EJEMPLO 63. Sea el campo vectorial $F(x, y, z) = (0, \cos(xz), -\text{sen}(xy))$ determine su rotacional.

Solución. Al aplicar la definición del rotacional se obtiene el siguiente vector que lo representa

$$\begin{aligned} \text{rot}(F) &= \left(\frac{\partial}{\partial y}(-\text{sen}(xy)) - \frac{\partial}{\partial z}(\cos(xz)) \right) \hat{i} + \left(\frac{\partial}{\partial z}(0) - \frac{\partial}{\partial x}(-\text{sen}(xy)) \right) \hat{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(\cos(xz)) - \frac{\partial}{\partial y}(0) \right) \hat{k} \\ &= (-x \cos(xy) + x \text{sen}(xz)) \hat{i} + (y \cos(xy)) \hat{j} + (-z \text{sen}(xz)) \hat{k} \\ &= x(\text{sen}(xz) - \cos(xy)) \hat{i} + y \cos(xy) \hat{j} - z \text{sen}(xz) \hat{k} \end{aligned}$$

EJEMPLO 64. Determine si el campo vectorial definido por $F(x, y, z) = (2xy, x^2 + 2yz, y^2)$ es un campo conservativo.

Solución. Por propiedades del rotacional, un campo vectorial es conservativo si $\text{rot}(F) = \vec{0}$, para demostrarlo aplicamos la definición del rotacional para calcularlo.

$$\begin{aligned} \text{rot}(F) &= \left(\frac{\partial}{\partial y}(y^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 + 2yz) \right) \hat{i} + \left(\frac{\partial}{\partial z}(2xy) - \frac{\partial}{\partial x}(y^2) \right) \hat{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 2yz) - \frac{\partial}{\partial y}(2xy) \right) \hat{k} \\ &= (2y - 2y) \hat{i} + (0 - 0) \hat{j} + (2x - 2x) \hat{k} \\ &= 0 \hat{i} + 0 \hat{j} + 0 \hat{k} \end{aligned}$$

En donde queda demostrado que $F(x, y, z) = (2xy, x^2 + 2yz, y^2)$ es un campo conservativo.

EJEMPLO 65. Demuestre que cualquier campo vectorial definido por $F(x, y, z) = (f(x), g(y), h(z))$, donde f , g y h son funciones derivables, es irrotacional.

Solución. Se dice que un campo vectorial es irrotacional si se de muestra que $\text{rot}(F) = \vec{0}$, al aplicar la definición el rotacional se obtiene

$$\begin{aligned} \text{rot}(F) &= \left(\frac{\partial}{\partial y}(h(z)) - \frac{\partial}{\partial z}(g(y)) \right) \hat{i} + \left(\frac{\partial}{\partial z}(f(x)) - \frac{\partial}{\partial x}(h(z)) \right) \hat{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(g(y)) - \frac{\partial}{\partial y}(f(x)) \right) \hat{k} \\ &= 0\hat{i} + 0\hat{j} + 0\hat{k} \end{aligned}$$

Por lo que se puede afirmar que el campo es irrotacional.

2.8.2. Divergencia: Definición y propiedades.

Definición. Sea F un campo vectorial definido por $F: \mathfrak{R}^3 \rightarrow \mathfrak{R}^3 / F(x, y, z) = (F_1(x, y, z), F_2(x, y, z), F_3(x, y, z))$, donde, F_1 , F_2 y F_3 tienen derivadas parciales continuas en alguna región R . La divergencia de F se denota por $\text{div } F$, o por $\nabla \cdot F$, y esta dado por

$$\text{div}(F) = \nabla \cdot F = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}$$

Propiedades de la Divergencia.

1. Si $F(x, y, z) = (F_1(x, y, z), F_2(x, y, z), F_3(x, y, z))$ es un campo vectorial sobre \mathfrak{R}^3 , y F_1 , F_2 y F_3 tienen derivadas parciales continuas de segundo orden entonces la $\text{div}(\text{rot}(F)) = 0$.

2. Si $f(x, y, z)$ es un campo escalar, la divergencia de su campo vectorial gradiente $\text{div}(\nabla f)$, está dado por

$$\text{div}(\nabla f) = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Expresión que se suele abreviar por $\nabla^2 f$, en donde al operador $\nabla^2 f$, se le denomina como **operador de Laplace**. Este operador también puede ser empleado a un campo vectorial $F(x, y, z) = (F_1(x, y, z), F_2(x, y, z), F_3(x, y, z))$, aplicándolo a cada una de sus funciones componentes, esto es

$$\nabla^2 F = (\nabla^2 F_1, \nabla^2 F_2, \nabla^2 F_3)$$

En la mecánica de los fluidos si el campo de velocidades del fluido viene dado por el campo vectorial F , se la $\text{div}(F) = 0$ se dice que el fluido es incompresible.

EJEMPLO 66. Sea el campo vectorial $F(x, y, z) = (e^x \operatorname{sen}(y), e^x \cos(y), z)$ determine su divergencia.

Solución.

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(F) &= \frac{\partial}{\partial x}(e^x \operatorname{sen}(y)) + \frac{\partial}{\partial y}(e^x \cos(y)) + \frac{\partial}{\partial z}(z) \\ &= e^x \operatorname{sen}(y) - e^x \operatorname{sen}(y) + 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

EJEMPLO 67. Demuestre que cualquier campo vectorial definido por $F(x, y, z) = (f(y, z), g(x, z), h(x, y))$, es incompresible.

Solución.

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(F) &= \frac{\partial}{\partial x}(f(y, z)) + \frac{\partial}{\partial y}(g(x, z)) + \frac{\partial}{\partial z}(h(x, y)) \\ &= 0 \end{aligned}$$

EJERCICIOS PROPUESTO 2.8

- 1)
- 2)
- 3)